



12/11/71

$\frac{N}{a. 12}$

H. b. H.



*In. Lewis Petit M.D.*  
*Coll. Regal. Med. Lon. Soc. S.R.S & S.S.A.*



659  
The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY  
OF LONDON

Accession Number

Press Mark

NENTER, G.P.

5616A

T8



D. GEORGII PHILIPPI NENTERI

Pract. Argent.

# THEORIA

HOMINIS SANI

five

PHYSIOLOGIA

MEDICA

in qua

*Expunctis minimè necessariis,  
superfluis, ac curiosis, quæ vera Artis  
Medicæ fundamenta magis evertere, quam con-  
firmare solent, ea, quæ ad Medicum ejusque  
Scopum præcipue spectant, traduntur, & ex ve-  
ris Naturæ, in Corpore Humano agentis,  
principiis solidè demonstrantur,*

*Præmissa est*

In gratiam Tyronum

INTRODUCTIO

De

REQUISITIS BONI  
MEDICI.

— (o) —

ARGENTORATI,

Sumptibus JOHANNIS BECKII.

M DCC XXIII.

#

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE

PHYSICAL SCIENCES

AND

ENGINEERING

CHICAGO, ILL.

1900



*PER-ILLUSTRI*  
*QUINDECIM-*  
*VIRORUM*  
*COLLEGII*  
*DOMINO*  
*PRÆSIDI*  
*REGIO.*



UT ET  
RELIQUIS  
Ejusdem COLLEGII  
GENEROSISSIMIS,  
MAGNIFICIS, CONSULTISSI-  
MIS, PRUDENTISSIMIS  
ET AMPLISSIMIS  
DOMINIS  
ASSESSORIBVS.

*Dominis meis  
Gratiosissimis.*

MEDICAL SOCIETY OF LONDON





# VIRI PER-ILLUSTRIS

*Generosissimi, Magnifici,  
Consultissimi, Prudentissimi  
& Amplissimi*

*Domini Gratosissimi.*



*Uamprimum ex  
speciali Gratia docendi  
facultas mihi concessa  
fuit, id semper mea-  
rum partium esse duxi,  
ut, quæ ad stabiliendam  
Artem Medicam & ad  
solida ejusdem principia faciunt, Auditori-  
bus meis proponerem: Dignitatem enim Ar-  
tis, circa Vitam & Sanitatem Hominis occu-  
pata, accuratorem tractationem postulare  
persuasus eram. Quem in finem in varias*  
):( I *Medi-*



*Medicorum Theorias, quantum ingenii vires permittebant, inquirebam, eaque accuratius, ut eis postea Praxin eò facilius superstruere possem, examinabam: ast post multos labores & summum temporis dispendium multas earum multa quidem curiosa & maxime subtilia, ad Praxin verò Medicam, ad quam tamen omnia in Medisina dirigi debent, minime necessaria continere deprehendebam: Nihil enim hic de motibus Naturæ salutaribus, (cum tamen tota Vita atque Sanitas nil nisi motuum, summo consilio à principio interno ad conservationem corporis directorum, continua series & connexio sit) sed de variis materiis, de mechanica partium structura & effectibus per necessitatem quandam exinde fluentibus multa reperiabantur. Quid autem utilitatis ex omnibus hisce in Praxi sperari possit, cordatioribus Practicis notum est. Quare sepositis omnibus aliis principiis, ipsam Naturam, non ignorantie asylum, uti modernis Mechanicis eam vocare placet, sed Corporis Presidem, morborum, ex plerorumque consensu Medicatricem & Medicorum Magistram consulere, & ejus non solum motus ordinarios in statu sano, sed etiam extraordinarios in omnis generis morbis*



Vobis (viam variis Celeberrimis Medicis & imprimis Dn. D. Stahljo monstrantibus) accuratius examinare cepi, eoque ipso in opinione mea, vulgarem Theoriam multa superflua & minime necessaria, imo falsa ac veram Praxin evertentia continere, magis magisque confirmatus fui. E contra vero multa, quæ morborum vera fundamenta, connexionem, mutationes aliaque, ad veram Praxin quam maxime pertinentia, deprehendere occasio mihi data fuit. Et cum hæc & alia, quæ Auditoribus meis in calammum dictitaveram, Viris quibusdam Honestis ac in Praxi versatissimis non displicerent, eorum monitis obtemperaturus, ea publici juris facere decrevi. Cum vero nova non semper omnibus arrideant & invidiam plerumque comitem habeant, Patronos qualiumcunque meorum laborum exorare consultum duxi.

Vobis E. Viri Per-Illustres, Generosissimi, Magnifici, Consultissimi, Prudentissimi & Amplissimi, ceu Maximis Mecænatibus primam hancce partem, Theoriam Hominis Sani, qua fieri potest observantia, offero & obnixè rogo, ut  
Gra-

*Gratiosè eam excipere atque Vestra Protectione dignari velitis : qua si potitus fuero, contra invidorum tela tutus, DEUM T. O. M. semper supplex orabo, ut Vos ad seros usque annos salvos sospitesque conservare velit, quæ Respublica de Patribus, Academia de Protectoribus & Conservatoribus, studiis verò dediti de Mæcenatibus Summis gloriari queant. Sic voveo, sic DEUM precor*

V. V.

Per-Illustr. Generosiss.  
Magnif. Consultiss. Prudentiss. & Ampliss.


NOMINUM

*Humillimus Cultor*

GEORGIUS PHILIPPUS NENTER,  
Med. Doct.

*Q. D. B. V.*





Q. D. B. V.

## INTRODUCTIO.



Ulamvis Medicina  
 respectu Originis ,  
 Subjecti & Finis sit ars  
 nobilissima , nihilo-  
 minus tamen omni-  
 bus temporibus à  
 multis quam maximè  
 contempta fuit, id quod *Hippocrates* suo  
 jam tempore expertus est, unde in *Lege*  
 (ubi etiam causam contemptus allegat)  
 ait: *Medicina omnium artium praeclarissima*  
*est. Verum propter ignorantiam eorum, qui*  
*eam exercent, & ob vulgi ruditatem, quod tales*  
*pro Medicis judicat & habet, jam eo res deve-*  
*nit, ut omnium artium longè vilissima censea-*  
*tur. At vero hoc peccatum ob hanc potissi-*  
*imum causam mihi committi videtur. Soli*  
*namq; Medicina nulla pœna in Rebus publicis*  
 A *statuta*

*statuta est praterquam ignominia: verum hæc ipsa non afficit, neq. contingit eos, qui ex composito personam ipsius induerunt. Simillimi enim huiusmodi Medici sunt personis, quæ in Tragediis introducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt, habent, illi ipsi autem verè non sunt: sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autem & opere valde pauci.*

Si verò quis de horum verborum veritate dubitat, is saltem varios Medicastro, Cerdones, Sartores, Carnifices, Rhizotomos, Ciniflones, Vetulas, Obstetrices, aliosque quos vel lucricupido, ve legeſtas, vel desperatio, vel vulgus ruditas Medicos reddidit, consideret, fide enim deprehendet, hosce quidem famam & nomine re autem & opere Medicos non esse.

Non autem ad hos tantum, sed & ad ipsos Medicos indoctos spectant verba Hippocratica, ad eos scil. qui neglectis subsidiis ad Medicinam facilius addiscendam necessariis, illotis, quod ajunt, manibus Medicinam aggrediuntur, hinc inde tantum quædam ex Institutionibus Medicinæ obiter, ut canis & Nilo, hauriunt.

unt



unt. elapsis aliquot annis Privilegia Doctoralia petunt, ac ope Reginae Pecuniae obtinent ; quique postmodum contra quosvis morbos formulas hinc inde ex Authoribus Practicis conscriptas, aut in Pharmacopoliis collectas, & memoriae mandatas quibusvis ferè ægrotis, nullo ad Temperamenta, Sexum, Ætatem, Morbi essentiam, Causam, Tempus &c. habito respectu, præscribunt, Hi sanè omnes, quamdiu ignorantiam suam non agnoscunt, sed in ea persistunt, tamdiu reprehensionem Hippocratis incur. runt, & veri Medici minimè sunt. Quadrant in hocce reliqua verba Hippocratis l. a. *Imperitia inquit, malus thesaurus est, & infelices opes his, qui eam repositam habent, & insomnium aut potius somnium diurnum, & maximè verum, alacritatis fiduciaq; ac vere exultationis expers, timiditatisq; & audacia nutritrix. Timiditas equidem impotentiam, audacia verò ignorantiam artis, significat. Duo enim sunt Scientia & Opinio, quarum altera scire quidem facit, altera verò ignorare.*

Clarius adhuc sed gravius & acerbius de hac re loquitur *Goris in Medicina Contempta*, p. 28. *Per triennium, ait, vel qua-*

*driennium enim interdum in subselliis sedisse  
 & auscultasse docentes Professores, nunc satis  
 est ad impetrandam potestatem in vitas ne-  
 cessq; hominum. His sese Medicos profitenti-  
 bus statim creditur, cum sit periculum in nul-  
 lo mendacio majus. Medicos tali origine fa-  
 ctos, quis pro veris habeat? Discunt hi alie-  
 nis periculis & experimenta per mortes agunt.  
 Cum enim nil nisi libros & quidem satis parcè  
 & negligenter tractarint, vixque hiscere sine  
 vapulante Prisciano tria verba latini sermo-  
 nis norint, & tamen ad opus accedendum sit,  
 planè ignotis rebus fatigant naturam, nesciunt  
 vitam an mortem procurent, donec eventus id  
 docuerit. Indè illud Novus Medicus no-  
 vum cœmiterium, in eorum opprobrium  
 prodiit proverbium, & cum occisus quis est,  
 intemperantia fatumque arguuntur. In ipsa  
 curandi methodo multo incertissimi & dubii,  
 nunc hoc nunc illud imperant, ipsa ignoran-  
 tia ignorantiores, contrarium pro convenien-  
 ti medicamentis inserunt. Lucri tamen cau-  
 sa sese ad depravatum vulgi judicium & cu-  
 piditatem accommodantes, mirabilia, nova,  
 inaudita comminiscuntur & ogganniunt  
 expertis. Quanquam tantum inania fun-  
 dant verba & funiculos ex arenâ nectant.*

Qui



Qui ergò censuram Hippocratis effugere, & verus Medicus esse cupit, is ante omnia id agat, ut perfectam Artis Medicæ acquirat cognitionem, cui postmodum in Praxi Prudentiam & Judicium in applicando jungat: *Scientia enim atque Prudentia vera atque essentialia Medici Veri atq. Boni sunt requisita, quæ semper indissolubili nexu conjuncta esse debent, & qui alterutro horum caret, is nunquam bonus evadet Medicus: uti enim Judicium præsupponit Scientiam sufficientem, ita Scientia absque Judicio res est inanis.*

Ad Scientiam Medicam veram acquirendam variis opus est mediis atque requisitis, quæ omnium optime tradit Hippocrates l. a. *Quisquis inquit, Medicinæ scientiam sibi verè comparare volet, cum his duobus voti sui compotem fieri oportet, Natura, Doctrina. Loco studiis apto, Institutione à puero, Industria & tempore. Primum quidem igitur omnium Natura opus est: Natura enim repugnante, irrita omnia fiunt. Si verò Natura ad optima viam demonstret, artis doctrina facile contingit: quam sanè cum Prudentia sibi comparare oportet, ita ut à puero institutio accedat*

*atque id in loco à Natura ad disciplinam apto. Amplius autem & Industriam adhibere oportet, camque ad multum omnino tempus, quo disciplina ipsa insita feliciter & cum profectum fructus suos producat. Qualis enim eorum, quæ terra producit, consideratio est, ejusmodi etiam disciplina Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra velut ager est. Dogmata Præceptorum velut semina sunt. Institutioni à puero cum eo convenit, quod opportunum tempore semina in arvum cadere oportet. Locus autem in quo disciplina contingit, est veluti ambiens aër, à quo è terra nascentibus nutrimentum accedit. Industria autem cultura est. Tempus postremum hæc omnia corroborat, ut perfecte enutriantur.*

Hæc sunt quæ Hippocrates requirit, & optandum esset, ut juxta ejus monitum Methodus Medicinam & docendi & discendi institueretur, sic enim longè majores facturi essemus progressus in Medicina: & meo quidem judicio neglecta methodus Hippocratica præcipua causa fuit, quod Medicina ab Hippocratis temporibus usque ad nostræ steterit tempora. Primo autem omnium Hippocrates h. l. in Medico requirit



rit *Naturam* ad Medicinam addiscendum aptam ; id quod etiam *Libro de Decenti Ornatu* confirmat: *Principalissimum* , inquit, *in artibus est Natura* ; nam si hac assue- rit, his qui artibus animum applicant, per omnia penetrare poterunt. Quare non im- merito quæritur, quænam *Natura* ad Medicinam addiscendam sit apta ? sed hic facile quivis perspiciet, ingenium re- quiri optimum, & judicium promptum ac acre ; cum enim *Ars Medica* sit lon- ga & prolixa, memoria ad omnia capi- enda felicissima, & ad perscrutandas morborum causas judicium acre ac in casibus Medicis gravioribus promptissi- mum requiritur : unde qui *Natura* sunt segnes aut præcipites aut nimis timidi in actionibus suis, ad Medicinam discen- dam & exercendam minus sunt apti. *Doctrina* alterum est requisitum ad Me- dicinam feliciter ac facile addiscendam necessarium, quod à parte Docentium accedere debet. Docentes autem in eo toti sint, ut Medicinæ Tyronibus omnia, quæ ad scopum Medicum dire- ctè faciunt, missis omnibus alienis, pro- ponant : si enim in hocce delinquant,

optima sæpè Natura in addiscenda Medicina oleum & operam perdit, ac postmodum non nisi post longas ambages aliquam Artis cognitionem acquirit. Postea desiderat etiam Hippocrates *Locum studiis aptum*; Loca talia olim erant celebres Medicorum Scholæ, è quibus præcipua erat Coa: hodiè vero sunt Academiae, ubi à Professoribus omnes Medicinæ partes explicantur: quo ipso tamen alia non excluduntur loca, quando v. g. Medicinæ Tyrones sæpius cum Practicis conversantur, atque eorum manuductione utuntur: ubicunque enim Tyro aliquid discere potest, ibi quoque Locus est. Hisce postmodum addit *Institutionem à puero*: quod tamen postulatum hodiè minimè observatur, sed pessimo consilio: ad annum enim decimum octavum vel vigesimum nihil agitur plerumq; quod ad scopum Medicum directè pertineat; hic enim in stylo, ille in Linguis, iste in Philosophicis, alius in Mathefi, alius in Geographia, alius in Historia, alius in Musica, alius in Poesi, alius in aliis se exercet, quæ etsi in se considerata partim utilia, partim iucunda sint, parum tamen ad scopum Medic-

di-



dicum faciunt. Optandum potius esset, ut juxta præceptum Hippocratis Institutio in Medica Arte à puero fieret, uti priscis temporibus, quibus Medici omnium præstantissimi vixerunt, id factum fuit. Quem in finem Scholæ Medicæ erigi, inque iis pueris partim Lingua Latina, partim Græca ea, quæ futuro Medico præcipue utilia sunt, proponi possent. Vocabulario Latino Medicum, continens nomina Plantarum, partium &c. jungi deberet. In exercitiis styli possent proponi partim ea, quæ ad Physiologiam humanam, partim ad Pathologiam aliasque Medicinæ partes spectarent, sic enim cum ipsis Literis humanioribus insignem rerum Medicarum notitiam sibi comparare possent. Possent quoque ipsis monstrari Partes corporis, Plantæ, Operationes Chirurgicæ, aliaque, uti in Scholis Veterum id solenne erat. Posset postmodum ubi quæ Theoriam spectant, absoluta essent, ipsis tradi Historia morborum exacta eorumque curatio. Sed cum hujusmodi Medicæ Scholæ potius optandæ quam sperandæ sint, reliqua, quæ de iisdem

adhuc moneri possent, silentio prætereo. Reliqua Hippocratis postulata sunt: Industria & Tempus. *Industria* uti in reliquis, ita & in Medicina quam maxime necessaria est, nullus hic otio locus: ars longa est, vita brevis, & innumera occurrunt in Medicina, quæ summam merentur attentionem: quare quicumque Tyrones Medicinæ summam industriam adhibere non cupiunt, nunquam in Medicina proficient, nec Paxin feliciter exercebunt. Non autem annorum aliquot sed multorum requiritur industria; Medicina enim late se extendit, & multa adhuc in ea latent: quare non solum ad ea addiscenda, quæ nobis jam nota sunt, sed ad ea, quæ adhuc latent, detegenda, longum omnino necessarium est tempus.

Quod itaque Scientiam Medici, ad quam comparandam tot requisita Hippocrates proponit, concernit, ea quidem amplissima est, omnis tamen ad certum & unicum scopum Medicinæ dirigenda debet, quæcunque vero ad scopum istum directe non faciunt, ea aliena sunt à Medicina & ad Medici scientiam non per-



pertinent. Est autem scopus Artis Medicæ & Medici, læsiones actionibus corporis & imprimis vitalibus imminentes præcavere, aut illatas jam in ordinem dirigere & corrigere. Hic inquam verus artis Medicæ est scopus, ad quem etiam totam Medici scientiam, quantum quidem possibile in hocce & sequentibus libris dirigemus.

Ad hunc artis Medicæ scopum feliciter impetrandum unice inservit solida Theoria, cui tuto Praxis Medica superstrui potest: sed h. l. maxima statim occurrit difficultas, quænam sit solida illa Theoria, tot enim dantur Theoriæ diversorum, ut quam eligere debeas, nescias: Aristotelici quatuor sua laudant elementa: Paracelsus cum suis affeclis Sal, Sulphur & Mercurium activa, ac phlegma cum Terra damnata s. capite mortuo passiva principia commendat: alii alcali & acidum: alii acidum & viscidum: alii cujusvis figuræ particulas: alii mechanismum & quid non obtrudere conantur: ut alia quam plura silentio præteream, quibus Theoriam superstruere solent. Quantum veritatis hisce  
omnibus

omnibus insit, Ego quidem hâc vice prolixè inquirere nolo, illud tamen reticere nequeo, eas hypothesas si non omnes, saltem plerasque ad scopum Medicum parum facere, multa enim in iis, de materiæ varia conditione, figura, mixtione &c. occurrunt, sed de motu ad certos fines & ad conservationem corporis directo altum plerumque est silentium, cum tamen, quicquid in homine contingit per motus fiat, in modo dictis autem hypothesibus omnia materiæ adscribuntur, quæ tamen merè passivè se habet.

Si E. Medicus solidam Theoriam Scopu Artis satisfaciendam acquirere cupit, id ante omnia agere debet, ut juxta monitum Hippocratis Physicus sit: respicere scilicet unice debet ad Naturam corporis humani; hujus enim vera contemplatio est vera Physica & Theoria Medica, quam Hippocrates à Medico postulat & quæ in Praxi aliquem habet usum. In hâc Theoria tria potissimum considerari merentur 1. Materia corporis humani ejusque mixtio. 2. Vita seu corporis mixti conservatio & 3. Modus,  
per



per quem corpus tam per motus vitales ordinarios, quam extraordinarios conservatur; de quibus partim in Physiologia partim in Pathologia sermo erit.

Altera vero Physica tantum abest, ut sit fundamentum totius Medicinæ, ut potius si eidem Medicina superstruitur, Theoria vera pervertatur & multa damna exindè in Praxin Medicam redundent. Et ut de diffidiis Physicorum, alio atque alio modo rerum phænomena explicantium, nil dicam, pauca tantum ex Physica proferam, ut quilibet perspicere queat, quid utilitatis indè redundet in Medicinam. Quid quæso Medico interest, an Materia prima sit tantum extensum quid, an congeries minutissimarum atomorum? Quid de vacuo sive inani inanis prodest quæstio? Quid spatia imaginaria sive extra mundana? Cui bono quæstiones illæ subtiles de forma? Cui bono controversia illa, an Privatio principiis Physicis annumerari debeat? Quorsum spectant subtilitates de Luce, Lumine, tam reflexo, quam refracto, Pelluciditate, Coloribus, de Soni essentia, Echo, Gravitate, Levitate, Asperitate

te &c. ipse Physicorum in hisce dissensus satis superque probat, rationes eorum ita comparatas esse, ut esse & non esse salva rei veritate possint. Sic Medico pariter parum interest, utrum Copernicanum, an vero Tychonianum Mundi Systema alteri sit præferendum? Nullius quoque est usus in Medicina quæstio illa curiosa de Aquæ essentia, an constet ex particulis anguillulis similibus super globulos æthereos se volutantibus? Quid prodest Medico, si juxta mentem Physicorum aërem considerat ceu congeriem particularum plumosarum aut ramosarum? Quamnam utilitatem in Medica Arte habet consideratio magnitudinis, motus & distantiae Planetarum? Quid prodest Medico nosse controversias de Cometis, de stellis fixis, de Eclipsibus, de Tonitru, Dracone volante, Igne fatuo, iride &c? Quid prodest in curatione morborum, utrum terra sit rotunda an ovalis? an profunditas maris sit una eademque in omnibus locis? an fluxus & refluxus maris proveniat à pressione lunæ, an vero ab alia quâdam causa? Quid Medico interest an detur materia striata

Car-



Cartesii ad explicandam Magnetis vim attractricem necessaria? Ut quam plurima alia silentio præteream quæ quidem in Physica admodum curiosa sunt, aliena tamen sunt ab arte Medica, inque ea nihil utilitatis habent. Provoco hic ad omnes cordatos Practicos, eorumque assensum mihi facile polliceor, hi enim optimè norunt, *Medicum non Macrocosmi sed Microcosmi esse Ministrum*, & phænomena in homine occurrentia observare debere.

Quamvis autem, uti ex hætenus enarratis patet, multa, quæ prorsus aliena sunt à Medicina, in Physica contineantur, nihilominus tamen huic Physicæ superstruitur Medicina, & quicumq; libri Philosophiam corpuscularem non ubique prætendunt aut mechanismum non sapiunt, ii delicatis Physicis nauseam movent. Ex hoc ipso fundamento Veteres etiam à multis rejiciuntur, & Hippocratis vacillat Authoritas; & cur non vacillaret Hippocrates? quomodo enim, si tot particulis rotundis, polyhedris, &c. maxime mobilibus imponitur Hippocrates, firmiter stare poterit?

Quod

Quo verò appareat, quam absurda sint quam plurima, è Philosophia corpusculari, si ad Medicinam referuntur, ex Goris *Medicina Contempta* p. 22. quædam proferam: *Magno applausu, inquit, successuque (ut dicebatur) olim Medicinam facientem, postea docentem vidit Orbis literatus novum Philosophum, fama & fortuna insignem Medicum (qui quasi vidisset rerum rudimenta ac principia nasci & in unum coire & inter ea à puero vixisset, nil nisi apodixes fundere sibi & suis videtur) cujus principia ab his miris encomiis celebrantur & laudantur, & ab illis culpantur, qui dexteritatem & mentis aciem authoris capere impotes mysticam suam Sophiam non intelligunt. Quoniam plurima (uti volunt) ex Glaubero, Schrædero, Zvvelffero, Sala, l'Emery &c. aliisque excerpta* “apud suos Authores perceptu facillima, tot  
 “tantisque particulis firmis, fluidis, glabris, fle-  
 “xilibus, obtusis, oviformibus, aqueo terrestri-  
 “bus, solido fluidis viscosis, terraqueis, ramoso  
 “salinis athereis, salino terrestribus, imo pro-  
 “theis seu omniformibus involvit; ut hæc mole-  
 “cularum ex massulis armatis spiculis concate-  
 “natarum miscella, approximatione & manu-  
 “briatione tantas discontinuantes coordina-  
 “tiones



‘tiones & meteorisondas diversificationes pro-  
‘ducat, ut arietantia hæc corpora divortio &  
‘fuga divisissimorum decarceratorum puncto-  
‘rum Salinorum ex porosissima terra magno  
‘hiatu & ferociori tortura allisione, collisione,  
‘fricatione spirituosissimã corporeitatem cum  
‘diaphaneitate conjunctam elidant, & nisi cu-  
‘neolis inviscarentur, mediantibus halituosis  
‘viciniis, ab excellentiori prosapiã in vappe-  
‘centiã vel vacuum degenerarent. Tantã gran-  
‘diloquentia & verbis partim Chimicorum, par-  
‘tim inquinamentorum proprii cerebelli suam  
‘sententiam occultare norunt nuperi Authores.  
Sed hæc verba nec diem nec noctem significan-  
‘tia sparsim sunt sumpta, concatenata jam audi-  
‘enda est sententia: nam sicut vasa cognoscuntur  
‘sono, ita homines sermone. “Spiritus enim Mer-  
‘curialis existit tam edax, ut omnia metalla  
‘imminuat & penetret, seu, quod ut apertius  
‘loquar, situs pororum & meatuum in plumbo  
‘est talis figura, ut materia subtilis eos ingre-  
‘diens, ibidemq; (pro minimo temporis puncto)  
‘moram trahens, aliasq; particulas solidas eve-  
‘hens, in tantum illius consortio modificetur in  
‘sui effluviis, ut aliis corporibus communicata,  
‘vim suam illis impertire queat sæpius sat vio-  
‘lentam.” Sit ne hæc jam obscuri per clariora  
‘xplicatio, vel vice versa aliis trado dijudican-  
‘dum.

*“dum. Pergo : Spirituosa & oleosa menstrua  
 “viscosas particulas, non quatenus viscida &  
 “gummosa sunt extrahunt, sed tantum ratione  
 “crassiorum ramosarum particularum viscosæ  
 “componuntur, & quæ poris ramosis convenien-  
 “tes sunt.”* Hactenus Goris. Plura talia  
 qui legere cupit, evolvat le Mortii Ope-  
 ra, hic enim tot particulas ubique spar-  
 git, ut merito stomachum legentibus  
 moveat.

Hæc quoad Physicam annotasse suffi-  
 ciat, & cum de alienis in arte Medica di-  
 cere ceperim, reliquas quoque Theoriæ  
 partes percurram, ut legentibus pateat,  
 quot etiam in iisdem reperiantur aliena.  
 Faciamus igitur transitum ad Botani-  
 cam, Anatomiam & Chimiam, quæ à Me-  
 dico ceu partes Theoriæ modernæ quo-  
 que requiruntur. Botanicam quod con-  
 cernit. Veteres contenti erant nomine  
 & virtute Plantarum, Recentiorum verò  
 curiositas ulterius progressa est, & Plan-  
 tas in varias classes respectu florum,  
 caulis, foliorum &c. redegit. Flores  
 respectu Petalorum in Monopetalos,  
 Dipetalos, Tripetalos, Tetrapetalos &c..  
 Folium in Laciniatum, Serratum, Denti-  
 culatum, Parifolium, Imparifolium &c..  
 Cau-



Caulem in Triquetrum, Quadrangulatum &c. diviserunt. Respectu vero seminis Plantæ vocatæ fuere vel Capsulæ vel Angiospermæ: & illæ iterum vel Siliculosæ: hæ verò vel Angiomonospermæ, vel Monocarpæ, vel Angiopolypermæ, vel Angiomonospermæ papavescentes &c. ut alia quam plura silentio præteream, quæ quidem admodum curiosa sunt & Physicam modernam quam maximè exornant, sed si ad Scopum Medici referuntur, quam quæso habent utilitatem? perlegat quis Tournefortium, (quem tamen inter Recentiores optimum fuisse Botanicum plerique fatentur,) & dicat mihi quid utilitatis ex toto ejus opere Medicus haurire queat? prorsus nihil enim ibidem occurrit quod ad Scopum Medici pertinet. Morisonius celebris admodum inter Botanicos quid magnis suis laboribus præstitit quod ad Scopum Medicum liquid conferat? cui bono sesquipeda illa nomina: dum fumaria v. g. bulbosa alba & purpurea, *Fumaria radice tuberosa latifolia, siliquis bivalvibus, radix cavata, flore rubro & albo*: *Fumaria Vulgaris, Fumaria major vulgaris latifolia siliquis*

*non bivalvibus curtis flore rubro : Alfine re-  
cta, Veronica terrestris annua cærulea triphyl-  
los nunc pentaphyllos, sive foliis trifidis & quin-  
que fidis : Veronica mas vulgaris, Veronica  
spicata terrestris perennis mas supina vulgaris  
foliis serratis, ab eodem appellatur. Quid  
quæso hæc omnia ad Scopum Medi-  
cum? sufficit Medico Practico cognitio  
Plantarum Officinalium, quarum virtu-  
tes si novit, plus in Praxi præstabit,  
quam reliqui omnes cum floribus suis  
Pentapetalis & Tetrapetalis.*

Anatomia quamvis partium situm,  
connexionem & communicationem  
monstrando, multum ad Scopum Medi-  
cum conferre queat, optandum tamen  
esset, ut etiam omnis Anatomicorum la-  
bore eò dirigeretur, ut verum usum Medi-  
cus Practicus exindè percipere posset :  
quando enim in eo occupati sunt, ut  
quasvis minutissimas partium fibrillas  
earumque cohæSIONem detegant, mul-  
tum quidem incrementi capit Physica,  
parum tamen utilitatis exindè percipit  
Medicus Practicus. Sufficit itaq; (ut ver-  
bis Celeberrimi Stahliani Dissert. de Fundam.  
Theor. Med. p. 16. utar) ad Medicam Anato-  
miam, numerum, situm & communicationem  
par-



*partium comprehendisse; non habita æq̃ ratione intimioris illorum textura exquisitissime, tanquam ad physicum potius conceptum, quam scopum & usum medicum pertinentis. Cum verò & sequentia verba admodum notatu digna in se contineant, digna sunt, ut hic legantur: Quilibet, inquit, intelliget, quod hoc fundamento rectè accepto, omnino comprehendatur musculorum, nervorum, vasorum, ossium & tanto magis viscerum, seorsim & inter se mutuò juxta varium situm, transitum, contactum, nexum, communicationem &c. anatomica notitia. At vero non de nihilo est, quod hanc, & harum rerum maxime, notitiam pro fundamento statuamus atque stabiliamus; postquam utique jam à plusculis retro annis, & systemata & exercitia Anatomica, ad justissimam profecto nauseam, à llogis istis adeò indulserunt, ut reliqua illa Medico unice inservientia monumenta, vel nimium quam perfunctorie (ut exercitia imprimis) prosecuta sint, vel frigide & indifferenter veluti (uti systemata) tractaverint; cum tamen præcipua rei dignitas quam maxime poscat, ut intento planè digito distinguerentur, quæ magis ad Physicam, quam Medicinam spectent & contra, ne discentes potius confundi contingat, quam doceri, quæ scire ipsorum quam maxime interest.*

Gravius adhuc rem exprimit *Tractatus de Alienis ab Arte Medica arcendis* p. 18. Nego inquit, quod ex universa structura, structura inquam atque textura partium corporis organicarum, non solum specificè, quatenus mechanicae sunt, sed etiam genericè quatenus textae atque structae sunt, quicquam subsit, quod verè ad Medicum pertineat, seu Medico quatenus talis absoluta, imò verò absolute ulla, necessitate, cognitum esse debet. Plus dico Nego quod talis cognitio, aut notitia Medico stricte dicto quatenus tali, ad scopum suum medendi, restituendi, reparandi, vel praecupandi specialissimè, vel resarciendi, etiam solum utilitatem eximiam afferat. Ingens paradoxon! nempe ut ego hæc eripiam Medicinæ, in quibus illa hodiè non solum tam proluxa sed certè modo non tota est, exultatque atque sibi placet. Sed est ita & non aliter. Non adspernor rem ipsam aut simplicitatem dissuadeo aut negligi volo; in Medicinam solum ingeri, ad Medicinam pertinere, ad Medicinam facere, ne dum ad Medicinam necessariam esse, ut vere ita firmiter & constantem nego. Imo ita demum à Medicis etiam abesse volo atque jubeo, quando illi non solum hæc ad se pertinere arbitrantur, sed etiam in his propriè, imò unice scientiam suam collocantes, & hæc proprie esse, quæ non deceant solum, sed faci-



*ant Medicum, opinantes, his quidem studium  
atque laborem & tempus consumunt: Necessa-  
ria verò non solum præ his, sed planè per hæc, ne-  
gligunt, dum his maxime medicam suam artem  
atque scientiam absolvi, persuasi sunt.*

Verba hæc etsi satis dura videantur,  
non tamen à veritate adeò aliena sunt, si  
eodem sensu, ac scripta sunt, sumuntur.  
Quapropter si quid utilitatis ex Anato-  
mia sperandum & incrementum inde  
accedere Praxi Medicæ debet, non so-  
lum partes monstrari & earundem usus  
quem in œconomia animali ad conser-  
vandam vitam præstant, recenseri, sed  
etiam affectus morborum, easdem partes in  
statu p. n. affligentes, explicari debe-  
rent, quomodo scil. easdem partes affi-  
ciant, quid potissimum lædant, quas  
actiones turbent, quomodo in alios affe-  
ctus transeant, ex quo fundamento id  
fiat, & quæ sunt alia: sic enim brevi insi-  
gnes fructus percipere possent Tyro-  
nes: quamdiu autem Anatomia in dete-  
gendis variis minutiis occupata est, &  
non omnia ad Praxin dirigit, tamdiu  
aliena à Scopo Medico & Practico mi-  
nus necessaria tractat.

Pergamus ad Chimiã. Hæc quam-

vis multa utilia suppeditet remedia, in morbis gravissimis admodum salutaria, quod in primis polychresta remedia Orphanotrophii Hallensis satis superque probant: nihilominus tamen tot & in hac parte reperiuntur aliena, quæ in Medicinam à Chemicis introducuntur, & Medicis obtruduntur, ut insignia damna exindè in Praxin Medicam redundant. Nam quam aliena sunt à Scopo Medico & à vera Theoria inania ista Chemicorum principia Sal, Sulphur & Mercurius activa, ac Phlegma cum Terra damnata sive Capite mortuo passiva principia, ex quibus non solum hominem, sed & omnia in Macrocosmo contenta composita esse contendunt? Quis unquam Chemicorum hæc omnia in homine demonstrare potuit aut demonstrabit? Nugæ enim sunt, quæ de Mercurio vero ex sanguine humano producto proferunt quidam Chemicorum. Et si maxime darentur in homine, quis sanæ mentis postmodum ab hisce actiones in corpore adeò regulariter contingentes derivaret? Nec etiam rem exhaustit, si per Sal intelligitur solubile, per Mercurium evaporabile, per Sul-

phur:



phur vero inflammabile. Reliquos obscuros terminos à Paracelfo ejusque af-  
fectis in Medicinam introductos, silen-  
tio prætereo, quoniam magis ad Cabali-  
starum Abracadabra quam ad Medici-  
nam spectant. Salia autem diversa quæ  
& adhuc hodiè in homine multi Medi-  
corum quærunt, & ab iis phænomena in  
statu sano & morbofo deducunt, maxi-  
me insipida sunt, & etiam si centies vel  
millies solvantur, prorsus tamen Medi-  
cinam non saliant, ut inde sapidum quid  
proveniat. Quam quæso absurdum est,  
omnes morbos, qui tamen quam maxi-  
me inter se differunt, à Salibus derivare  
velle? aliud enim esset Sal Cardialgicum,  
aliud Otalgicum, aliud Nephriticum,  
aliud Podagricum, aliud Pleuriticum,  
aliud Hystericum &c. Sexcenta Hippo-  
cratica hic non sufficerent, majori lon-  
ge numero opus esset. Sed posito da-  
ri talia salia specifica in corpore, quis  
Medicorum à priori cognoscit diverfi-  
tatem specificam istorum salium, quæ  
ne nominibus quidem nominari pos-  
sunt? & si specifica notitia horum sali-  
um latet, quomodo Medicus debite re-  
media iisdem opponet? Quomodo  
B 5 quæso

quæso unica V. S. interdum omnem dolorem, quem acrimoniæ & fædæ hu-  
morum vulgò adscribunt, tollere potest?  
anne V. S. potest tot aculeos unico ictu obtundere, ut pungendi & irritandi vim amittant? Exempli loco fit  
Adolescens 6. ann. sanguineo cholericus, plethoricus, narium hæmorrhagiæ affluens, qui ob dictam hæmorrhagiæ non succedentem gravissima odontalgia & otalgia corripitur: varia usurpata remedia, sed incassum, quare Medici petit auxilium. Medicus accedens juxta vulgarem Salsam Pathologiam rem examinat, & Sal quoddam acre corrosivum seu causticum accusat, contra quod varia remedia absorbentia, alcalina, interna, externa &c. præscribit: augetur nihilominus dolor singulis momentis: æger dolorum pertæsus, alius quoque Medici consilium petit, qui re examinata V. Sectionem suadet: obtemperat æger & sectâ venâ momento citius liberatur ab omni dolore. In hoc affectu si Sal quoddam acre causa fuisset, quomodo V. S. adeò subito illud corrigere potuisset? Ego sane tam subitanam mutationem comprehendere nequeo.

Alius



Alius adolescens 18. ann. corripitur Rheumatismo atrocissimo, Medicus juxta quorundam Methodum ad infringenda & expellenda salia Essentiam Lignorum cum spiritu Cochleariæ mixtam præscribit, undè dolores maximè augentur: missis E. hisce remediis secatur vena cum magno levamine; repetitur altera die, unde spatium aliquot dierum reconvalescit ægrotus. Dicant mihi jam Pathologiæ Salsæ Patroni an possibile judicent, V. Sectionem spicula salina tam brevi tempore ita obtundere posse, ut omnem vim amittant?

Hisce meliora non proferunt qui omnia ab acido derivant, aut qui ad singulos morbos specialia supponunt fermenta, humores enim corporis humani ad acidam fermentationem prorsus non sunt proni, sed potius ad spissitudinem seu coagulationem: si verò fermentativi quid in corpore deprehenditur id ad fermentationem putredinosam sive corruptionem tendit. Quod autem hanc de fermentis doctrinam maxime destruit, est quod, licet homines cibis ad fermentationem pronis quotidie vescantur, rarius tamen morbis laborent: imò alii per totum vitæ tempus ne ullius morbi

morbi infultum patiantur; cum è contra, si humores ad hujusmodi fermentationes adeò proni essent, frequentissimè morbis corripì deberent. Cui addi potest, quod multi morbi periodicè recurrant, seu certis temporibus redeant & intermittant uti febres & hæmorrhagiæ periodicæ: qui morbi, si à fermentatione quadam dependerent, continuò durare deberent: fermentatio enim est actus continuus vel ad perfectionem vel ad destructionem citotendens Tandem etiam hanc de fermentatione doctrinam refellit, quod morbi non pauci à solis causis immaterialibus, animi scil. pathematibus gravioribus & producantur & revocentur: quomodo autem hæc cum ficta ejusmodi fermentatione cohæreant, ego quidem hæcenus deprehendere non potui.

Nemo tamen credat, me ideò omnem falsum existentiam in corpore negare, falsa enim in corpore dari lubens fateor & in Physiologia satis superque demonstrabo: illud saltem volo, falso hisce efficaciam tantam tribui, & perperam Medicam Theoriam iisdem superstrui.

Pergamus jam ad ipsam Physiologiam, primam Medicinæ partem, & videamus,



mus, quid hæc Medico Practico utilitatis afferre queat. Hanc si attentius considero, Oceanum innumerarum controversiarum & speculationum deprehendo: quo autem eò melius appareat mihi Physiologiæ status, pauca tantum h. l. recensere animus est: silentio tamen prætereò istas controversias, quæ in Prolegomenis Medicinæ occurrunt de Sectis Medicorum, de Definitione atque Divisione Medicinæ, aliisque; sermo tantum erit de iis quæ propriè ad Physiologiam spectant.

Primus Generationi sit locus. Cui quæso bono inservit proluxa ejusdem in Physiologia tractatio? quid Medico interest an corporis rudimenta omnia jam in ovulo præexistant, an vero in conceptione à semine masculino producantur? quid ad Scopum Medicum facit, an ovulum in ipso imprægnetur ovario an vero in utero? Quid Medico interest, an detur spiritus genitalis generationis opus dirigens? Quid prodest Medico scrupulosa inquisitio de modo generationis, quomodo scil. semen fœcundet ovulum? Ut alia taceam. Quid porro utilitatis Practico affert proluxa de  
sensi-

sensibus tractatio: quem in finem agitur in hacce materia de qualitatibus sensibilibus, Lumine, Coloribus, Sono aliisque ad Physicam spectantibus?

Quid prodest Medico proluxa tractatio de spiritibus? an sint lucidi, an nitro-aërei, an vero sint urinosi, acidi &c. an liquor nervos irrigans sit vocandus succus nerveus, an spiritus animalis, an vero fluidum nervorum? Quis probabit poros partium esse certa figura præditos, humores vero esse congeriem particularum figuratarum triangularium, rotundarum, quadratarum &c. & si maxime id probaret, quam utilitatem exinde in Praxi expectare posset? Cui bono controversiæ de ciborum digestionem, an fiat chylus per extractionem, an per coctionem, an vero per fermentationem? ut aliâ quamplura silentio præteream.

Pergamus jam ad Pathologiam præxeos fundamentum, & videamus an in ea quoque omnia ad Scopum Medicum directæ sint: sed & in hac non pauca occurrunt, quæ à scopo artis aliena sunt. Quam inanis enim est controversia, an morbus sit substantia, an vero accidens? an relatio an habitus, an patibilis qualitas?



tas? Quem usum in Praxi habet divisio in morbos Intemperiei, Conformationis & Solutæ unitatis? Dicat mihi quis quinam præcise sint morbi Intemperiei, quinam Conformationis? Nata est hæcce divisio ex falsa hypothese, juxta quam corpus simpliciter ut mixtum & structum, non autem ut vivum consideratur, uti in Pathologia luculenter demonstrabo. Magnam quoque in Pathologia confusionem parit vulgaris illa, æst inanis, morborum & symptomatum divisio, juxta quam Apoplexia, Mania, Cardialgia aliique affectus gravissimi non sunt morbi, sed tantum symptomata: undè etiam cum hi affectus itidem sua propria habeant accidentia, symptomata symptomatum Institutionum Scriptores præter necessitatem introducere coacti fuere. Quod autem quam maxime in Pathologia hodierna desideratur, est quod morborum historia, tam frigide à multis tractetur. Cui accedit, quod non demonstretur nexus morborum, quomodo alii cum aliis conveniant, quomodo in alios transeant: cum tamen hocce in Praxi utilissimum sit, & Praxin maxime facili-  
certas

certas classes redigendi essent morbi, quarum quælibet omnes species ad dictam classẽ pertinentes continere deberet, sicut enim facillimè morborum cognitionem sibi comparare possent Tyrones; quando vero morbi vel juxta tres ventres, vel juxta ordinem alphabeticum, vel juxta aliam vulgarem methodum tractantur, morborum nexus tollitur & magna inde oritur confusio.

Si porro in Pathologia consideramus varias causarum morbificarum denominationes & divisiones, facillèprehendemus non pauca in Ætiologia contineri, quæ ad Scopum Mediciparum faciunt: sed cum de iisdem in Pathologia commodius agi possit, eadem propriis reservabo locis.

Progrediamur jam ad Pharmaciam ejusque statum contemplemur. In hac sanè quam plurima occurrunt, quæ reprehensionem merentur, ita ut, etiam si maximam habeamus medicamentorum copiam, nihilominus polychrestorum insigni inopia laboremus. Quot quæso exoleta, drastringa, & inutilia occurrunt purgantia? quot vomitoria? quot diaphoretica? Jamdiu de hacce re con-

questi

questi sunt cordati Medici & purgans  
quoddam ad expellenda è Pharmacia  
inutilia & superflua desiderarunt. Ex  
horum Medicorum numero primas te-  
net *Ludovicus*, qui magno labore con-  
scriptum utilissimum librum de hacce re  
edidit. Quapropter juxta hujus du-  
ctum omnia, quæ Scopo Medici non sa-  
tisfaciunt, è Pharmacia expungi debe-  
rent, hoc enim modo non solum Tyro-  
nes facilius Materiæ Medicæ notitiam  
sibi comparare, sed & Practici facilius  
Praxin exercere possent. Remedio-  
rum hujusmodi farragini non solum  
Galanici, sed etiam Chymici quam ma-  
ximè ansam dederunt: quemadmodum  
enim illi, cum Botanicam exercere inci-  
perent, quasvis herbas, radices, fructus,  
Flores, Materiæ Medicæ inferebant, iis-  
que varias virtutes affingebant; ita & hi  
variis & superfluis remediis Officinas  
onerarunt: quæ enim farrago Aquarum  
destillatarum simplicium & composita-  
rum occurrit in Officinis? quot Essen-  
ciæ, quot Tincturæ, quot spiritus ibidem  
reperiuntur? quam pomposa nomina  
isdem affinguntur sæpissimè? cum ta-  
men remotis titulis remedia sæpius ne



hilum quidem valeant, Quot vanæ quoque in ipsa Chimia reperiuntur præparationes medicamentorum? hic hoc modo, ille alio, & iste rursus alio præparationem instituit: quilibet suam præparationem optimam esse clamat, cum tamen sæpius re rite ponderata omnes ad nihilum recidunt. Ut alia taceam.

Ex hæcenus E. dictis satis superque patere existimo, multa à Scopo Medicinæ aliena in Medicina contineri, quapropter etiam ad Medici-Scientiam eadem minimè referri debent. Si enim hisce allotriis superstruitur Praxis Medica, ea non potest non fallax atque dubia reddi, cum tamen si in ulla, in arte sane Medica certitudo requiratur. Si vero quidam sunt, qui Theoriam modernam utilem & Medico necessariam esse judicant, mihi dicant, cur plerique Practici se ex Theoria parum utilitatis percipere & Theoriam ac Praxin toto cœlo differre, conquerantur? nonne hæc querelæ quotidie audimus: *Das läßt sich in der Theorie wol hören / aber in der Praxi geht es viel anders her?* Dicant mihi unde ortum sit illud tritissimum: *Optimos Theoreticos pessimos esse Practicos?*

Red-

Reddant mihirationem, cur sæpius optimi Anatomici. Botanici & Chymici in Praxi sint infelicissimi? Ego sane comprehendere nequeo, cur bona Theoria in Praxi nullam habere debeat utilitatem? Theoria E. moderna aut bona est, aut mala: si bona est, in Praxi habebit usum; ast contrarium plerique Practici experiuntur, E. per consequens erit mala, & Medico Practico non necessaria. Verissimum hocce esse, ipse expertus sum: ex quo enim Medicinæ operam dare incipiebam, putabam subtilitates Physicorum Medico adeò necessarias esse, ut Medicus iisdem minimè carere posset: quare etiam summo cum fervore Physicam tractabam, & in particulas inquirebam, sæpius tamen ingenii infelicitatem deplorabam, quando hæc subtilitates plenarie comprehendere nequibam: nauseam veteres Medici exci-  
tabant, ideo quod Scripta eorum novitatibus & subtilitatibus Modernorum Physico Medicorum non referta deprehenderem: quoties Naturæ nomen in Scriptis antiquorum legebam, toties eorundem simplicitatem ridebam. Non deerant, cordati Practici, qui meas subti-

litates audientes me sæpius serio dehortabantur, ut hæcce inania mitterem & futuro Medico magis necessaria tractarem: inter hosce erant mei quondam Præceptores Viri Excell. Dn. D. Slevogtius Prof. Publ. Jenensis & Dn. D. Henningerus Prof. Academiæ nostræ Publicus: sed surdo narrabatur fabula: non sine indignatione eorum monita audiebam, ideo quod particularum charissimarum saccum mihi eripere conarentur: pergebam semper in tractandis meis minutiis, & tandem etiam Dissertatione publica de Usu Physicæ in Medicina sub meo præsidio habita sententiam meam defendere omnibus viribus conabar. In Medicina ipsa colligebam varias Authorum sententias, easque locis communibus inferebam: definitiones variorum Authorum in promptu habebam, ita ut petentibus easdem ab que hæsitatio ne recitare valerem: controversiæ mihi notæ erant, & summa cum voluptate contra aliorum sententias argumentabar: multorum diversas opiniones recensere poteram, propriam ignorabam. In Collegiis Practicis & Casualibus recensere quidem definitiones cum causiss

mor-



morborum, sed cum morborum historiam tum temporis ignorarem & hinc eam parum curarem, præcipuus meus labor scrupulosa causarum morbificarum & accidentium deductio ex principiis Physicis erat, quoniam hæc summè necessaria esse & Medicum verè nobilitare credebam. Cum porro miserimas interdum formulas à Medicis præscribi audirem, credebam principale Medici Practici requisitum esse scientiam componendi formulas ex tempore: quare non sine summo labore hanc desideratam Scientiam tandem acquirebam. Hinc perfectum me credens Medicum nil nisi Praxin amplam desiderabam, ut quilibet ægrotus eruditionis meæ fructus percipere posset: impossibile enim judicabam, eum, qui tam pomposa eruditione instructus esset, sine suo frustrari posse. Illud quoque reticere nequeo, me, ut eò felicius & facilius formulas conscribere possem, Materię Medicę sedulo incubuisse: Syllabum Materię Medicę Excell. Dn. D. Wedelii memorię mandabam: conferebam Macassi Promptuarium Materię Medicę: nihilominus tamen hæcce omnia ad Praxin

non adeò sufficientia credebam, sed adhuc ampliorem remediorum suppellectilem optabam. Sed cum postmodum varii ægroti curæ meæ se committerent facile percipiebam me hætenus oleum & operam perdidisse, omnes mei antea charissimi Phyci parum poterant, sed me miserum destituebant: nullus hic controversiis locus erat: dubius ubique ob defectum veræ notitiæ morborum hærebam: de morborum exitu incertus eram: remedia quamplurima sciebam, selectum nesciebam: & tandem tum temporis certissimum illud experiebar: *Novus Medicus novum cæmeterium.* Offerebantur mihi eo tempore Opera Baglivi, quæ cum seriò aliquoties perlegerem, plus scientiæ Medicæ pauco tempore, quam antea multorum annorum decursu acquirebam: juxta hujus monitum, (quod tamen alii jam monuerant) Veteres evolvebam & missis omnibus rationibus solum in historiam morbi, quam cum Baglivo Sydenhamius à Medico adeò seriò postulat, inquirebam, unde sensim sensimque me antea inutilia & à Scopo Medico quam maxime aliena non sine summo labore magnisque sumptibus

bus tractasse videbam. Paulo post ab amico quodam scripta quædam Dn. D. Stahlii Prof. Publ, Hallensis Celeberrimi communicabantur, quæ antea ob obscuritatem lectione indigna credebam: quibus perlectis tandem plenarie agnoscere cogebar, omnes meos superiores labores maximam partem irritos fuisse & Medicinam vulgarem innumeris nævis laborare: quare etiam ab eo tempore omnem meum eo dirigebam laborem, ut istos nævos detegerem, & ab iis in Praxi, quantum quidem possibile, mihi caverem.

Hæc mea erant fata in Medicina: ex quibus facile apparere potest, Theoriam illam pomposam & comptam, particulas, mechanismum, & nescio quid subtilitatis ubique crepantem ad acquirendam felicem Praxin minimè sufficere, sed longè alia incedendum esse viâ. Primus itaque ad felicem Praxin gradus est cognitio errorum tam in Theoria, quam in Praxi occurrentium: secundus verò prudens medendi methodus, modum vitandi errores docens: ex quibus postmodum successivè solida & vera fuit Theoria, Praxis felicitis basis & fundamentum.



De Erroribus in Medicina cognoscendis & vitandis sparsim quidem hinc indè scripserunt Practici, nemò tamen gravius de hâc re scripsit quam Celeberrimus Dn. D. Stahlius, quod ejus edita varia scripta abundè testantur, quibus uti apud malevolos invidiam, ita apud cordatos Medicos immortalis meritis est famam. In ejusdem Scriptis etiam passim Methodum Medendi certam, brevem & perspicuam invenies, & eo ipso errores, quos alii sæpissimè committunt, vitabis: quare non possum, quin non solum Tyronibus Artis Medicæ sed & ipsis Practicis lectionem Scriptorum Incomparabilis hujus Viri quam maxime commendem, quoniam viam ad solidam Theoriam & felicem Praxin sternunt. Nemo tamen credat me hæcce ex præconcepta quadam opinione aut invidia scribere: in Praxi enim quotidie utilitatem scriptorum Dn. D. Stahlii experior; & dum ejus scripta laudo, aliorum laboribus nihil detractum volo, sed quod apud alios scopo meo satisfaciens deprehendo, illud grata quoque mente in meum & ægrotorum commodum converto.

Quo

Quo verò eorum usus eò magis appareat, exemplis quibusdam Practicis rem demonſtrabo : primum fit Vomitus Cruentus: Femina 42. an. temperamenti sanguineo-Cholericì multorum liberorum mater , ab aliquot annis fluxum menſium regularem, cum varii generis accidentibus , in abdomine potiſſimum è manifeſtantibus, experiebatur, contra quæ varia uſurpabat remedia, quæ quidem aliquoties mitiora reddebant ſymptomata, ſed malum ſemper recurrebat. Tandem cum neſcio quam preſſionem præcordiorum cum horripilatione quadam ſentiret, credens hæc à cruditatibus bilioſis dependere , potionem laxantem ſumebat; ſed tantum abeſt, ut aliquis laudabilis effectus indè ſecutus fuerit, ut potius poſt aliquot inanes vomendi conatus ſanguinem magna in copia vomitu ejecerit : præſcribebantur varia remedia, vomitus tamen cruentus altero die redibat & per aliquot dies certis temporibus affligebat, tandem tamen debitis remediis ſiſtebatur. Conſultantur de hac materia varii Authores Practici, parum tamen, quod veram eſſentiam & cauſas hujus morbi concer-

nit , apud eos reperiebatur : tandem etiam evolvebatur Theoria Dn. D. Stahlii, quæ paulo ante in lucem prodierat, in qua totus affectus ita graphice depictus deprehendebatur cum omnibus antecedentibus , concomitantibus & consequentibus, ac si Celeberrimus ille Author ægrotantis lecto adstitisset. Testem hic habeo Virum Experientissimum Dn. D. Flach , uti alias Integerri- mum, ita in Praxi exercitatissimum & felicissimum , cujus & meæ curæ dicta ægrota concredita erat.

Alterum exemplum Practicum, quod paulo post mihi sese obtulit , adhuc magis probat Scriptorum Stahlianorum in Praxi Medica usum : Femina 55. anni Sanguineo Cholerici Temperamento Plethorica , postquam ab Anno ætatis 43. fluxum mensium non amplius ex-  
perta esset & continuo vitam sedentariam egisset, sensit ab eo tempore dolor in dorso versus os sacrum potissimum & interdum ad femur sinistrum tendentem ac indies ingravescentem. Suasu Medici usurpabat varia remedia contra calculum, sed sine ullo successu durabat dolor hicce per integrum quin-  
quem



quennium, & sæpius adeo augebatur, ut  
cedere nequiret ægrota.

Petebat tandem & meum consilium :  
explorabam omnia & facile quidem ex  
urina aliisque circumstantiis, dolorem  
huncce à calculo minime dependere  
colligebam : interim tamen nesciebam  
quorsum referri deberet : præscribe-  
bam varia aperientia, sanguinem inci-  
dentia interna, Unguenta, Emplastra  
&c. à quibus quidem interdum dolor  
imminuebatur, sed semper recrudesce-  
bat. Dolorum huncce ferè semper co-  
mitabatur inflatio abdominis, obstru-  
ctio alvi pertinax cum tenesmo. Ob-  
structionem alvi laxantia tollebant, sed  
postea alvus statim denuo obstrueba-  
tur. Carminativa inflationem abdomi-  
nis minime imminuebant, sed potius au-  
gebant. Incidebam tum temporis fortè  
fortuna in Dn. D. Stahlii Theoriam Me-  
dicam, & ex ejus Capite de Hæmorr-  
hoidibus facile colligebam, dolorem  
huncce cum reliquis symptomatibus ar-  
ctam connexionem habere cum hæ-  
morrhoidibus. Præscribebam hinc  
varia incidentia, laxantia & inter alia pi-  
lulas ex Extractis amaris & Gummati-  
bus

bus paratas, visurus an h. m. forsā hæ-  
 morrhoides referari possent. Ad im-  
 minuendam Plethoram Vena pedis ali-  
 quoties secabatur, nec omittebantur  
 scarificationes: dolor tamen, licet reli-  
 qua symptomata aliquo modo mitigat-  
 rentur, semper fixus permanebat. Tan-  
 dem Mense Decembri 1710. cum alvus  
 pertinaciter obstructa esset, subito corri-  
 piebatur dolore acutissimo, dextrum  
 potissimum abdominis latus occupante  
 & insigni abdominis inflatione. Injicie-  
 bantur hinc plures clysteres, abdomen  
 inungebatur Unguentis, & sacculi appli-  
 cabantur calidi, quibus spatio aliquot  
 dierum continuatis abdomen emolli-  
 batur, ac clystere purgante ope Syringæ  
 magno cum impetu injecto alvus ape-  
 riebatur. Sequebatur hinc copiosissimæ  
 materiæ putridæ per aliquot dies ex an-  
 excretio, quæ accuratius examinata ni-  
 nisi sanguis erat putridus: tandem resti-  
 tuebatur debitis usurpatis remediis. Sed  
 postea pristinus dolor in osse sacro re-  
 crudescbat, reliquaque symptomata  
 per intervalla affligebant. Præscribe-  
 bantur iterum varia remedia, juscula  
 herbarum, emplastra: plethora V. Se-  
 ctione

tionē & scarificatione imminuebatur :  
uadebatur quoque Hirudinum ad ve-  
nas hæmorrhoidales applicatio, quam  
amen respuebat, ut alia taceam. Se-  
quenti anno Mense Decembri alvus de-  
nuo pertinacissime obstruebatur, hor-  
rор ægotam invadebat cum subsequen-  
te calore & atrocissimis doloribus abdo-  
minis punctoriis. Clysteres statim inji-  
ciebantur, undè circa vesperam alvus  
aperiebatur & denuò magna materiæ  
putridæ admodum foetentis copia spa-  
tio 14. dierum excernebatur. Tandem  
cum alvi fluxus maximè urgeret, &  
egrota exinde admodum debilis redde-  
retur, præscribebam Mixturam ex aquis  
diaph. cum diascordio : undè alvus su-  
bito claudebatur, & eodem die sequeba-  
tur faucium inflammatio cum aphthis :  
alvus potione laxante ex tamarindis &  
manna aperiebatur & contra aphthas  
debite remedia usurpabantur, undè sen-  
sim sensimque restituebatur.

Hæc est brevis Affectus delineatio,  
de quo varios Authores Veteres & Re-  
centiores consulebam, prorsus tamen  
nihil, quod ad explicationem & veram  
indolem hujus morbi assequendam fa-  
ciebat,



ciebat, apud eos reperiēbam. Tandem cum in lēctione Dissertationum Stahlianarum ad eam quæ *de Hamorrhoidum Internarum Motu & ileo Hamatite Hippocratis* agit, prevenire, totum hunc ceffectum cum omnibus symptomatibus Cap. 3. accuratè descriptum deprehendebam. Alia exempla quamplurima Scriptorum Stahlianorum utilitatem in Praxi probantia silentio prætereo.

Quicumque E. Tyrones aliena in Medicina vitare, eaque sola, quæ ad solidam acquirendam Theoriam in Praxi utilem & necessariam faciunt, addiscere cupiunt, legant ante omnia Scripta Stahliana; nec metuant obscuritatem, quam quidam in iisdem deprehendere putant: cum enim longè alia incedat via ac alii, non potest non alienis principiis jamdudum imbutis obscurus videri. Sed posito aliqualem in iisdem observari obscuritatem, nonne satius ex maximè utilibus, licet difficilibus tempus impendere, quam talia, quæ quidem facilia sunt, sed in Medicina parum utilitatis habent, legere.

Remotis itaq; alienis dicendum restat, quænam sit solida Theoria, Medico adeo

ne-

necessaria : prius tamen objectionibus quibusdam, quæ contra hætenus prolata proferri possent, respondebo. Prima posset esse me Philosophiam, Mathefin, Linguas aliaque contemnere & Medicinam minus necessaria judicare & hinc studiosis illotis manibus Medicinam aggrediendiansam præbere. Verum enimvero quæ admodum mea intentio nunquam fuit, nec etiam in posterum erit quidlibet temere contemnere aut refutandi nomine aliquid proferre, ita etiam credo mihi libertatem in foro meo de iis, quæ ad me pertinent, libere sentiendi concessam esse. Cum itaque hætenus multa in Medicina tractari, quæ ad Medicinam propriè non pertinent, proprio damno expertus sim, quis mihi vitio verget, si aliena ista à Medica arte removeri cupio, & quoslibet, ut tempus iisdem diu non terant, admoneo. Philosophiam non contemno, sed quæ laudem in ea merentur laudo, & id saltem volo, eandem ad Medicinam non pertinere : si verò cui animus est Philosophiam ceu parergon aut etiam ex professo tractare, illud per me quidem licitum est, paucum tamen utilitatis exinde in Praxi expecta-

pectabit. Pariter si quis delectationis gratia Mathesi, Poësi, Historiæ, Geographiæ &c. operam dare cupit, non male aget: nihil tamen exinde hauriet, quod ad Scopum Medicum faciat. Nec Physicam scientiam jucundissimam contemno: dico saltē eam non esse Medicinæ basin. Concedo omnia hæcce pertinere ad bene esse Medici; sed quemadmodum Decens Ornatus, de quo integrum scripsit librum Hippocrates, pertinet quoque ad bene esse, revera tamen ad assequendum Scopum Artis Medicæ nil confert: ita etiam modo dictæ scientiæ, etsi Medicum ornent, ad sanitatem tamen tuendam aut restituendam nil faciunt. Ante omnia respiciendum est ad essentialia requisita Artis Medicæ, quibus postmodum ea, quæ Medicum ornant, addi possunt, non tamen hisce potior temporis pars terenda est.

Secunda objectio posset esse: Medicinam hoc modo reddi mere Empiricam; rationes enim omnium phænomenorum in Medicina occurrentium ex Physica, Anatomia & Chimia desumendas esse: sublatis E. hisce fundamentis Medicinam non amplius esse rationa-



tionalem, sed Medicos exercere non alio modo Praxin ac Agyrtas, als wie der verstorbene Hans Belten zu Bischheim / & purum putum Medicum qualem ego hactenus descripserim, esse purum putum asinum. Fateor objectionem hancce videri admodum insignem, si obiter tantum consideratur, sed si paulo penitus & attento animo in ejus robur inquiritur, facile liquet eam admodum esse cariosam. Certissimum quidem est, Medicinam debere esse rationalem, ast illud falsissimum est, ratiunculas illas, quæ vulgo ex Physicis & Chemicis proferuntur, esse illud, quod Medicinam vere rationalem reddere queat: Sine hisce enim Medicina nihilominus rationalis est: *quoniam ratio Medica non in fluctuantibus opinionibus, sed in vera atq; attenta omnium phaenomenorum ad scobum Medicum vere & directè pertinentium observatione, ac remediorum ad finem obtinendum necessariorum & convenientium debito tempore prudenti applicatione consistit.* Et hoc sensu omni tempore rationales vivere Medici & adhuc vivunt, licet subtilitates istas planè ignorent: imo hi alios, qui particulas peccantes ad unguem

D

enu-

enumerare, figuram delineare, earumque actionem, uti quidem putant, accuratissimè describere norunt, & nihilominus in tanta ratiuncularum copia irrationabiles sæpius sunt Medici, longè interdum superant. Miserrima sanè res esset Medicina, si fluctuantes ratiunculæ eam rationalem reddere deberent. Esse præterea omnium artium incertissima, quæ enim quæso certitudo diversorum Authorum hypothesebus inest, quibus Medicinam Rationalem superstruunt quod hic asserit, alter negat. Evolvam solummodo Dolæi Encyclopædiam Medicam & Chirurgicam, ubi quidem varias Authorum rationes invenies, quid autem omnes ad Rationalem Praxin conferant, cujusvis cordati Practicæ æquo judicio relinquo. Non obstantibus tamen inconstantibus & incertis Authorum rationibus Medicina est Rationalis & certa, talisque semper permanebit: de qua certitudine imprimis legi meretur Dn. D. *Stahl*ii *Programma de Certitudine Artis Medicæ*. An autem Medicus, qui remotis alienis, artis Medicæ cognitionem acquirere ac omnia ad scopum verum Medicinæ dirigere cupit

affi

asinorum classi inferendus sit, non absurdorum Criticorum, sed Virorum honestorum æque judicio relinquo.

Tertio loco posset quis objicere: remotis omnibus supra dictis parum in Medicina superesse: quod ego quidem quoad Medicinam vulgarem facile largior; quoad veram verò Medicinam & Praxin Clinicam Rationalem absolute nego: Multum enim superest; vera scil. consideratio Physica Corporis Humani, Pathologia cum vera Historia morborum, Prognosis, Cura methodica, verbo Ars, quam Hippocrates suam tempore longam vocavit: hic tot adhuc invenies, ut iis observandis Vita tua brevis minimè sufficiat. De Arte Longa itidem legi meretur antea allegati Dn.D. *Stablii Programma de Arte Longa.*

Tandem posset etiam quis objicere: me hætenus de variis nævis Medicinæ, de alienis ad Medicinam non spectantibus, de variis rationibus & misero Medicinæ statu varia protulisse, talem autem Medicinam, talemque miserum statum nuspiam locorum reperiri; quare aut falsissima esse hætenus prolata, aut locum, in quo talis misera docetur Medicina,

D 2

dicina,



dicina, nominandum esse. Ad quam tamen objectionem facilis est responsio: miseram Medicinam non in spatiis extramundanis, sed in omnibus iis locis quærendam esse, ubi nævi Medicinæ non agnoscuntur, ubi aliena ad Medicinæ scopum non pertinentia tractantur, ceu necessaria laudantur, Praxis Medica iisdem superstruitur, & juxta talia principia exercetur: ubi ad Praxin superficiali morborum cognitio sufficere, & præcipuum Medici officium in præscriptione formularum consistere creditur: morborum vera historia & nexus cum aliis morbis negligitur: ac tandem ubi ii, qui nævos Medicinæ declarant & Medicinam Medicinæ necessariam esse judicant, odio habentur, & Terentianum illud vertissimum *Veritas odium parit* experiuntur: Quo sane sensu misera hinc inde in multis Europæ locis erit Medicina, nec opus est, ut specialis quidam locus nominetur, quoniam etiam ubique adhuc cordati Medici reperiuntur, qui nævos Medicinæ agnoscentes, cum reliquis non sunt confundendi.

Denique objici etiam posset: hætenus prolata Stahlianismum sapere

Stah-

Stahliaua autem principia & scripta esse obscura, ad Praxin inutilia & hinc lectione indigna. Verum enim verò quamvis facile largiar, me hactenus prolata maximam partem ex Celeberrimi Stahlii scriptis desumfisse & ejusdem dogmata magni facere: ita nunquam concedam eadem esse ad Praxin inutilia, contrarium enim, uti superius jam monui, in Praxi quotidie experior & mecum alii experiuntur. Seponendæ sunt prius præconceptæ opiniones, postmodum vero cum attentione legenda sunt & intelligenda scripta Stahliaua ac tandem, si cum Praxi & quotidiana experientia collata fuerint, judicium de iis est ferendum: nam de nondum lectis, multo minus intellectis, iniquum ferre judicium, prudentis non est.

Hæc à Medicis objici posse puto: cum verò & alii interdum, qui Medicinæ nullam habent cognitionem, de Medicorum scriptis, judicium ferre soleant, & id quoque meis contingere posse facile prævideam: omnes istos criticos rogo, ut prius Medicinæ comparent sibi notitiam, ac postmodum de iisdem, quæ ad Medicum spectant, ferant judicium. Sin

verò nihilominus, ex quo nescio pruritu, aliena ab eorum foro contemnere & damnare gestiunt, habeant sibi Appellis: *Ne sutor ultra crepidam*: ut & illud Opificum, quando alii de eorum laboribus finistre judicare sibi præsumunt: *Der Herr versteht es nicht*.

Verum cum hujusmodi objectionibus diutius immorari tædiosum sit, paucis jam, quænam illa Theoria, ad Medicis scientiam & scopum pertinens, sit, videndum est. Puto autem apud plerosque Medicorum extra omnem controversiam positum esse, corpus humanum vivum, quatenus sanitatis & morborum capax est, Medicinæ subiectum esse, & eò etiam tendere omnem Medici laborem, ut Sanitas & Vita, quantum quidem possibile, in integritate conserventur & pericula Vitæ & Sanitati imminetia avertantur: morbi verò præsentēs methodo certa atque fida profligantur. Quapropter ipsa sana ratio dictitat: Theoriam Medicam unice occupatam esse debere in inquisitione Vitæ & Sanitatis, quantum scil. hujusmodi inquisitio scopo Medico inservit. Quibus etiam variorum motuum in statu p.n. occurrentium,



tium, ad conservationem tamen corporis tendentium, tractatio addi debet, ut appareat, quomodo etiam in statu p. n. præsentibus licet causis morbi cis, nihilominus corpus in vita conservetur: quo vero eo melius dilucescat hujusmodi corporis ad corruptionem admodum proni conservatio, quæ nil nisi ipsa vita est, paucis aliqualem Physiologiæ sciagraphiam subjiciam, cui itidem Pathologiæ delineationem subjungam.

Corpus humanum, si respectu elementorum suorum, ut & juxta experientiam ipsam consideratur, ad corruptionem putredinosam maximè pronum est. Constat enim ex subtili terra, plus vel minus ad falsedinem prona, pinguedine & aqua, quæ quidem aliquo modo cohærent, sed nihilominus facile iterum, dum nimis resolvuntur, diffiunt. Deinde etiam ipsa experientia quotidiana testatur, sanguinem humanum, imò totum corpus, exceptis solum ossibus, parvo temporis spatio in putrilaginem abire. Quibus addendum, quod alimenta, quibus corpus humanum nutritur, fere omnia ad fermentationem sint admodum prona, multasque sordes

putridas in corpore relinquunt, quod inprimis feces alvinæ aliaque excrementa testantur.

Quare summa necessitas principium quoddam activum requirit, quo hujus vivo concursu, separatio elementorum corporis & hanc subsequens corruptio putredinosa præcaveantur, ac heterogenea varia è corpore separentur & excernantur. Quem in finem variis hoc principium opus habet instrumentis: generale instrumentum est Motus, hic enim ubique in toto corpore observatur vivo, inprimis Circulatorius sanguinis: non tamen hic motus est ipsa Vita, sed tantum tanquam instrumentum ad Vitam concurrit: hujus enim ope humores ad varia corporis colatoria feruntur, ut ibidem varii humores excrementitii è massa humorum secernantur, & è corpore excernantur. Quamvis autem hæ secretiones & excretiones proxime ad vitam & conservationem corporis concurrant, non tamen sunt ipsa vita. Cum verò hoc ipso omnia heterogenea, quæ vel propius vel remotius læsionem corpori inferre, id quod ad putredinem disponere possint, remove-

moveantur, resultat tandem exinde Vita & Sanitas: ut itaque exinde re rite considerata appareat: *Vitam esse corporis mixti, ad corruptionem admodum proni, ope motus sanguinis circulatorii ut & secretionum & excretionum, in integritate conservationem.*

Quamdiu itaque heterogenea ista neque qualitate excedunt, tamdiu omnes motus placidè & absque ulla molestia procedunt, ac heterogenea etiam satis tranquille è corpore excernuntur. Pulsus cordis est admodum temperatus, nec etiam sensibilis mutatio in motu partium mollium tonico, à quo & pulsu cordis humorum motus dependet, observatur.

Quamprimum verò sordes in corpore tam quantitate quam qualitate excedunt, necessario etiam motus cordis reliquarumque partium, si corpus ab interitu vindicari debet, augetur, ut hoc modo heterogenea ad excretionem præparentur & per convenientia emunctoria excernantur. Undè quidem varii extraordinarii observantur motus, qui tamen, etsi non sine magna molestia contingant, non pro mere præternaturalibus, qui suppressi debeant, sed respectu

D 5

finis,



finis, potius pro salutaribus ad excretionem materiæ corpori noxiæ tendentibus sunt habendi : quare etiam si moderati sunt, non supprimendi, sed potius promovendi sunt, ut noxium eò facilius è corpore expelli queat : sin verò excedunt , impetus eorum moderandus est. Tales motus extraordinarii, ad vitæ tamen conservationem tendentes, sæpissime in hæmorrhagiis & sudoribus criticis, Coryza, Diarrhœa &c. observantur. In hisce casibus, si Medicus salutares hujusmodi Naturæ conatus perversa cura impedit , non possunt non varia mala exindè sequi, prouti experientia quotidiana satis superque testatur.

Quare autem tales motus extraordinarii in corpore instituuntur , in causa sunt varii humores quantitate vel qualitate peccantes, uti antea jam dictum fuit; adeoque hi motus non dependent à talibus materiis noxiis, sed propter eas fiunt , & sic salutarem habent finem. Omnium communissima causa, propter quam hujusmodi motus instituuntur, est Plethora sive abundantia sanguinis, quam cum pressio pede ejusdem sequatur spissitudo, stagnatio, plenaria stasis &

& tandem corruptio, necessario natura hisce malis obviam ire debet ; cum verò per simplicem colliquationem sanguinis in serum excrementium plethora non tam prompte imminui, & imminetia mala præcaveri queant , fatius est, sanguinem per convenientia loca evacuari: quem in finem motibus extraordinariis aliquo modo spasmodicis sanguis, qui in statu sano magis æqualiter distribuitur, magis versus has vel illas partes propellitur, ut ibidem promptè excernatur. Contingit id sine insigni molestia atque periculo in junioribus per nares, in viris verò per hæmorrhoides: majori verò molestia in juvenibus è pectore, in senibus verò per mictum cruentum, in feminis quoque per largiorem mensium & lochiorum fluxum & majori cum periculo per vomitum cruentum: quamvis sint, qui interdum ex vomitu cruento ne minimum sentiant vitæ periculum.

Succedentibus hoc modo debita in quantitate hæmorrhagiis, parum incommodi sentiunt ægroti, quod si verò præsentibus talismodi motibus hæmorrhagiæ non succedant, sanguis circa loca

ca ista, per quæ eruptio fieri debebat, stagnat & spissescit, undè varii in dictis partibus sentiuntur spasmodici dolores: aut tandem planè corrumpitur, quale quid contingit in Inflammationibus: undè sæpius ad præcavenda graviora mala sanguinem effundi in hæmorrhagiis, quam cum graviore damno corrumpi, satius est.

Similiter in febribus magnus variorum motuum apparatus cernitur, qui omnes eò tendunt, ut materia corpori noxam minitans corrigatur & expellatur, undè etiam motus hi sunt admodum constantes. Augetur autem in febribus potissimum motus cordis ut & motus tonicus partium mollium, quod in primis in febre tertiana manifestissime conspicitur: in horrore enim, ope motus tonici, cuti & partes subjacentes constringuntur, ac similiter etiam pulsus cordis augetur quam maxime; cum in finem ut ope horum motuum eò facilius materiæ febrilis excretio contingere queat: undè facile apparet, motus hosce non esse adeò tumultiores, naturæ incognitos & prorsus p. naturales: sed tendere ad certum & corpori salutarem finem,



finem, ac proinde ante sufficientem materiæ febrilis (sive in primis viis sive in ipso hæreat sanguine) excretionem non esse supprimendos : quoniam alias vel facile recrudescunt , vel in graviores morbos , ægrotis sæpius inñestos, convertuntur.

Sed ne nimis prolixus sim in describenda Physiologia & Pathologia Medica: reliquâ propriis locis, ubi fusius & fundamentaliter de iisdem agetur, reservo. Puto tamen ex paucis hisce satis elucescere, ad Praxin feliciter exercendam paulo alia opus esse Theoria, quam vulgari, quæ vel salibus, vel nescio quibus particulis, superstructa est, ac proinde in ipsa Praxi parum utilitatis habet. Natura E. potius sequenda est, & juxta ejus ductum Theoria est formanda, sic enim exinde vera Physica Hippocratica, quam libro de sterilibus Medicis sequentibus verbis commendat : *Conare ut Physicus sis, ad hominis habitum ac robur respiciens*: resultabit. Imo certissimos etiam quilibet juxta hancce Theoriam Physicæ & Medicinæ limites inveniet : ubi enim desinit hæc Theoria & Physica Medica, ibi statim incipit Medicina.

Huic

Huic E. Theoriæ (ut absolvam ea quæ ad Medici scientiam pertinent) postmodum superstrui debet Pathologia Clinica & Therapia sive Methodus Medendi Rationalis. Quod autem Pathologiam Clinicam concernit, per eam nil nisi historiam quorumcunque morborum Pathologicam cum omnibus accidentibus tam propriis quam communibus; ut & exitum tam salutarem quam funestum intelligo: quamvis suo modo etiam ad Theoriæ Partem Pathologicam spectet, & sub ea commode complecti possit hæcce Pathologia. In hacce ante omnia omnes in universum morbi in certas classes redigi debent, prorsus, eadem industria ac Botanici omnes v. g. Veronicæ species sub certo genere complectuntur: sic enim generalem statim omnium morborum in eadem classe contentorum habebimus notitiam. Postmodum singuli morbi specialiter sunt tractandi, & videndum 1. an certis ætatibus sint proprii, an verò aliis quoque communes? 2. quomodo morborum symptomata respectu temperamentorum ratione gradus & vehementiæ inter se differant? 3. quænam sint causæ

causæ eorum veræ? 4. quænam symptomata singulis speciebus sint propria & specificè ab aliis morbis distinguant? 5. quænam symptomata morbum præcedant, quænam concomitentur? 6. quamdiu durare soleat quivis morbus specialis? 7. quis sit exitus ejusdem an salutaris, an funestus? 8. an per crisin solvatur? 9. an in alios & in quos convertatur morbos? 10. quomodo & per quas vias illa fiat mutatio? & quæ sunt alia. Hoc sanè modo si omnes morbi specialiter considerantur, & pertractantur, summa acquiritur scientia in praxi uti iissima; Diagnofis enim & Prognofis specialis fingulorum morborum, quæ Medicum reddit *ισοθεος*, in hac ipfa continentur, & poteris h. m. cognito morbo statim omnes ejus mutationes & exitum prædicere. Talem Medicam scientiam si defideras, legas imprimistales Authores, qui de Historia morborum scripserunt, è quorum numero sunt *Baglivus*, *Medici Uratislavienses* & quem primo loco nominare debuiffem, celeberrimus *Dn. D. Stahlius*, in cujus *Theoria Medica Part. II.* ejusque editis scriptis variis omnia hæcce uberrimè invenies. Cum verò



verò maxima pars ejus Scriptorum plerisque incognita sit, sub finem hujus introductionis eorundem Catalogum subnectam. Ad Historiam morborum Clinicam comparandam maximè inserviunt Observationum scriptores, inter quos primum sane locum occupat *Petrus Forestus*, cujus observationes tanta diligentia & industria conscriptæ sunt, ut merito ab omnibus Medicis in summo debeant haberi pretio.

Hoc posito fundamento facilior longè est ipsa Therapia, quam si adeò crude & superficialiter tractatur Pathologia. Crudam meritò appello eam Pathologiam Medicam, quæ definitione morbi hujus vel illius Authoris, paucis symptomatibus historiam morborum parum locupletantibus, scala causarum morborum metaphysica, physica verò, at parum ad Medicum scopum pertinente, causarum explicatione contenta est. Longè alia opus est Pathologia ad felicem Therapiam, qua si quis destituitur, non potest non sæpissimè sine suo in praxi privari; inter Pathologiam enim Medicam & Therapiam indissolubilis debet esse nexus.

Qua-

Quapropter quilibet , qui feliciter in Praxi sine suo potiri cupit , id agere debet , ut solida potiatur Pathologia : quam deindè etiam solida & rationi medicæ quotidianæ experientiæ satisfaciens Therapia excipiat. In Therapia autem 1. Medicus sollicite inquireat , an morbus qui ei curandus offertur, à Natura unquam spontè curatus fuerit: si enim nullibi aliquod curationis spontaneæ occurrit exemplum , oleum atque operam perdet Medicus, etiamsi omnia in officinis occurrentia remedia applicet. Naturam præeuntem sequi debet Medicus , cujus est minister, cujus semitam si deseruerit , finem nunquam assequetur. 2. Inquirere debet in methodum , qua Natura in oblato morbo usa est: an scil. simplici humorum correctione & insensibili evacuatione , an vero sensibiliiejectione per alvum, urinam, diaphoresin &c. eundem curaverit? quam methodum si sollicita inquisitione invenerit , habebit arcanum quoddam ad morbos curandos non summe tantum necessarium, sed & maximè utile. 3. Perpendat an motus, quibus Natura ad debellandum morbum utitur, E . . . . . sint

sint sufficientes, an verò excedant, velle deficiant? si sufficiunt, satius est esse spectatorem Naturæ, quam intempesta remedium præscriptione ejusdem actiones turbare. Undè aurea sunt verba Sydenhamii de Variolis Opusc. p. 177. *Natura enim sibi permissa negotium suum suo tempore exequitur, materiamq; debito ordine accipit, tum secernit, tum etiam expellit, ut (in junioribus præsertim vegetisq; temperamentis)* NB. nostra ope, nostris artificiis atq; auxiliis non indigeat, suis viribus optimè instructa, suis opibus locuples, suo deniq; ingenio satis edocta. Hæc verba etsi à Sydenhamio ad Variolas tantum applicentur, locum tamen in aliis quoque affectibus inveniunt & optandum esset, ut Medici interdùm à remediis abstinere in affectibus variis, ubi Natura per varios motus aliquid expellere nititur, sic enim non sequerentur funesti effectus. Sed cum juxta vulgata in Medicinam omnes hos motus pro mere præter naturalibus habeant, vix hujus opinionis remedia contra hosce salubres Naturæ motus præscribere coguntur. Nunquam sistendi & impediendi, sed, si deficiunt, potius promovendi sunt motus Naturæ: ubi verò excedunt;



dunt, quantum quidem possibile est. re-  
frenandi & ad mediocritatis statum re-  
ducendi sunt. 4. Consideret necesse est  
Medicus Practicus, an ad scopum, quem  
Natura intendit, assequendum, sufficien-  
tibus instructus sit remediis? sæpius  
enim Medicus Naturæ scopum quidem  
intelligit, debitis tamen destituitur re-  
mediis: quare non in usualibus tantum  
acquiescere, sed ulterius semper in alia  
polychresta scopo Naturæ satisfacien-  
tia inquirere debet, etiam si interdum  
eorum præparatio ipsi ignota sit; suffi-  
cit Medico, si eadem experientia pro-  
bata sunt, & ad finem assequendum suffi-  
ciunt: ita e. g. quamvis vera Pilularum  
Stahlianarum præparatio hætenus ne-  
mini nota fuerit, quilibet tamen easdem  
absque ullo scrupulo iis in casibus ubi à  
Celeberrimo Authore laudantur, sum-  
mo cum fructu ægrotis exhibere pote-  
rit: idem iudicium de remediis Orpha-  
notrophii Hallensis, si non omnibus, ali-  
quibus tamen esto: expertus loquor. Si  
verò quis iisdem nec fidem adhibere,  
nec eadem ægrotis exhibere voluerit, id  
cuilibet licitum erit: aliis & mihi sufficit,  
remedia longo usu in diversis climati-  
bus

bus probata & polychresta non posse contemni, nisi fida & absque invidia instituta experientia, talia remedia ad eundem, quem Authores prætendunt, finem minus sufficientia esse, probetur: verbo: Fiat prius experimentum & postea sequatur iudicium. 5. Abstineat autem Medicus prudens ab omnibus remediis tam drasticis, quam propter noxas subsecuturas suspectis: priora enim sensum Naturæ nimis irritando gravissimos motus sæpissime excitant: posteriora verò nisi cautiissime & summa cum circumspectione in certis tantum casibus exhibeantur, non solum præsentissimo vitæ periculo interdum ægrotos exponunt, sed etiam sæpissime: gravioribus aliis malis portam pandunt: quare ab utrisque abstinere, quam cum ægrorum periculo & famæ detrimento eadem præscribere præstat, nisi necessitas urgens, talia postulet. Ad priorem classem merito referuntur Vomitoria, & Purgantia drastica, ut & Volatilia: ad posteriorem verò Adstringentia & Opitata. Quam enormes errores Vomitoriis & Purgantibus ab iis, qui ægrotantium animas mercari didicerunt, committantur,

exparientia quotidiana loquitur. Hinc videmus ægrotis vomitoria, quæ rectius venenorum quam remediorum classi inferenda essent, quotidie exhiberi & dum animam ferè ipsam è corpore expellunt, pecora à foro Medico aliena, purgationem laudabilem ex sedum numero metientia, credunt se omnes impuritatem è corpore expulisse: sæviunt sane hujusmodi medicastrum in viscera hominum eosque impunè occidunt. Quadrant in hosce verba in *Histor. Morb. Vratislav. Anno 1699. p. 123.* occurrentia: *Tantus est horum hominum & stupor, & quæ hujus germana est, arrogantia, ac bruta temeritas, ut non monitis salubribus, quæ alio contemnunt supercilio, ad frugem reduci possint, sed multis, carceribus, à perdemdis hominibus maturè evocari mereantur. Infamia patrant latrocinia, quoties hi suis vehementissimis purgantibus, mulieres ex mensium suppressione, hydropicas, quas deobstruentibus à sarcina hac liberare, nobis mos est, tractant, quoties ab alio morbo, vix leviter, respirantes, suis secretis (nugis nugacissimis) torquent, cum iis cordati Medici digestivis & aperientibus subvenire possent.* Quamvis autem hi magnos errores ex crassa ignorantia committant,



non tamen credendum est, hosce solos esse, qui contra Rationem Medicam peccant, non pauci enim Medicorum quoque reperiuntur, qui non leves errores committunt, ac vel purgantia draastica præscribunt, vel ubi evacuatione non est opus, aut ubi prorsus noxia est, nihilominus cathartica exhibent: unde etiam illud vulgi, abusus hosce observantis, natum est: *Was soll ich beym Doctor thun / er verschreibt mir ja doch nur eine Purgas.* Sed manum de tabula, quia materia est odiosa. De Volatiliis Adstringentium & Opiatorum vero usu & abusu alibi erit sermo.

Hactenus prolata sunt ea quæ Medici qua Medici scientiam concernunt: cum verò præterea etiam variæ in partibus solidis occurrant læsiones, quæ curationem postulant, necessariò etiam Medicus id agere debet, ut scientiam læsionibus hisce prospiciendi acquirat, verbo Chirurgus sit. Intelligat autem non solum Chirurgiam Pharmaceuticam, Medicam in Praxi quotidiana maxime necessariam, sed & instrumentalem, quo in casu necessitatis actiones Chirurgi dirigere, vel ipse manus applicare queat: hæc enim

enim pars Medicinæ uti antiquissima, ita  
& nobilissima est. Sed dolendum est,  
eam à Medicina abruptam, non solum à  
multis Medicorum vel prorsus non, vel  
admodum negligenter, sed & ab ipsis  
Chirurgis supericiarie tantum tractari.  
Illi enim existimant, Chirurgiam non  
amplius ad Medicinam spectare, & ideo  
propriis magistris relinquendam esse:  
hi verò, etsi satis magnificè de arte sua  
sentiant, & hinc in quibusdam locis à  
Tyronibus suis Principes, *Lehr-Prinzen*  
vocari velint, (quam ob causam tamen  
ab *Ammanno in Parænesi* p. 340. eorum  
Principatum vel in Utopia, vel Mor-  
pionopoli quærente, falsè perstringun-  
tur) miseram tamen habent artem, non  
quidem ob vitium ipsius artis, sed ob  
culpam artificum ipsorum. Multi enim  
tondendis barbis, secandis venis, aliisq;  
vulgaribus rebus intenti sunt, in opera-  
tionibus verò Chirurgicis eosdem ho-  
spites esse experientia docet: qui ipsi  
tamen se perfectos in arte sua credentes  
ad ipsam Medicinam aspirant, & non  
solum Praxin ipsam exercere, sed & de  
actionibus & curationibus Medicorum  
judicium ferre, ac clanculum easdem su-

gillare sibi præsumunt : quam lepida autem illa sit Praxis , ægroti, dum artificis errorem terra tegit, experiuntur: credunt fortasse artem Medicam eadem facilitate ac Chirurgiam, hodiernis temporibus ad tonstrinam damnatam, addisci posse, sed falluntur quam maxime; altior enim res est Medicina, quæ cultrum rasorium longe transcendit: quare quemadmodum Appelles futoris iudicium tritissimo illo, Ne futor ultra crepidam, rejecit, ita liceat etiam paucis mutatis hujusmodi nasutulis dicere: Ne rasor ultra barbam. Impendant potius tempus in propriam artem, inque ea quotidie se exerceant, legant Authores Chirurgicos, inquirant in remedia fida & polychresta, acquirant sibi non cognitionem tantum, sed & habitum in operationibus: verbo, toti sint in eo, ut artis suæ plenariam acquirant cognitionem, & si forsan opera habent supererogationis, ea Rasoribus, hinc inde in pagis degentibus, quorum scientia cultrum rasorium rubigine obductum & ollulam axungia canis repletam, vix transcendit, communicent. Ridiculum enim, non dicam absurdum est, propriam faciliorem



rem artem negligere, alienam verò longè difficiliorem, ad quam tamen subsidia necessaria desunt, exercere velle. Mihi sane, quamvis Medicinam spatio octodecim annorum jam tractaverim, nullum tempus alienis rebus impendendum superest, sed quotidie ad acquirendam maiorem cognitionem libris affixus hærere cogor, ne quis me in hoc vel illo defecisse objicere possit; quantum enim est quod scimus? aut quantum quod ignoramus. Sed obijcient forsan nonnulli, Chirurgis licitam esse Praxin Medicam, ideò quod multis in locis imprimis ubi nulli Medici reperiuntur, Praxin exerceant, eamque optimè intelligant, ac Medici quoque Chirurgiam exerceant; quapropter ip-sis aliorum exemplum sequi & contra Medicos jure talionis uti licitum esse.

Ad quæ tamen facilè responderi potest, certum quidem esse Chirurgos hinc inde ob defectum Medicorum Praxin Medicam exercere, an vero eam intelligant dubium est; aliud enim est Praxin exercere, aliud eam intelligere: optimum quidem est & maxime utile artificii exercitium, sed præsupponit Theoriam suf-

ficientem: ubi enim fundamentum est fragile, facile totum, quod ei superstruitur, corrui t ædificium. Sed sit ita, Chirurgos iis in locis ubi Medici non reperiuntur, simul Praxin exercere, quam futilis autem est consequentia: si Chirurgis iis in locis ubi Medici desunt, Praxin exercere licitum est, E. & mihi hic vel illic, ubi tamen multi & exercitatissimi reperiuntur Medici, idem facere licitum erit. Sed respondebis forsan te callere artem Medicam, te intelligere Praxin, te esse Anatomicum, te in castris Praxin exercuisse, te jam à longo tempore vendidisse vomitoria, purgantia &c. & ideò tibilicitam esse Praxin Medicam. Sed scias distinguendum quam maximè esse inter scientiam veram & imaginariam; juxta hanc te Medicum esse credo, juxta illam vero minime. Ratio contra te pugnat, experientia de tua scientia loquitur. Quinam tui fuere in Medicina Præceptores? ubinam Theoriæ & Praxi operam dedisti? in Utopia forsan aut spatiis extramundanis, ubi vastissimum illud regnat vacuum sive inane, ex quo sine dubio tuam compilasti scientiam. Esne *αὐτοδίδακτος*? rara sunt in Medicina ho-

horum exempla. Natura opus est, doctrina, institutione à puero, loco studiis apto, industria & tempore: monstra mihi hæc requisita Hippocratica & eris mihi magnus Apollo. Forsan calles latinam linguam? multi dantur Latini, qui tamen ideò non sunt Medici. Exercuisti Praxin, dedisti remedia; quo fato? terra tuos tegit errores. Sed objicies porro te jure talionis uti contra Medicos, falcem in tuam messem mittentes: egregia objectio! Medicos non intelligere Chirurgiam: Papæ! quam belle? Nonne Chirurgia est antiquissima Medicinæ pars? quomodo E. Medicus, partem ad Medicinam spectantem tractans, falcem in alienam messem mittere dici potest? Si Chirurgia ad Medicos non spectat, cur in casibus gravioribus Medici vocantur? cur tot prostant Decisiones Facultatum in casibus Chirurgicis: nonne Chirurghi à Medici examinantur? Ast respondebis jura integrarum Facultatum non confundenda esse cum privilegiis reliquorum Medicorum: ast inanis responsio: nonne quotidiana docet experientia, Medicos in casibus Chirurgicis esse non tantum Chirurgorum comites,



tes sed etiam juxta nutum eorundem curationem institui? nonne etiam iis in locis, ubi Academiae non sunt, Medici Chirurgos examinant? Ergo sine dubio ad Medicinam quoque pertinet Chirurgia, & Medici in ea non sunt hospites. Medici manus non applicant, sed tantum necessaria praescribunt, & etiamsi manus applicarent, anne alienum quid agerent? sed dices, legibus publicis id prohibitum esse: ast scias, easdem leges tibi Praxin Medicam prohibere & satius esse Medicos Chirurgiam intelligentes eandem exercere, quam Chirurgos in arte Medica hospites Praxin aspirare. Sed satis de hac re odiosa.

Ex haftenus dictis satis apparere potest, quam plurima adhuc, remotis licet alienis & superfluis, superesse, quae ad Medici scientiam pertinent. Quivis E. id agere debet Tyro, ut veram scientiam sibi comparat, qua comparata nullum dubium est, quin quilibet Praxin feliciter fit exerciturus, nec h. m. ulla fortuna opus est, quam adeò anxie & Medici nonnulli optant & vulgus ipsis apprecatur: *qui enim sic Medicinam novit* (ut loquar cum Hippocr. de Loc. in Hom. §. 58.)

minimè fortunam respicit aut expectat, sed & contra fortunam & cum fortuna recte faciet. Et quis Medicorum vagam expeteret fortunam, cum ipsi Ethnici saniores adeò parum ipsi tribuerint, ac eam sine oculis, sine iudicio & sine prudentia esse affirmaverint. Praxin sanè sine oculis, sine iudicio & sine prudentia exercent, qui fortunæ ope ægros curare satagunt. Nulla fortuna Medico rectè agenti, sed benedictione divina opus est, quam ii, qui eam debitis adhibitis mediis ad sanitatem tuendam & restituendam necessariis, à summo rerum Conditore precibus petunt, expectare debent: illi autem, qui neglectis mediis necessariis Praxin aggrediuntur, temerarii sunt, & temeritatis aliquando graves luunt poenas. Egregia sunt verba Hippocratis quibus *Lib. de Loc. in Hom.* claudit: *mibi enim soli hi fortunatè assequi, itemq; infortunatè non assequi videntur, qui rectè quid & malè facere sciunt. Fortunatè enim assequi, est rectè facere: hoc autem qui sciunt, faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non rectè faciat. Indoctus autem qui est, quomodo fortunatè assequi possit? si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sanè successum habebit.*

*Qui*

*Qui enim non rectè quid facit, non fortunatè assequi poterit, cum reliqua, quæ æquum est facere, non faciat.* Fortunam E. idiotis, curas fortuitas, die Glücks-Curen / magis quam rationales æstimantibus relinquamus, & potius veris ad finem tendentibus mediis utamur, quo veram atque fundamentalem Medicinæ cognitionem acquiramus, sic enim non solum boni Practici erimus, nec opus habebimus, ut variis technis atque blanditiis favorem muliercularum quæramus, quæ ad amplam perveniendam Praxin nos hinc inde commendent: vera enim atque fundamentalis Medicinæ cognitio Medicum satis superque commendat.

## CATALOGUS

*Scriptorum Stahlianorum quem supra promisi, est sequens.*

### PARS I.

## DISSERTATIONES Medico Physiologicæ.

1. De Motu Tonico Vitali.
- 2.-- Mechanismo motus sanguinis progressivi.
- 3.-- Æstu Maris Microcosmici.



- 4.-- Mechanismi & Organismi differentia.
- 5.-- Differentia Mixti & vivi.
- 6.-- Motibus humorum spasmodicis.
- 7.-- Intemerata pulsus celeris & frequentis differentiae veritate.
- 8.-- Temperamentis.
- 9.-- Sanguificatione.
- 10.-- Vita.
- 11.-- Mortis Theoria.

## PARS II.

## DISSERTATIONES

## Pathologico - Therapeuticae

generales.

1. De Arcendis alienis à Medica Doctrina.
- 2.-- Medicina Medicinæ necessaria.
- 3.-- Fundamentis Theoriæ Medicæ.
- 4.-- Pathologiæ fundamentis practicis.
- 5.-- Novitatibus Medicis in genere.
- 6.-- Infrequentia morborum personali.
- 7.-- Frequentia morborum in homine præ brutis.
- 8.-- Morbis ætatum.
- 9.-- Morbis corruptis.
- 10.-- Morbis habitualibus.
- 11.-- Morbis periodicis.
- 12.-- Morbis hæreditariis.
- 13.-- Morbis incurabilibus.

14. -- Facie Morborum indice.
15. -- Passionibus animi corpus alterantibus.
16. -- Consuetudinis efficacia.
17. -- Sanguinis temperie.
18. -- Curatione æquivoca.
19. -- Sanatione per accidens.
20. -- Medicina sine Medico.
21. -- Empiria Rationali Medica.
22. -- Autocratia Naturæ.
23. -- Naturæ Erroribus medicis.
24. -- Erroribus medicinæ Practicæ.
25. -- medicinæ & Chirurgiæ perpetuo nexu.

## PARS III.

## DISPUTATIONES.

## Pathologico - Practicæ

## speciales.

1. De Februm Pathologia & Therapia problemata generalia.
2. -- Februm Historia in genere.
3. -- Febris Rationali ratione.
4. -- Febr. Pathologia.
5. -- Febr. Therapia.
6. -- Febre Tertianæ.
7. -- Febr. biliofis.
8. -- Febre petechiali.
9. -- malignitatis Natura.

10. -- V. S. in Febribus acutis.
11. -- Inflammationibus Pathologia.
12. -- Abscessu & Furunculo.
13. -- Phthisi.
14. -- Cancro.
15. -- Vena Portæ porta malorum.
16. -- Motu sanguinis hæmorrhoidali.
17. -- Motu Hæmorrhoidum internarum  
& Ileo Hæmatite Hippocratis.
18. -- Mensium insolitis viis.
19. -- Hypochondriaco hysterico affectu
20. -- Hydrope, Ascite præcipuè.
21. -- Scorbuti & Luis Venereæ differen-
22. -- Spasmi. (tia.
23. -- Podagra.
24. -- Calculo renum.
25. -- Intestinis.
26. -- Adeptiagia.
27. -- Dysenteria.
28. -- Mensium muliebrium fluxu s. n. &  
suppressione p. n.
29. -- Abortu & foetu mortuo.
30. -- Puerperarum affectibus.
31. -- Infantum affectibus.
32. -- Oculorum affectibus in genere.
33. -- V. S. patrocínio.
34. -- V. S. in pede.



- 35.-- Sanguifugarum utilitate.
- 36.-- Alterantibus & specificis in genere.
- 37.-- Lumbricis terrestribus.
- 38.-- Febre Hæctica.
- 39.-- Requisitis bonæ nutriticis.
- 40.-- Calculorum generatione.
- 41.-- Ægro Hæmoptysi laborante.
- 42.-- Vitro Antimonii.
- 43.-- Lapide Manati.
- 44.-- Phlebotomia.

Hicce accessit Tomus alter indice locupletissimmo, uti prior, instructus : continet autem sequentes Dissertationes.

- 1. De Sciagraphia Physiologiæ.
- 2.-- Fundamento Moralitatis personalis in sanguine.
- 3.-- Sciagraphia Pathologiæ.
- 4.-- Emendantæ Historiæ Clinicæ fundamentis.
- 5.-- Teneris ægris.
- 6.-- Metaschematismo morborum.
- 7.-- Consilio Medico.
- 8.-- Minore malo medico.
- 9.-- Paradoxis Medicis præcipuis.
- 10.-- Proportionem humorum ad motum.
- 11.-- Periodis acutarum sine criseos eventu exquisitis.

- 12.-- Curatione morborum è fundamen-
- 13.-- Methodica Curatione. (to.
- 14.-- Abſtinentia Medici.
- 15.-- Therapia ſani corporis.
- 16.-- Attentione Medico Practica.
- 17.-- Cynofura Therapias. (tica.
- 18.-- Præparatione corporis Therapev-
- 19.-- Miniſterio artis Naturæ ſalutariter  
adhibendo.
- 20.-- Reſtitutione ſanitatis in integrum.
- 21.-- Decubitu humorum.
- 22.-- Morbis conſequentibus.
- 23.-- Officio Medici circa caſus chirur-  
gicos.
- 24.-- Uromantiæ & Uroſcopiæ abuſu  
tollendo.
- 25.-- Viribus.
- 26.-- Febribus ſecundariis.
- 27.-- Febre Catharrhali maligna.
- 28.-- Febre Hectica abſceſſuum interno-  
rum comite.
- 29.-- Febre lethifera Hippocratis.
- 30.-- Variolis & morbillis.
- 31.-- Febribus compoſitis ex acuta perio-
- 32.-- Acrifia in Febribus. (do.
- 33.-- Methodo malignas febres ſecun-  
dum rationem & experientiam  
tractandi.

34.-- Morbis acutis Veterum.

35.-- Rhevmatismo.

36.-- Animi morbis.

37.-- Affectibus gravidarum.

38.-- Flatulentia.

39.-- Cachexia.

40.-- Affectibus Pectoris.

41.-- Curationibus Castrensibus.

42.-- Sterilitate feminarum.

43.-- Motus sanguinis à crasi & viis non  
pendentibus vitiis prudenter  
tractandis.

44.-- Fine Mensium initio morborum  
variorum opportuno.

45.-- Regimine.

46.-- Adstringentium cauto usu.

47.-- Impostura Opii.

48.-- Diæta.

49.-- Motus voluntarii usu Medico.

50.-- Multitudinis remediorum abusu.

Hiscæ Dissertationibus hinc indè annexa sunt  
varia Programmata, in Praxi quoque admo-  
dum utilia, quorum sequentia mihi videre  
licuit.

I. De Anomaliis motuum vitalium pa-  
theticis non tumultuariis.

a.-- Periculo nonæ diei in acutis.



- 3.-- Novo specifico antiphthifico Equitatione.
- 4.-- Morbis Aulicis.
- 5.-- Opinionibus Medicis.
- 6.-- Bono Theoretico & malo Practico.
- 7.-- Testimoniis Medicis.
- 8.-- Autoritate & Veritate Medica.
- 9.-- Synergia Naturæ in medendo.
- 10.-- Temeritate, Timiditate, Modestia & Moderatione Medica.
- 11.-- Logica Medica.
- 12.-- Constantia Medica.
- 13.-- *Περὶ Φύσεως ἀνωιδιυλῆ.*
- 14.-- Consulta utilitate Hæmorrhagiarum.
- 15.-- Differentia Rationis & Ratiocinationis & actionum quæ per & secundum utrumque horum actuum fiunt in negotio vitali & animali.
- 16.-- Paralogismo proportionis figuræ pororum secretiorum.
- 17.-- Arte longa.
- 18.-- Dissensu Medicorum.
- 19.-- Æstimatione partium & læsionum.
- 20.-- Apostaseos & Apostematis differentia.

- 21.-- Historia Medica Practica.
- 22.-- Morbis Contumacibus.
- 23.-- Stochasmo Medico.
- 24.-- Fluxus menstrui quatenus menstrui causa.
- 25.-- Curatione in charta.
- 26.-- Cephalalgia Iliaco-Hæmatitica.
- 27.-- Certitudine Artis Medicæ.
- 28.-- Commotione Sanguinis translatoria & eluctatoria.
- 29.-- Philosophia Hippocratis.
- 30.-- Fistula lacrymali.
- 31.-- Commotionibus Sanguinis activis & passivis.
- 32.-- Visitatione ægrorum.
- 33.-- Sterilitate feminarum per ætatem.
- 34.-- Methodo Medicandi.
- 35.-- Cornu Cervi deciduo.
- 36.-- Scarificatione narium Ægyptiaca.
- 37.-- Criterio Experimentorum Medicorum.
- 38.-- Fidis Remediis.
- 39.-- Intempestiva assumptione medicamentorum.
- 40.-- Judicio difficili.
- 41.-- Privata dispensatione medicamentorum.

- 42.-- Isagoge Practica.
- 43.-- Historia Pathologica affectuum  
cum Coxarum dolore symboli-  
zantium Hippocratica,
- 44.-- Historiæ morborum Criterio.
- 45.-- Casibus Medicis Practicis.
- 46.-- Medicis è Pharmacopolio.
- 47.-- Experimento fallaci.

Programmata, ut & Dissertationes, quæ hætenus  
prodierunt, nondum vidi. Reliqua Scripta  
Stahlina sunt.

- 1. Theoria Medica vera.
- 2. Menses.
- 3. Observationes Physico Chymicæ.
- 4. Zymotechnia fundamentalis.

Hæc sunt itaque lectissime Tyro Scri-  
pta Stahlina, quorum lectionem fre-  
quentem & quotidianam tibi quam ma-  
ximè commendo, quæ si in succum &  
sanguinem, quod ajunt, converteris, ma-  
gnum in Praxi habebis thesaurum. Noli  
itaque credere iis, qui lectionem eorun-  
dem, ob nescio quas futes rationes, tibi  
dissuadere conantur: cordatis enim  
Practicis, quid utilitatis exindè sperari  
possit, optimè notum est.

In



In fine hujus Introductionis monere adhuc consultum duxi, me prolixitatem in quibusdam evitare non potuisse, & aliena, ad Scopum Medicum non pertinentia, reliquis immiscere coactum fuisse: cum enim tot aliena in Physiologia contineantur, prolixitatem quoque, dum ea remove-re animus fuit, evitare non potui. Quod E. Tyrones sciant, quid propriè ex Physiologia ad Medicum spectet, *Theoriæ Morborum*, quæ breviter lucem videbit, *Compendium Physiologiæ*, & *Pathologiæ verè Medicæ*, ut & *Dietam Sanorum* (de qua in Physiologia agere animus erat) & *Ægrorum* subjungam. Cum tandem urgentia negotia accuratiorē correctionem non semper permiserint, B. L. ut errores illos typographicos corrigat, obnixè rogo. Denique rigidos aliorum censores, qui nil, nisi quod ipsi fecerint, rectum putant, rogo, ut, si forsan in latinitate errorem commiserō, inquisitioni rigorosæ hunc meum laborem non subjiciant: agnito enim errore sine aliis Interpretibus cum Prisciano Vapulante pacem initabo. Sin verò ipsa realia quibusdam displicent, & refutationem mereri videntur, eos rogo, ut animi sensa erudito ubi exponant, me enim, si meliora docebunt, consentientem habebunt; sin verò neglectis rationibus sufficientibus, vel simpliciter tantum ceu inutilia ea rejicere & contemnere, vel gravius tantum in eadem invehi volunt, vitio mihi non vertent, si vel responsione indigna eorundem prolata æstimem, vel ita, uti salutatus fuero, resalutem.

# TABULA

## Universam Physiologiam

### exhibens.

Introductio de Requisite boni Medici,

Cap. 1. de Elementis Corporis Humani.

- |   |    |
|---|----|
| 2. Structura & Mechanismo Corporis            | 5  |
| 3. Principio Motus in corpore sive de Natura. | 61 |
| 4. Motu Humorum.                              | 87 |

Membr. 1. De Generali Historia Circulationis Humorum.

- |   |     |
|---|-----|
| 2. Materia Humorum.                       | 91  |
| 3. Causis Motus Humorum instrumentalibus. | 96  |
| Artic. 1. De Motu Cordis sive Pulsu.      | 97  |
| 2. Partium Tonico & Voluntario.           | 101 |
| 3. Respiratione.                          | 111 |

4. De Effectibus Motus Humorum.

Artic. 1. De Secretione & Excretionem. ibid.

Punct. 1. De Lympha Secretione ejusque motu.

- |   |     |
|---|-----|
| 2. Liquefactione nervorum secretionem & motum           | 123 |
| 3. Secretione Lactis.                                   | 142 |
| 4. Seminis.   | 149 |
| 5. Saliva.  | 154 |
| 6. Humoris aquei & lymphæ oculos irrigantis.            | 157 |
| 7. Aqua Pericardii.                                     | 159 |
| 8. Transpiratione insensibili & sudoris secretionem.    | 164 |
| 9. Secretione & Excretionem Urina.                      | 165 |
| 10. Bilis.  | 170 |
| 11. & Excretionem fecum alvinarum.                      | 175 |
| 12. Muci aliquarumque sordium Secretione & Excretionem. | 179 |
| 13. Secretione & Excretionem Sanguinis Menstrui.        | 182 |

Art. 2. De Nutritione.

Punct. 1. De Appetitu.

- |   |     |
|---|-----|
| 2. Materia Nutritionis sive Alimentis.                                      | 187 |
| 3. Alimentorum Preparatione in Ore, Ventriculo, Intestinis & Vasis Lacteis. | 188 |
| 4. Modo Nutritionis sive Materia Nutritia appositione.                      | 192 |

Artic. 3. De Vita & Sanitate.

5. De Differentia Corporis & Actionum, secundum Aetates, Sexum & Temperamenta 240

Membr. 1. De Aetate.

- |   |     |
|---|-----|
| 2. Sexu.                                | 246 |
| 3. Temperamentis.                       | 247 |
| Artic. 1. De Temperamento Sanguineo     | 256 |
| 2. Cholericum                           | 266 |
| 3. Phlegmaticum                         | 263 |
| 4. Melancholicum                        | 267 |
| 5. Mutatione & Mixtione Temperamentorum | 269 |

6. De Animi Pathematum in Actiones Vitales, harumque in Animæ Operationes potentia 271

Membr. 1. De Anima Pathematum in Actiones Vitales potentia

2. Potentia Actionum Vitalium in Operationes Anima 279

7. De Excubitoribus Animæ sive Sensibus externis. 281

Membr. 1. De Visu

- |             |     |
|-------------|-----|
| 2. Auditus  | 290 |
| 3. Tactus   | 296 |
| 4. Gustus   | 289 |
| 5. Olfactus | 300 |

8. De Sensibus internis

9. Voluntate & Motu Voluntario. 301


10. Somno & Quiete 303

11. Propagatione Hominis sive Generatione 304

Membr. 1. De Conceptione 309

2. Nutritione Fœtus in Utero 315

3. Partu 324







I. N. 7.


# PHYSIOLOGIÆ MEDICÆ.

## CAPUT I.

De

Elementis Corporis humani.

§. I.



**M** Ominem ex duabus partibus essentialibus, mente scilicet immateriali, immortali, rationali & corruptioni minime obnoxia, corpore verò materiali & ad corruptionem putredinosam admodum pronò, constare, omnes ferè unanimi consensu consentiunt: paucis saltem exceptis, qui, nescio quibus rationibus permoti, tertiam adhuc essentialem partem, Spiritum nempe, introducere

xere. Cum autem corpus potissimum sub Medici considerationem cadat, & hinc accuratam postulet tractationem, singula, ad Medicum potissimum forum spectantia, perscrutabor: non omittis tamen iis, quæ de Animæ doctrina huius pertinent, & Medicæ considerationi lumen affundunt.

§. 2. Corpus humanum & imprimis sanguinem ad corruptionem putredinosam admodum pronum esse, experientia quotidiana abundè testatur: quare in causas huius ad putredinem propensionis inquirere non inconsultum erit: quod ut eò melius fieri queat, ab ipsis corporis elementis incipiendum est.

§. 3. Sunt autem elementa corporis, si rite examinantur, tria, Aqua, Terra & Pinguedo. Aquam humorum & excrementorum liquidorum consistentia probat: nisi enim magna aquæ copia corpori semper inesset, humorum fluxilitas, ad conservandam vitam adeò necessaria, minimè conservari posset. Terram quod concernit, est ea admodum tenuis & ad Salinam indolem propius accedit, eamque non rarò prorsus induit: facile solvitur hæc terra in aqua, eique coniungitur, non tamen adeo arcte, ac quando jam in verum Sal conversa est. Dictis hisce principiis jam eò facilius jungitur Pinguedo, quæ alias cum aqua nunquam cohæret. Luculentum huius rei exemplum habemus in confectioe saponis, ubi ex lixivio & pinguedine animalium vel olei olivarum crassiori coquitur sapo, & sicope salis

lixivio contenti aqua & pinguedo conjungun-  
r.

§. 4. Ex conjunctione trium horum principiorum oritur concretum mucido pingue sive latinosum, ex quo postmodum formantur omnes partes. Esse autem hujusmodi gelatinosam basin omnium corporis partium, apparet inde 1. quod non solum fœtus partes in utero modum sint mucidæ & molliem suam etiam extra uterum diu servant: sed etiam 2. omnes partes & ossa durissima in mollem hujusmodi mucilaginem coctione resolvi possint. Quibus accedit 3. quod corpus nostrum gelatinosis & mucilaginosi maximam partem nutriatur: unde etiam carnes juniorum animalium, multum mucilaginis possidentes, optimum præbent nutrimentum. Hisce etiam 4. ex Pathologicis addendum est, quod, consumpta hujusmodi mucagine, partes omnes contabescant, quale quid accipue in Hecticis cernere datur.

§. 5. Mixtio tamen horum principiorum non promiscue in omnibus partibus & subjectis æqualis, sed in aliis plus aquæ, in aliis plus pinguedinis, in aliis verò plus terræ deprehenditur: ita in humoribus aqua abundat, cui sufficiens pinguedinis quantitas cum pauca terra admixta est: in musculis aliisque partibus carnosissimis mollioribus magna pinguedinis & terræ, minor vero aquæ quantitas deprehenditur: cum è contra ossa ex magna terræ, minore verò pinguedinis & aquæ portione composita sint. Ita in



Phlegmaticis aqua, in Sanguineis pinguedo, in Cholericis pinguedo cum Sale admodum exaltata, in Melancholicis terra prædominium obtinet.

§. 6. Hæc autem principia, si finem respiciamus, ad constitutionem corporis summè sunt necessaria: cum enim sensus circa res subtilissimas occupatus sit, & præterea motus voluntarii promptissimam requirant executionem, necessario etiam organa non solum tenerrima, sed etiam summe flexilia requiruntur, ad quorum constitutionem aqua & pinguedo præ omnibus aliis aptissima sunt, utpote ex quarum miscela, licet molli, nihilominus tenax atque viscida oritur substantia: cum è contra ad ossium firmitatem atque stabilitatem copiosa terra requiratur.

§. 7. Quamvis autem inter hæc principia, uti ex dictis apparet, aliqua deprehendatur connexio, minus arcta tamen est & durabilis: sed accedente fortiore motu intestino, qualis potissimum in fermentatione putredinosa deprehenditur, facillimè à se invicem recedunt, quod quotidie in Gelatinis, acorem atque situm facilè contrahentibus, videre licet: & cum omnis structura corporis mixtionem horum principiorum præsupponat, necessario etiam simul tota structura, recedentibus à se invicem principiis, perire debet. Ex quibus apparet corpus respectu principiorum ad dissolutionem putredinosam maximè pronum esse. Eò facilius autem postmodum in actum deducitur, si potentiores Macrocosmi-

## CAPUT I.

alterationes, Naturæ vim superantes, concurrunt; Natura enim imperium in hancce mixtionem non absolutum, sed divisum cum variis aëris alterationibus habet: unde præsentibus diversis aëris constitutionibus, actiones Naturæ, secretiones scil. & excretiones, turbantibus, virii etiam & utpl. epidemici sequuntur morbi. Natura de horum principiorum mixtione vid. in *n. D. Stablii Theor. Med. Part. I. p. 26. & seq. de fixi & vivi Differ. p. 12. & 13. & alibi.*

## CAPUT II.

De

# Structura & Mechanismo Corporis.

### §. I.

**EX** mucilagine itaque pingui, in præcedente capite descripta, omnes corporis humani partes componuntur, quæ ratione diversæ consistentiæ dividuntur in Solidas & Fluidas, aut juxta alios, in Solidas, Fluidas & Molles, aut juxta Hippocratem in Continentes, Contentas & Impetum facientes. In Solidis partibus fluidæ, ratione mixtionis inter se non parum differentes, continentur & per easdem continuo moventur. Ad Solidas partes referuntur primario ossa cum cartilaginibus, quæ firmitate & duritie reliquas superant, ac basin totius corporis constituunt: ambiunt

biunt ea reliquæ partes solidæ, quas alii molles vocant, Membranæ, Tendines, Vasa, Glandulæ, Caro musculosa &c. Ad fluidas spectant primario Sanguis strictè sic dictus, Lympha, Serum, Saliva, Succus Pancreaticus, Bilis, Fluidum nervæum &c.

§ 2. Prima atque simplicissima pars Solida, quæ ex mucilagine enascitur, est *Fibra*, quæ fundamentum præbet omnibus aliis partibus: nisi forsan cartilagine excipias, in quibus non adeò manifestè demonstrari possunt. Ipsa ossa, quamvis durissima sint, ex hujusmodi fibræ mucilaginosæ componuntur, quando nimirum secundum longitudinem, excussa aqua & relicta tantum parte terrestri cum pauca pinguedine, conjunguntur. Possè autem ex gelatina fibras nasci, in sanguine recens mactatorum animalium videmus: si enim bacillo agitur, statim copiosæ generantur fibræ, bacilloque adhærent, quæ tamen alias in sanguine minimè reperiuntur. Varia autem nomina fibræ sortiuntur pro diversitate substantiæ & situs: illius intuitu aliæ sunt carnosæ, aliæ tendinosæ, aliæ nervosæ: hujus verò respectu, aliæ longitudinales, aliæ transversæ, & obliquæ sunt. Ex hisce E. fibræ, seu primis rudimentis, omnes corporis partes contextæ sunt & ex iisdem resultat pulcherrima corporis humani machina. Quo vero Medicinæ Tyro non ex aliis libris partium cognitionem petere cogatur, brevissimè corporis partes recensbo. Initium autem faciam à partibus & regio-



onibus exterioribus & postmodum ad internas  
ergam.

§. 3. Totum corpus ab Anatomicis divi-  
tur in Truncum & Artus. Truncus Caput,  
ve supremum Ventrem, Thoracem sive me-  
dium ventrem & Abdomen sive infimum ven-  
tem: Artus autem superiores humeros, cubitos  
& manus; inferiores vero femora & tibiae cum  
pedibus complectuntur. In hisce tamen par-  
tibus variae occurrunt adhuc regiones, quarum  
nominations, quia quotidie in Praxi occur-  
runt, Medico necessariae sunt. In capitis sum-  
ma & media parte occurrit eminentia quaedam,  
cujus *Vertex* vocatur: in parte anteriore est *Synciput*,  
in posteriore vero *Occiput*. Latera capitis prope  
fontem vocantur *Tempora*. Superior faciei pars  
frontis, inferior *Mentum*, laterales partes *Buccae* di-  
cuntur: in media faciei parte deprehenditur  
*Nasus*, infra eum *Os*, supra eum vero utrinque  
*Oculi*. Pars infra caput, sive inter caput & thora-  
cem intermedia vocatur *Collum*, cujus pars ante-  
rior *Jugulum* posterior vero *Cervix* audit.

§. 4. Sequitur postea *medius Venter* sive Tho-  
rax cujus pars posterior *Dorsum*, anterior vero  
*Pectus* vocatur: utrinque in Pectore occurrit regio  
*scapularum*: in posteriore superiore parte utrin-  
que sunt *Scapulae*. Laterales pectoris partes *Late-  
ra* vocantur: in infima aut media thoracis parte  
ubi abdomen incipit, cernitur fossula, quam *Scro-  
biculum cordis* appellant.

§. 5. In Abdomine variæ quoque sunt regiones, quæ in *anteriores, laterales & posteriores* commodè dividi possunt. *Anteriores* sunt quatuor: 1. *Epigastrium* à scrobiculo cordis ad umbilicum ferè tendens. 2. *Regio Umbilicalis* circiter duos digitos infra umbilicum desinens, in cuius medio est *Umbilicus*. 3. *Hypogastrium* à regione umbilicali ad pubem tendens. 4. *Regio Pubis*, quæ pilis in adultis tegitur. *Laterales* sunt 1. *Hypochondrium dextrum & sinistrum*, à lateribus Epigastrii sub costis spuriiis. 2. *Ilia* quæ sunt superius à latere Hypogastrii. 3. *Inguina* sive partes laterales pubis in flexura femoris. *Posteriores* tandem sunt 1. *Lumbi*, in superiore abdominis parte & 2. *Nates* seu inferiores partes: supra nates in medio est *regio ossis sacri*, paulo inferius verò *ossis coccygis*.

§. 6. *Artus*, uti jam dictum, dividuntur in *Superiores & Inferiores*. *Artus Superiores* sub unico *Brachii* nomine ab Anatomicis comprehenduntur. In Brachio autem occurrit 1. *Humerus*, sive superior brachii pars à summo humero ad cubiti flexuram usque. 2. *Cubitus*, à flexura ad carpum. 3. *Carpus*, cuius ope manus extrema variis modis flectitur. 4. *Metacarpus*, qui est digitorum basis: hujus pars exterior *Dorsum*, interior verò *Vola Manus* appellatur. 5. *Digiti*: *Pollex*, *Index*, *Medius*, *Annularis & Auricularis*. *Artus inferiores* itidem sub solo *Pedis* nomine comprehenduntur: in hisce considerari merentur. 1. *Femur*, ab abdomine ad genu, cuius pars posterior mollis *carnosa*

osa *Femur* appellatur. 2. *Genus*, ubi est articulatio femoris atque tibiæ, hujus pars posterior *convexa* dicitur *Poples*. 3. *Tibia* : cujus pars anterior carne denudata à Græcis *Ἀντινήμιον*, posterior verò carnosa *fura* vocatur. 4. *Malleolus internus* & *externus* sive eminentia tibiæ propè tarum. 5. *Tarsus* qui & *Pedum* vocatur, flexioni pedis inserviens : hujus posteriori eminenti parti *Calcis*, *Calcanei* & *Pternæ* nomen est. *Metatarsus* sive *Metapedium*, basis digitorum pedis. 6. *Digitus* : quorum primus *Pollex* appellatur, reliqui nominibus carent.

§. 7. Pergamus jam ad interiores corporis partes : hæc omnes externè ambit *Cutis* cum *cuticula* : in qua præter foramina majora *Oculorum*, *Narium*, *Aurium*, *Oris*, *Ani* & *Pudendorum*, innumera minora, *Pori* dicta, occurrunt. De *Cutis* partibus videantur *Anatomici*. Sub cute atet *Pinguedo* in proprios folliculos collecta, quæ partes subjectas calefacit : hanc excipit *Membrana Musculosa*, quam alii *Panniculum Carnosum* appellant. Postea varii occurrunt *Musculi* sive partes carnosæ motui inservientes : hujus tres sunt partes *Caput* seu *Principium*, *Venter* & *Cauda* sive *Finis*. In extremitatibus musculorum cernuntur *Tendines*. Reliqua de *Musculis* vide apud *Anatomicos*.

§. 8. Superius *Truncum* in tres *Ventres* dividi dictum fuit. Dicitur autem *Venter* insignis quædam cavitas, viscera nobilia ad vitæ conservationem necessaria in se continens. Ita *Venter supremus* sive



*Caput* continet *Cerebrum* actionibus animalibus inserviens: quo etiam referri debet *Spinalis Medulla*. *Venter medius* sive *Thorax* viscera Vitalibus actionibus, Pulsui scil. & Respirationi inservientia *Cor* & *Pulmones* recondita habet: *Infimus* verò *Venter* sive *Abdomen* viscera actionum naturalium, *Ventriculum* & *Intestina* cum annexo *Mesenterio* ejusque *Glandulis* & *Vasis Lacteis*, *Hepar*, *Lienem*, *Re-nes*, *Vesicam* ut & *Organa Generationi dicata*. De singulis E. Ventribus seorsim agendum erit.

§. 9. *Supremus Venter* sive *Caput Cerebrum*, uti dictum est, in se continet: ne vero ob molli-  
tiem externis injuriis nimium expositum sit, fir-  
mis ossibus cinctum est, quæ simul sumta *Cra-nium* vocantur. Ossa hæcce numero sunt sex:  
*Os frontis* in quo notari merentur duæ cavitates cum cavitate narium communicationem habentes: duo *Syncipitis*, quæ etiam *Bregmata* vocantur, unum *Occipitis* & duo *temporalia*: quibus accedunt adhuc duo: *Os* scil. *Basilare* & *Spongiosum* sive *Cribrosum*, quæ amen cranio & maxillæ superiori communia sunt. Ossa hæcce ope *suturarum*, tam *verarum* quam *spuriarum* conjunguntur: illæ sunt tres 1. *Coronalis*, quæ *os frontis* cum *ossibus syncipitis* conjungit. 2. *Sagittalis*, ab *osse frontis* recta per *ossa syncipitis*, quæ connectit, ad *occiput* tendens. 3. *Lambdoidea*, à figura ita dicta, quæ *Os occipitis* & *Ossa syncipitis* conjungit. Hæ vero sunt *Suturæ Squamosæ* dictæ, quæ intercedunt *Ossa Temporum* & *Ossa Syncipitis* *Ossa Cranii præter cutim crassam admodum propius ambit Pericranium,*

*anium*, membrana admodum sensibilis cum matre per suturas commercium habens. In infantibus future sunt admodum laxæ & sagittastendit usque ad nasum per medium os frontis, quod in duas partes dividit. In concursu *Sutura coronalis* & *Sagittalis* in infantibus occurrit foramen quoddam, quod *Fontanella* vocatur, ac postmodum sensim sensimque coalescit. Ossa crani constant ex duplici *lamina exteriori* & *interiori*, quarum interstitiis occurrit *substantia medullaris*.

§ 10. Remoto itaque cranio apparet Cerebrum suis meningibus inclusum. Externa *Meninge dura*, interna verò *pia meninx* vocatur; dura bique duplex est & non solum cranio per filamenta adhæret & per suturas cum pericranio communicat, sed & altius in cerebrum penetrans *falcem* sive processum falciformem constituens, id in duas partes dividit, ac postmodum etiam quatuor *Sinus* venosos, *Sagittalem*, duos *Laterales* & *quartum* efformat. *Sagittalis* dicitur, quia sub futura sagittali à summis naribus versus posteriora ad cerebellum usque excurrit, ubi in duos *sinus laterales*, juxta lambdoideæ futuræ latera decedentes dividitur: *quartus sinus* situs est, ubi *sagittalis* & *laterales* concurrunt, brevior est reliquis & ad glandulam pinealem excurrit. Ex sagittali & lateralibus plures alii *sinus minores* in substantiam cerebri distribuuntur; ex horum innum, in primis verò quarti, ramificationibus & arteriis formatur *Plexus Choroidalis*. In concursu

cursu horum sinuum observatur *Torcular Herophili*. Interna meninx quam vulgò *piam matrem* vocant, cerebrum ejusque circumgyrationes, cerebellum, medullam oblongatam & spinalem arctissimè undique ambit.

§. 11. Hæc meninges sequitur jam ipsum *Cerebrum*, ad *Sphæricam figuram* aliquatenus accedens & duplici *substantia*, alterâ *corticali* seu *cineritia*, & *medullari* sive *albicante* constans. Corticalem esse congeriem innumerabilium glandularum vasculis sanguiferis racematim adhærentium *Malpighius* primo omnium demonstravit; hæc ambit medullarem ex tubulosis ductibus constantem, id quod recentiores Anatomici ope microscopiorum detexerunt. Duplex hæc substantia, pia matre cincta, in varias abit *circumgyrationes*, quas pia mater ope vasculorum & fibrarum inter se invicem connectit. Ex medullari autem substantia, non solum *Corpus Callosum*, quod quasi cerebri basis est, sed & ex ejusdem fibrillis in varios fasciculos collectis *nervi* oriuntur.

§. 12. In Cerebro adhuc notari merentur  
 1. *Ventriculi*, sive cavitates medullari cerebri substantiæ insculpti, quorum sunt quatuor, duo scil. *anteriores* sive *laterales*, *tertius* & *quartus*. 2. *Fornix*: qui cavitatē medullaris substantiæ percurrentes *ventriculos laterales* format: & cum versus cerebrum bifurcatus sit, oritur inde *tertius ventriculus*: *quartus* autem *ventriculus* sub cerebello in medulla oblongata invenitur. 3. *Septum pellucidum*, à diaphaneitate ita dictum, ex medullari cerebri



rebri substantia ortum trahens. 4. *Corpus striatum*, quod in quovis Ventriculo laterali antèrius cernitur. 5. *Medulla oblongata*: hæc antèrius ex cerebri, posterius verò ex cerebelli substantia medullari oritur: hujus portiunculæ sive duæ eminentiæ in Ventriculis lateralibus conspiciuntur & *Crura medullæ oblongatæ* constituunt 6. *Nervi*: quorum *decem paria* in cerebro ex medulla oblongata prodeunt: (1) *Olfactorii*, qui ad os cribrosum exportecti & crassiores redditi, *processus papillares* vocantur. (2) *Optici*: propè hosce est *Infundibulum* in *glandulam pituitariam* desinens. (3) *Oculorum motorii*. (4) *Pathetici*: qui itidem ad oculos tendunt. (5) *Par quintum* & (6) *Par sextum*: quoniam duo hæc paria multos ramulos ad linguæ anteriorem partem mittunt, *Gustatorii* quoque vocantur. (7) *Auditorii*: hi per foramen ossis petrosi ad aures tendunt. (8) *Par vagum*: quod ad cor, diaphragma, ventriculum &c. excurrit: unde etiam notabilis abdominis & capitis oritur consensus. (9) *Linguæ motorii*: & (10) *Par decimum*: quod adhuc nomine caret. Quo autem eò facilius memoriæ mandari queant decem nervorum paria, sequentibus versiculis eadem inclusit *Verheyen Anat. p. 319.*

*Olfaciens, cernens, oculosq; movens, patiensq;  
Divisum, cingens oculos, audiensq;, vagansq;  
Reflectens linguam, sub vertebralia tendens.*

7. Notari adhuc meretur *Rima* à radicibus fornicis ad infundibulum tendens, quam obscæno nomine

nomine *Vulvam* appellarunt. 8. *Nates & Testes*: Sunt quatuor eminentiæ propè cerebellum, quorum anteriores & majores *nates*, minores vero & posteriores *testes* vocantur: in interstitio majorum conspicitur foramen, ad ventriculum quartum & per *rimam & infundibulum* transiens, quod *Anum* vocarunt Anatomici. 9. *Glandula Pinealis* supra *anum* sita. 10. *Arteriæ & venæ*: illæ sunt quatuor: duæ scil. *carotides*, propè *sellam equinam* seu *turcicam* cerebrum ingredientes & duæ *vertebrales*: hæ verò sunt *jugulares*, quæ Sanguinem è sinibus exceptum revehunt. 11. *Cerebellum* ejusdem cum cerebro substantiæ: in hoc notari merentur *Processus vermiformis*, ut & duo alii processus ex cerebello in medullam oblongatam transeuntes, quos *Willisus Pedunculos* vocavit, ac tandem *Pons Varolii*. Hisce hætenus recensitis adhuc addi meretur. 12. *Spinalis medulla*, quæ nil nisi continuatio medullæ oblongatæ est: ex hac triginta nervorum paria, *septem* scil. cervicis, *duodecim* dorsi, *quinque* lumborum & *sex* ossis sacri, per foramina vertebrarum & ossis sacri prodeunt & in corporis partes distribuuntur.

§. 13. Præter ossa cranio propria, adhuc alia duo cranio & maxillæ superiori communia dantur, *Os* scil. *Basilare* (quod etiam *Sphenoides* sive *Cuneiforme* vocatur) & *Cribriforme*, aliis *Ethmoides* sive *Spongiosum* dictum. *Os Basilare* dicitur, quia est cerebri & reliquarum cranii ossium *basis*: in inferiore parte ubi cavitatem oris respicit, vocatur *Os palati*. *Os cribriforme* multis foraminulis præ-

præditum est: in medio ejus superius versus cerebrum erigitur processus, quem *Cristam Galli* vocant: huic opponitur inferius alius nares distinguens.

§. 14. Ossa hæc excipiunt *Maxilla*. *Superior* immobilis constat ex undecim ossibus, quinque scil. paribus & uno impari: quorum priora nominibus carent, ultimum verò *Vomer* appellatur. In secundo pari, canthum oculi internum constituyente, notanda sunt puncta lacrymalia. *Maxilla inferior* mobilis in adultis ex unico, in infantibus verò ex duobus constat ossibus: in hac processus notari debent, quorum posterior *Condylodes*, anterior vero *Corona* vocatur: alias conjunctim sumpti *Cornua* dicuntur, quoniam instar cornuum erecti sunt.

§. 15. Maxillarum *alveolis Dentes*, reliqua ossa duritie non parum superantes, infixi sunt, per modum connexionis, quem Anatomici *Gomphosm* appellant: cum vero hæc connexio laxior sit, ulterius ope *Gingivarum* in alveolis firmanantur. *Substantia* eorum duplex est, interior *osseæ* mollior est exterior verò ob singularem duritiem *saxeæ* vocatur. Numerus dentium non in omnibus subjectis unus idemque est, in quibusdam enim viginti octo, in aliis triginta, in aliis triginta duo numerantur. Ratione figuræ, radiorum & usus triplices sunt: *Primores* seu *Incisores*, *Canini* & *Molares*. *Primores* primi in ore & primò etiam erumpunt, & incidendis cibis inserviunt. *Canini* cibos duriores confringunt & numero sunt quatuor,



quatuor, utrinque enim in quavis maxilla unus reperitur. Canini superiores vocantur etiam *Oculares*. *Molares* in superiore parte lati sunt & asperi, ut cibos à præcedentibus incisos eò magis comminuere queant: ut plurimum utrinque in utraque maxilla reperiuntur quatuor, in quibusdam quinque. Circa ultimos molarium notandum est, eos, quia serius erumpunt, *Dentes sapientie* vocari. *Radices* dentium molarium sunt duplices, triplices & quadruplices, cum è caninorum simplices & caninorum interdum duplices sint. Quod generationem dentium concernit, in infantibus & fœtu etiam in alveolis latent, sed sunt adhuc molles. In pueris anteriores dentes excidunt & iterum renascuntur, in adultis non item. Deinde etiam continuo crescunt: licet enim durissimi sint, continuo usu nihilominus atteruntur, quare continua etiam appositione opus habent.

§. 16. Si dentes & maxillæ mechanicè considerantur, insignis occurrit hic mechanismus: dum enim maxilla inferior ope musculorum *temporalium, masseterum, alariorum externorum & internorum*, ut & auxilio *biventris*, maxillam detrahentis, continuo movetur, ac dentes continuo colliduntur, omnia quæ quidem in eorum interstitiis reperiuntur, in subtilem pollinem rediguntur, uti in molendino, ubi lapis molaris superior continuo super inferiori immobili in gyrum movetur ac grana frumenti subtilissimè comminuit. **Incisores** sunt instar cultri aut forficis, quibus cibi grossio-

offiores in minora frustula conciduntur. Carni sunt instar cuneorum aut etiam terebrarum, quibus duriores finduntur cibi. Lingua in masticatione molitoris vice fungitur, dum cibos comminuendos dentibus offert & distribuit.

§. 17. Exterius teguntur maxillæ & os frontis variis musculis & cute ceu communi integumento, unde buccæ, labia reliquæque faciei partes teguntur. Musculi frontis sunt duo, dexter scilicet sinister, qui frontem & supercilia movent. Musculi labiorum vel sunt communes vel labiis proprii: illi sunt *subcutaneus* & *secundi paris nasi*, quibus alii *Buccinatorem* addunt: hi vero sunt duo *attollentes*, duo *deprimentes* & *constrictorius*: præter hosca tria adhuc paria musculis propriis accipiet *Verheyen Anat. p. 358. Attollens, Deprimens & Constrictorius*. De musculis nasi suo loco agetur.

§. 18. Cum in facie organa sensuum quorundam appareant, de iis quoque & quidem primo omnium de Oculis agendum erit. Oculi sitiunt in *Orbita* ossea, quæ eos munit, ne adeò facile lesi possint: præterea oculum ab injuriis externis *Palpebræ, Cilia & Supercilia* defendunt. *Palpebræ* non solum oculos claudunt, sed etiam abstergunt eos, ut eò commodius visui inservire queant. Musculi motum palpebrarum efficientes sunt tantum tres, duo scilicet, *attollentes* & unus *deprimens*, qui palpebræ superiori proprius est, inferior vero hujusmodi musculo caret: in margine cujusvis palpebræ occurrit cartilago instar arcus incurvata, Græcè *Trachoma*, Latinis *Cilium* dicta. Ciliorum & Superciliorum

periciliorum usus est prohibere, ne aliquid in oculos illabatur. Palpebræ formant duos *angulos* sive *canthos*, *majorem* sive *internum* & *minorem* sive *externum*: in cantho interno sita est *Glandula* sive *caruncula lachrymalis*: ibidem occurrunt quoque *puncta lachrymalia* ad nares tendentia & superflua lympham eò vehentia: in cantho externo *Glandula* sive *caruncula innominata* latet: hæc glandula non oculos tantum irrigant, sed etiam lacrymas præbent. Cum verò & ipse oculus diversas in plagas moveri debeat, sex *musculi* ipsis concessi sunt, quatuor scil. *recti* & duo *obliqui*: *recti* sunt *Attollens* sive *Superbus*, *Deprimens* sive *Humilis*, *Adducens* sive *Bibitorius*: *Abducens* sive *Indignatorius* & *obliqui* sunt *Superior* sive *Trochlearis* & *inferior* alias quoque *Amatorii* vocantur: modo nominati sex musculi oculos sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum & obliquè movent. Pinguetudo hisce musculis interjecta eorum motum faciliorem reddit.

§. 19. Remotis musculis, glandulis & pinguedine, *Bulbus oculi* cum suis *tunicis* & contentis *humoribus* apparet. Quod *tunicas* attinet, Authores quoad eorum numerum admodum variant, non paucis tamen divisi sunt in *communes* & *proprias*: illæ sunt *Adnata* sive *conjunctiva* & *Innominata* seu *Tendinea*, quæ album oculi constituunt: hæc vero sunt 1. *Cornea*, quæ antè pellucida, posteriore vero parte opaca est, & ob singularem duritiem *Sclerotica* vocatur. 2. *Rhagoides* sive *Uvea*, cujus postica pars *Choroides* audit: in anti-



ius parte *Pupilla*, *Processus Ciliares* & *Iris* occurrunt.  
*Retina* sive *Amphiblestroides*. Præter modo nominatas, duæ adhuc aliæ dantur tunicæ in oculo, *Hyaloides* scil. sive *Vitrea* & *Arachnoides* sive *CrySTALLINA*, quarum illa *humorem vitreum*, hæc vero *CrySTALLINUM* cingit.

§. 20. *Humores* oculorum sunt tres: 1. *Aqueus*, inter corneam & humorem crySTALLINUM contentus, qui oculum reddit in anteriore parte convexum & juxta quosdam per *ductus aquosos Nuckii* constituitur. 2. *CrySTALLINUS* qui lentis figuram refert, & pellucidus est ita ut per eum commodè literæ, quas etiam simul majores instar microscopii visui repræsentat, videri possint. 3. *Vitreus*, fuso vitro similis quoad colorem: reliquos quantitate superat & humorem CrySTALLINUM in sinu suo gerit.

§. 21. In oculo quoque mechanicè considerato insignis deprehenditur *Mechanismus*, veram enim exhibet *Cameram Obscuram*. Denotat autem Camera obscura *locum undiq; clausum & obcuratum*, unoq; solo, & eo parvulo, foramine patulum per quod externarum rerum, è regione dicti foraminis positarum & vel propria sua luce fulgentium, vel mutatio lumine resplendentium, species aut imagines in chartam aut alium candidulum objectum transmitti, cuiq; in eo coloribus utcumq; depictæ, dignosci spectariq; possunt. vid. *Sturmii Mathes. Juvenil. Tom. 2. Cap. I. p. 5.* Si perfectior desideratur camera obscura foramen vitro munitur. Talem cameram obscuram perfectiorem exhibet, uti dictum est, *Oculus*, Quemadmodum enim 1. camera obscura undi-

que clausa per unicum tantum *rotundum foramen* lumen admittit, ita etiam oculus, undique tunicis cinctus, radiis luminis per *pupillam* rotundam ingressum concedit. 2. uti in camera obscura perfectiore foramen *vitro convexo* munitum est; ita etiam in oculo talis lens *crystallina*, *humor crystallinus*, reperitur. 3. Uti iu camera obscura *charta* vel *lintheum candidum*, ita in oculo tunica *Retina* objecta excipit. Ut alia silentio præteream de quibus *Sturmius l. a.* prolixè egit.

§. 22. Oculos *Nasus*, in medio faciei collocatus, excipiat. Pars superior nasi *Dorsum* & *Spina* vocatur; quamvis sint, qui prius nomen parti superiori ossæ, posterius vero inferiori cartilagineæ tribuant: infima extremitas nasi *Lobulus* sive *Oribiculus*, laterales vero & infimæ *alæ* & *pinnae* appellantur. In interiore nasi parte primo loco se offert *septum nares* dividens, cujus inferior & carnosior pars ad labium tendens *columna* vocatur. Pili innaribus *Vibrissæ* ab aliis verò *Vibrisci* dicuntur. Nares interius *membrana* admodum sensibili, ex fibrillis è processibus *mandibularibus* prodeuntibus atque ex quinti nervosi paris ramulis contexta cinguntur, quæ *Olfactus* est *organum*. In eadem membrana plures glandulæ mucum secernentes reperiuntur. Similis membrana etiam *Sinus*, variis ossibus circa nares sitis insculptos & ad nares tendentes, investit. *Sinus* isti sunt *duodecim*: duo scil. *Sphænoidei*, sex *Ethmoidei*, & duo *Frontales*: quibus adhuc *duæ* *cavitates* amplæ *maxillæ superioris* ex sinibus *ethmoideis* humorem recipientes, addenda

lenda sunt. De hisce sinibus & membrana puitaria vid. *Vieussens in Neurolog. cap. 16. pag. 187.* Conf. *Hoffm. Dissert. de Sternutator. Usu & Abusu.* Ossa nasi partim ab osse cribriformi, partim ab ossibus maxillæ superioris ortum ducunt: cartilaginee vero inferiorem nasi partem efficientes, sunt quinque. Partes narium movent *musculi*, quatuor scil. paria, qui nares modo dilatant, modo constringunt, quo effluvia odorifera eò commodius cum aëre ingredi & olfactum excitare queant. Ad particulas hasce excipiendas & olfactus gratia affabre etiam constructæ sunt nares, in duas enim quælibet narium dividitur partes: altera tendit per *Infundibulum* ad fauces orisque interiora & respirationi inservit: altera verò sursum ad os cribriforme tendit: in hacce potissimum fit olfactus, unde, si accuratum de rei cujusdam odore iudicium ferre volumus, aërem fortius attrahimus, ut cum eo particula odorifera eò altius in nares penetrare queant: quo autem ibidem eò major fiat perceptio, nares ex spatiis amplioribus instar tubarum in angustiora sensim sensimque coactæ, in plures ducunt cellulas & specus labyrinthæas, quas profectæ ab osse cribriforme lamellæ quædam tenues & quasi foliaceæ, turbinum more intortæ, ac replicatæ effingunt. vid. *Bergeri Physiol. p. 372.* in homine huiusmodi turbinum sive ossium turbinatorum tria sunt breviora nec adeo complicata, in aliis verò quadrupedibus bove, ove, cane, fele, lepore &c. plura, magis contorta & longiora deprehenduntur, in tubulos etiam cæcos, potissimum ea in parte nasi, quam



aëris diverticulum vocant, abeuntia : undè etiam hujus conformationis respectu animalia recensita hominem olfaciendi potentia longe superant.

§. 23. Tertium organum sensorium in capite occurrens *Aures* utrinque in lateribus capitis sub temporibus collocatæ constituunt, & dividuntur in *externas* & *internas*. *Auris externa* vocatur, quæ exterius oculis cernitur; *interna* vero, quæ non nisi dissecto osse petroso apparet. Pars superior *Ala* & *Pinna*, inferior & mollis *Lobus* vocatur. Ambitus auris exterior *Helix* dicitur, cui *Antihelix* opponitur. Eminentia auriculæ inferior *Tragus*, & hinc opposita *Antitragus* appellatur. Cavitas auris tortuosa *Concha* vocatur & ad meatum auditorium tendit. *Partes* auris externæ sunt *cuticula*, *cutis tenuis*, *parum pinguedinis*, *cartilago* & *musculi quatuor*.

§. 24. In aure interna primò se considerandus offert *Meatus auditorius* in anteriore parte cartilagineus, in posteriore verò osseus, quem interiorius membrana pluribus glandulis, *cerumen aurium* secernentibus, instructa, investit. Meatum hunc ce excipit *Membrana tympani* & quatuor parva ossicula, *Malleus*, *Incus*, *Stapes* & *Os orbiculare*: malleus duos musculos *internum* & *externum*, stapes *unicum* tantum habet. *Membranam tympani* sequitur *cavitas*, quam *Tympanum*, *Concham internam* aut etiam *meatum auditorium internum* appellant: in hacce aër *congenitus* sive *innatus* dictus continetur. Ex cavitate tympani per duos *meatus* datur transitus ad *Labyrinthum* & ad palatum, qui po-

sterior

erior *Aquæductus Fallopii* vocatur. In hac cavitate etiam notari merentur duæ *fenestræ*, *ovalis* scil. & *rotunda*, ad cochleam & labyrinthum tenentes. Labyrinthi tres sunt partes, *Vestibulum*, *Canales semicirculares tres* & *Cochlea*, quam interius membrana ex nervo auditorio contexta investit.

§. 25. In aure quoque *Mechanismus* quidam occurrit. In aure quidem *exteriori* cavitates & eminentiæ similes sunt *fornicibus*, ad excipiendos & propagandos sonos aptis: undè etiam abscissa ure externa & h. m. sublatis fornicibus naturalis sonus exceptum ad interiora auris ferentibus auditus maximè læditur. *Interna* verò *auris Tympano* ferè similis est, membrana enim à sono, per meatus auditorium allato, pulsata, movet aërem internum, qui per meatus & fenestras in labyrinthum & cochleam ingrediens, nervum auditorium movet & auditum efficit: quo autem membrana tympani eò clarius resonet, ejus dorso *choroidea* non aliter intensa est, ac nervus in tympano militari.

§. 26. Progrediamur jam ad Os, atque ejus structuram contemplemur. Hic primum se offerunt *Labia*, *superius* scil. & *inferius*, quorum partes extremæ *Prolabia* vocantur. Diductis labiis oris cavitas cernitur, in qua varia notari merentur, & quidem 1. *Lingua*; (de dentibus enim & gingivis hic occurrentibus superius jam dictum fuit) hujus pars anterior tenuis & aliquo modo acuta *apex linguæ* vocatur: posterius faucibus, laryngi & *os hyoidi*; inferius verò ope *frenuli* & musculorum

maxillæ inferiori annectitur. Linguae motui inserviunt varii muscoli, quorum quinque paria vulgo recensentur par scil. *Genioglossum*, *Basiloglossum*, *Ceratoglossum*, *Styloglossum* & *Chondroglossum*. In superiore parte linguae præter *sulcos* varias areolas constituentes, ut & præter *glandulas* linguam humectantes notandæ sunt *papillulae norveae* triplices, quarum *aliae* cochlearum cornubus similes sunt, *aliae* in tenues fibrillas desinunt. *aliae* figuram conicam habent. vid. *Tauvry Anatom.* p. 379. transitum hisce papillis *membrana reticularis* præbet, in inferiore verò parte propè frenulum conspiciuntur *venæ raninae*, quæ in angina interdum secari solent. 2. *Os hyoides*, quod etiam *Os Tpsiloides*, *Os gutturis* & *Os Linguae* vocatur; media & latior ejus pars *basis*, laterales verò partes, instar cornuum prominentes, *Cornua* audiunt. Motui hujus offisi inserviunt musculorum par *Sternohyoideum*, *Coraco-hyoideum*, *Genio hyoideum*, *rectum* & *obliquum* & *Stylo-hyoideum*. 3. *Glandulae & ductus Salivales*. *Glandulae Salivales* partim in ore, partim extra ejus cavitatem sitæ sunt. In ore sunt (1) *Sublinguales* cum suis ductibus. (2.) *Palatinae*, inter quas posterius eminet major quædam, quam *Palatinam conglomeratam* vocat *Verheyen Anat.* p. 405. (3) *Glandulae buccarum & labiorum* brevibus ductibus, salivam in os eructantibus, instructæ. (4) *Uvula*, quam quoque *Columellam* & *Gurgulionem*, alii verò propter usum quem præstat, *Plectrum vocis* vocant: hanc *musculi* duo, *internus* scil. & *externus* ut & utrinque duo *ligamenta membranacea* suspensam tenent,



tenent, quibus relaxatis, *uvula elongatio* cum vocis & deglutitionis impedimento contingit. (5) *Tonsillæ* à figura *Amygdalæ* dictæ, quarum in utraque faucium parte una sita est. Alias quoque *Antiades* & *Paristhmia* vocantur. Extra oris cavitatem sitæ sunt (1) *Parotides*, quarum utrinque circa radicem auriculæ una cernitur, è quibus *ductus* ab inventore *Stenonianus* dictus, Salivam receptam propedentes molares secundos in cavitatem oris eructat. (2) *Maxillares internæ*, cum *ductu Warthoniano* versus mentum progrediente & ad gingivas in *Papillam* terminante. 4. *Palatum*, seu superior oris pars concava, seu fornicata undè etiam *Oris cælum* & *Testudo* à nonnullis appellatur. 5. *Fauces* quæ sunt posterius, inferius & angustius oris spatium, ubi *larynx*, *pharynx* & *infundibulum* concurrunt.

§. 27. Viso itaque supremo ventre ad *medium* sive *Thoracem*, cujus pars anterior *Pectus*, posterior *Dorsum* audit, progrediamur. Hujus basin constituunt *costæ*, quæ posterius cum *vertebris*, antè vero cum *sterno* cohærent. *Costæ* numero sunt *duodecim*, quarum *septem* superiores *veræ*, *quinque* verò inferiores *spuriæ* appellantur. Quo verò cavitas thoracis eò capacior reddatur, omnes *costæ* incurvatæ sunt. Sternum quod in adultis unicum tantum videtur os, in infantibus ex octo distinctis ossibus, mediantibus cartilaginibus connexis, constat. Inferius in *sterno Cartilago Xiphoides* sive *ensiformis* attentionem meretur. Hæc nonnunquam interiora versus incurvatur & *Ventriculum* premendo continuuum dolorem excitat:

in aliis verò exteriora versus incurvatur & tumorem perpetuum, indolentem tamen, excitat, quod aliquoties observavi.

§. 28. In parte anteriore Thoracis sive Pectore occurrunt *Mammæ*, foeminis magis quam viris propriæ: quæ enim in viris cernuntur *Mammillæ*, nullum habent usum. *Substantia* mammarum mollis & laxa est, ex pinguedine, cum intermixtis glandulis & annexis vasis lactiferis constans. Ductus lactiferi omnes tendunt ad *papillam*, ubi, antea capaciores, iterum angustiores redduntur. Circulus papillæ circumjectus *Areola* vocatur. Vasa mammarum sunt *arteriæ* & *venæ mammarie* cum *nervis à quinto pari spinali* oriundis. *Mammæ* mechanicè consideratæ *Gutturium* repræsentant, quoniam lac contentum per plures poros minores inprimis si manibus fortius comprimuntur, aut suguntur, emittunt.

§. 29. Motui thoracis varii inserviunt muscoli, quorum alii thoracem dilatant, alii constringunt. Illi sunt *musculi subclavii, intercostales externi, serrati postici*, quibus à quibusdam etiam *serratus anticus major* accensetur. Hi vero sunt *Sacrolumbus, Triangularis, & Intercostales interni*.

§. 30. Remoto musculo pectorali & dissectis utrinque costarum cartilaginibus Thoracis cavitas apparet, in qua varia sunt, quæ attentionem merentur. Sit primus locus *Diaphragmati*, medium atque infimum ventrem distinguenti. Hujus substantia cornosa est, excepto ejus centro, ubi tendinosa textura occurrit. Situs ejus est  
trans-

transversus & obliquus, à sterno oblique deorsum ad lumborum vertebrae tendens: in lateribus annectitur costis. Occurrunt in diaphragmate varia foramina, quæ Oesophago, venæ cavæ & nervi trunci intercostalis transitum præbent. Usus diaphragmatis maximus est in respiratione, uti inferius docebitur.

§ 31. Diaphragma excipit *Pleura*, thoracem intus investiens. Constat hæc ex duplici membrana, quarum exterior costis firmiter adhæret, interior verò pulmones attingens admodum lævis est. Ex pleura oritur *Mediastinum* quod thoracem in duas cavitates dividit, & cor cum annexo pericardio suspensum tenet. Est autem *Pericardium* membrana duplex instar sacculi, Cor in se continens. Hic semper observatur humor quidam, quem *Aquam Pericardii* vocant: inservit potissimum lubricando & humectando cordi, quo eò facilius moveri queat.

§. 32. Remoto pericardio ipsum apparet *Cor*, quod in medio ferè thoracis hærens pyramidem inversam repræsentat, latior enim pars sive *basis* superiora, apex verò sive *muco*, *conus*, aut *cuspis*, inferiora versus respicit. *Substantia* cordis est *musculosa*, ex variis fibris musculosis mirum in modum inter se contextis constans. Dividitur cor per *septum* in duas cavitates, quas *Ventriculos* vocant Anatomici. *Sinister Ventriculus* admodum carnosus, validus & profundus, sed angustus: dexter verò flaccidus, latus atque brevis est. Cuius ventriculo superius adjacet bursula quædam, quam



quam *Auriculam Cordis* appellant. *Vasa cordis* vel *communia* sunt, vel *propria*: communia sunt *vena cava*, *arteria pulmonalis*, *arteria magna* & *vena pulmonalis*, quorum duo priora dextro, posteriora sinistro ventriculo adhærent: propria vero sunt *vasa coronaria* dicta, quia basin cordis instar coronæ ambiunt. In orificiis vasorum communium observantur *valvulae* diversæ: quæ in *venis* occurrunt, *triangulares*, *tricuspides* & *mitrales* audiunt; in *vena cava* earundem *tres*, in *vena aortam pulmonali* *duæ* tantum numerantur. Quæ vero in *arteriis* cernuntur, *seminulares* & *sigmoideæ* vocantur: in quavis arteria *tres* observantur. Per *vasa communia* sanguis omnis per *venas* ad cor fertur & per *arterias* in totum corpus distribuitur, nè vero per *arterias* motu retrogrado ad cor regurgitet, *valvulae semilunares* obstant: similem usum habent *valvulae venarum*, quæ impediunt, ne sanguis è corde ad *auriculas* & *venas* redeat. In corde notari adhuc meretur motus *constrictorius* & *relaxatorius*, ille *Systole*, hic *Diastole* vocatur: in *Diastole* sanguis in *ventriculos* recipitur, in *Systole* verò expellitur. Similis etiam motus observatur in *auriculis*, sed non coincidit cum motu cordis, dum enim cor constringitur, *auriculae* dilatantur, & dilatato corde constringuntur.

§. 32. In corde quoque & annexis vasis egregius occurrit *mechanismus*, dum veram *machinam hydraulicam* repræsentat. Quemadmodum enim in *machina hydraulica* per varios *siphones* aqua affertur & in comune receptaculum infunditur, ac post-

postmodum per alios siphones majores & minores quaquaversum dispergitur, ita etiam per *venas* sanguis omnis è toto corpore refluus in *cor* ceu communem *cisternam* infunditur, & per arteriam magnam ejusque ramificationes in totum corpus distribuitur. Ad cordis mechanismum quoque Salomo in *Ecclesiaste* cap. 12. v. 6. respexit, quando dixit: & *contusus cadus apud scaturiginem*: per cadum enim nil nisi cor intellexit.

§. 34. Cor, in medio thoracis situm, utrinque *Pulmones* asperæ arteriæ adhærentes, ambiunt. *Aspera arteria*, quæ & *Trachea* ac *Fistula pulmonalis* à quibusdam appellatur, constat ex cartilaginibus & membranis, ac in *caput*, *truncum* & *ramificationes* dividitur. *Caput* communiter *Larynx* vocatur & ex quinque cartilaginibus *Thyroide* live *Scutiformi*, *Cricoidi* live *annulari*, duabus *Arytænoides* & *Epiglottide* compositum est. *Thyroides* foris prominet & *pomum Adami* constituit. Duæ cartilagines *arytænoides* *rimam laryngis* seu *glottidem* formant. *Epiglottis* *rimam laryngis* claudit, & impedit, ne in deglutitione cibi in asperam arteriam cum suffocationis periculo illabantur. Cartilagines hæc laryngem constituentes varii movent *musculi*, qui à *Verheyen Anat.* p. 267 in *internos* & *externos* dividuntur. *Internorum* quinque sunt *paria*, *Cricothyroides* live *Thyrocricoides*, *Crico-arytænoides posticum*, *Arytænoides* live *Crico-arytænoides superius*, *Cricoarytæncides laterale* & *Thyroarytænoides*. *Externorum* duo tantum sunt *paria*, nimirum *Sternothyroides* & *Hyothyroides*. Circa epiglottidem  
gland.

glandulæ, ut & circa inferiorem laryngis cartilagineum alix duæ, *thyroideæ* dictæ, laryngem irrigantes, notandæ sunt. *Truncus* asperæ arteriæ ex circulis imperfectis cartilagineis, posterius in membranam abeuntibus, constat. Interius cingitur membrana quadam admodum sensibili, in qua plures glandulæ, irrigandæ asperæ arteriæ dicatæ, occurrunt.

§ 35. Truncum arteriæ asperæ sequuntur Pulmones propriè dicti, per quos ramificationes *Trachææ*, *Bronchia* dicta dispersæ sunt. Pulmones per mediastinum in *lobum* majorem *dextrum* & *sinistrum* & hi iterum in plures minores dividuntur, quos omnes *membrana* quadam ambit. Internam pulmonum substantiam si consideramus, eam ex innumeris *cellulis* sive *vesiculis* constare deprehendimus, quæ bronchiorum, per totam pulmonum substantiam disperforum, expansiones sunt. Inter hæc cellulas ramificationes arteriæ atque venæ pulmonalis procedunt: præter tamen *vasa* hæc communia *propria* quoque, *arteriam* scil. & *venam bronchiale*m, habent. Usus pulmonum primarius est, inservire respirationi & voci.

§ 36. Pulmones quoque cum thorace elegantissimum nobis exhibent *mechanismum*, primò enim *follem* repræsentant. Quemadmodum autem aer follem dilatatum per siphonem intrat, totumque ejus spatium internum occupat, & compresso folle iterum expellitur: ita quoque, quando thorax ope musculorum dilatatur, aer per  
asperam



asperam arteriam intrat , totamque pulmonum substantiam & cellulas replet & expandit: quando vero thorax iterum constringitur , aer quoque ex pulmonibus denuo expellitur. Corium in folle occurrens , eumque arcte claudens , exitumque aeris impediens, in thorace est diaphragma , quo lasso respiratio laxitur , prorsus eodem modo ac quando corio follis perforato actio sive flatus follis perit.

§. 37. Deinde etiam *Pulmones* repræsentant *Organum Pnevmaticum*, in quo aspera arteria licet unicam tantum fistulam repræsentet, plurium tamen fistularum loco est: follem in parvo hocce organo pnevmatico constituunt pulmones ; & cum ex hisce majori impetu expressus aer in rimam laryngis allidit , sonus exindè oritur, qui pro majori vel minori rimæ dilatatione modo gravis modo acutus est: quo autem eò magis variari possint soni , muscoli laryngis varii rimam modò dilatant , modò constringunt. Quamvis autem organum hocce naturale respectu multitudinis fistularum artificialium cedat , longè tamen perfectius est. dum unica tantum fistula plures formare sonos valet , ac Sonum sive Tonum perfectum in plures alios dividere & innumeris modis variare potest , quod tamen in Organo Pnevmatico artificiali impossibile est. Deindè uti in organo artificiali variae fistularum occurrunt variationes , in diversis fistularum seriebus, quas vulgo *Registra* vocant: ita quoque Organum hocce naturale artificiale imitari potest: ita

ita vidimus hoc loco hominem qui Registrum, quod *Vocem humanam* appellant, perfecte imitabatur: alius fistulam, quam Gallico nomine *flute douce* vocant, adeò perfecte exprimebat, ut, te fistulam artificialem audivisse, jurasses: alius teste *Perrault Essais de Physique Tom. 3. p. 144.* tibiam utricularem & imprimis tonum tremulum perfecte Parisiis imitabatur. In oris cavitate deprehenditur quoque mechanismus qui ad Organum hocce naturale spectat, palatum scil. fornicatum: uti enim sonus in fornicibus ob varias percussiones & augetur & gratior redditur, ita quoque ritè constituto palato vox magis accepta est: palato verò læso cantus quam maximè læditur, ejusque gratia perit; quod in iis, quibus a Lue Gallica palatum læsum fuit, manifestè deprehendimus.

§. 38. Ad partes in Thorace contentas pertinet etiam *Oesophagus* & *Thymus*. *Oesophagi substantia* est *membranacea*, constat enim ex tunica *membranacea*, *musculosa* & *nervea*: alii hisce adhuc *vasculosam* & *glandulosam* addunt: nerveam tunicam interius *crusta villosa* obducit. Caput Oesophagi *Pharynx* appellatur. In deglutitione pharyngem tria *musculorum paria* dilatant, par scil. *Cephalo-pharyngæum*, *Sphæno-pharyngæum* & *Stylo-pharyngæum*: *Oesophagiæus* autem, qui etiam *Sphincter Gulæ* appellatur, eundem constringit. Glandulæ in Oesophago occurrentes ejus humectationi & faciliori deglutitioni inserviunt.

§. 39. In superiore Thoracis parte sub jugulo, circa divisiones arteriarum & venarum sub-

clavia-

aviarum , cernitur glandula conglomerata ,  
 quam *Thymum* Anatomici appellant. In Juniori-  
 us , inprimis in infantibus & animalibus recens  
 atis major est quam in adultis. Quis hujus glan-  
 ulæ usus sit, nondum adeò constat : admodum  
 imen probabilis videtur usus, quem *Verheyen*  
*nat. p. 224.* ipsi tribuit : esse scil. *diverticulum chyli*  
*junioribus per ductum thoracicum copiosius adve-*  
*entis.*

§. 40. Visis partibus in Thorace conten-  
 s , jam viscera infimi ventris sive abdominis se  
 obis offerunt. Omnia hæc viscera inclusa sunt  
 peculiari membrana admodum valida , quam  
*peritonæum* Anatomici vocant. Peritonæo in-  
 ambunt varii muscoli, quorum quinque sunt  
 aria, *obliq.* scil. *descendens*, *oblique ascendens*, *rectum*,  
*ramidale* & *transversum par.* In medio muscu-  
 rum notanda est *linea alba* à cartilagine ensifor-  
 i usque ad os pubis excurrent. Deindè quo-  
 ne dissectiones musculorum rectorum tendi-  
 osæ, ab Anatomicis *Inscriptiones* dictæ, attentio-  
 em merentur. Horum musculorum usus in-  
 gnis est, non enim tantum abdominis forma-  
 oni, sed & respirationi, contentorum in intesti-  
 s promotioni ac fecum excretioni inserviunt.

§. 41. Musculos hosce immediatè sequi-  
 r *Peritonæum*, quod ex *duplici membrana* constat :  
 ec duplicatura potissimum ab umbilico ad os  
 bis usque cerni potest : intra quam etiam re-  
 s , ureteres & vesica urinaria latent. Infe-  
 is lamella exterior duos habet *processus* , qui in  
 C viris



viris in scrotum descendentes vasa spermatica, & vaginalem testium tunicam includunt: in feminis ferò ligamenta uteri rotundæa investiunt. Remoto peritonæo in conspectum veniunt *vasa umbilicalia*, *vena* scil. *umbilicalis*, *duæ arteriæ* & *urachus*, quæ in fœtu pervia sunt, in adultis verò in ligamenta abeunt.

§. 42. Postmodum sequitur *Omentum*, quod etiam *Rete*, *Reticulum* & *Epiploon* vocatur. Est autem *membrana duplex*, instar sacculi, multum *pinguedinis*, inprimis in obesis in se continens, quæ *Ventriculum* & *intestina* tegit & fovet, ac ordinarie ultra umbilici regionem vix protenditur, nonnunquam tamen ulterius & ad regionem pubis usque descendit. *Arterias* à *ramo cæliaco* & *mesenterio*, *venas* verò à *vena portæ* habet, quarum *ramificationibus glandulæ* quædam interspersæ sunt.

§. 43. Remoto omento diversa abdominis viscera in conspectum veniunt, è quorum numero primò omnium *Ventriculum* contemplabimur. Nomen *Ventriculus* exindè obtinuit, quoniam in infimo ventre alium quasi parvum ventrem constituit. *Substantia* ejus est *membranacea*, & ex totidem ac *œsophagus* constat tunicis, *membranacea* scil. *musculosa* & *nervea*, quam *crusta villosa* investit. Circa nerveam notandum eam exterioribus longè ampliorem esse, quare etiam in plures rugas complicata est, eum in finem, ut tempore assumptionis ciborum eò magis & absque doloris sensu dilatari possit. In eadem etiam  
notari

notari merentur glandulæ copiosæ. Orificia *Ventriculi* duo sunt, *sinistrum* atque *dextrum* sive *superius* atque *inferius*: illud etiam *stomachus*, Græcis *σπλῆν*, hoc verò *pylorus* sive *janitor* appellatur. Hic occurrit *valvula* vel potius *musculus circularis* sive *sphincter* inferius orificium constringens. Inferior atque amplissima cavitas *fundus* *Ventriculi* vulgò vocatur. Vasa *Ventriculi* sunt *arteriæ gastricæ* à coeliacis ramis oriundæ: *venæ gastricæ* vero sunt propagines partim è trunco venæ portæ, partim è ramo splenico natæ; ab hoc ramo quoque sunt *vasa brevia*: major quædam vena ex ramificationibus dictis orta, quæ *Ventriculum* secundum longitudinem cingit, *coronaria* vocatur. Nervos *Ventriculus* à *pari vago* recipit. Vasa ejus *lymphatica* ad chyli receptaculum tendunt.

§. 44. *Ventriculi* orificio inferiori *Intestina* ejusdem cum *Ventriculo* substantiæ adhærent, & ad anum usque se extendunt. Dividuntur communiter in *tenuia* atque *crassa*: illa sunt *Duodenum*, *Jejunum* & *Ileon*: hæc verò *Cæcum*, *Colon* & *Rectum*. *Duodenum* tenue primum à longitudine duodecim digitorum transversorum ita dictum, à *Ventriculo* versus spinam in latere sinistro, ubi intestinorum anfractus incipiunt, extenditur: in hocce intestinum *succus pancreaticus* atque *bilis* infunditur, ille quidem per *ductum pancreaticum*, *Virsungianum* ab Inventore dictum; hæc vero per *ductum cholidochum* sive *porum biliarium*: ambo hi ductus propè insertionem in

duodenum conjunguntur & unicum tantum osculum constituunt. Constat autem *pancreas* ex pluribus glandulis laxè admodum inter se cohærentibus, unde etiam admodum molle est. Omnes hæ glandulæ racematim ductibus minoribus adhærent, & succum in iisdem secretum in unum majorem infundunt, qui succus salivæ ferè similis est. Situm est pancreas propè primam lumborum vertebra sub fundo Ventriculi. Figura refert linguam caninam. De hepate & bilè inferius sermo erit. *Alterum* tenuium intestinorum est *Jejunum*, ita dictum, quia plerumque est vacuum, partim ob chyli fluiditatem, partim verò ob vasorum lacteorum, chylum magna in abundantia recipientium, copiam. Situs hujus est in regione umbilicali. *Tertium* est *Ileon* omnium longissimum, à circumvolutionibus & gyrorum multitudine ita dictum, unde etiam *Volvulus* quibusdam audit. *Volvulus* enim & *Passio iliaca* morbum gravissimum & acerbissimis doloribus stipatum, intestinum hocce potissimum affligentem denotat. Situs ejus est in regione hypogastrica.

§. 45. Tenuia excipiunt *Intestina crassa*, quorum primum est *Cæcum*, pro quo quidem vulgo appendix illa *vermiformis*, sed perperam, habetur, ob exilitatem enim crassis minimè accenseri potest. Rectius E. ipsi substituitur portio illa *ampla intestini crassi valvulam excipiens*, quod etiam in inferiore parte clausum est, & hoc respectu verè *cæcum* appellari potest. Valvula dicta magni  
est



est usus, dum reditum fecum ex crassis ad tenuia intestina impedit. *Secundum* crassorum est *Colon*, quod à rene dextro sursum ad hepar, & sub ventriculo ad lienem, renem sinistram, finem ossis ilii & tandem ad summam ossis sacri vehitur, ibidemque in rectum desinit. In hoc notandæ sunt *Cellulæ* quam plurimæ fecum transitum præmaturum remorantes, quæ à *ligamentis coli membranaceis* formantur. Ultimum intestinum est *Rectum*, quod nomen exindè obtinuit, quia recta ad anum tendit: hujus finis *podex* & *anus* dicitur. In podice tres observantur muscoli *Sphincter* & *duo levatores*, quorum ille anum constringit, hi verò post fecum exceptionem anum in pristinum locum retrahunt. In intestinis, imprimis tenuibus, plures cernuntur *rugæ* transitum chyli celeriore retardantes: eundem usum habent *valvulæ conniventes* à *Kerkringio* detectæ. Copiosis quoque intestina instructa sunt *glandulis*, à figura, *miliaribus* dictis, mucum intestinum secernentibus. *Vasa* intestinum sunt *arteriæ mesaraicæ*: ab aorta provenientes: *venæ* autem *mesaraicæ* à vena portæ originem trahunt: omnia hæc vasa sanguifera in magna cernuntur copia, quo eò major feri mucosi copia secerni & ad intestina deponi possit.

§. 46. Intestina ope membranæ cujusdam, in medio eorum sitæ, connectuntur, undè etiam *Mesenterii* nomen obtinuit: partem ejus, tenuia intestina connectentem, *Meseræum*, illam verò, cui crassa adhærent, *Mesocolon* appellant Anatomenici.

In Mesenterio præcipuè attentionem merentur: *vasa lactæ & glandulæ*, vasa enim sanguifera, quæ cum intestinis communia habet, antea jam recensita fuerunt.

§. 47. *Vasa lactea*, quæ etiam *Venæ lacteæ* vocantur, sunt *vasa tenuissima lymphaticis quoad substantiam & valvulas similia*, *chylum ex intestinis tenuibus receptum ad receptaculum vehentia*. Veteribus ignota erant & à *Cassparo Asellio* Anno 1622. primum detecta sunt. Dividuntur communiter in *vasa lactea primi & secundi generis*: illa sunt: quæ ab intestinis ad glandulas, hæc verò quæ à glandulis ad chyli receptaculum tendunt. Hinc: indè in vasculis hisce *valvulæ*, chyli reditum ad intestina impediens, occurrunt, quæ exterius instar nodulorum apparent. Vascula hæc *Receptaculum chyli & Ductus Thoracicus* excipit. *Receptaculum chyli* sive *Cisterna*, propè aortam descendentem sub arteria & venâ emulgente sinistra situm est, & omnem chylum ac lympham à partibus inferioribus refluam recipit. *Ductus Thoracicus* recta sursum à receptaculo ad venam subclaviam sinistram modo ramo simplici, modo duplici, (qui tamen rami postmodum iterum coeunt) tendit. Ne vero chylus ex ductu ad receptaculum regrediatur, aut sanguis venæ subclaviæ ductum ingrediatur, *valvulæ hinc indè in ductu ejusque insertionem positæ sunt*.

§. 48. In superiore abdominis parte, hypochondrio scil. dextro, conspicitur *Hepar* sive *Jecur*, viscus infimi ventris glandulosum, magnitudi-

udinis eximix, quod aliqua sui parte Ventricu-  
 um tegit & foveat. Superius & à dextris sub co-  
 lis spuris diaphragmati per ligamenta duo lata,  
 quorum primum *suspensorium* vocatur, & per aliud  
 cartilagini ensiformi annectitur: imo interdum  
 membrana hepar cingens diaphragmati adna-  
 scitur: quare etiam respectu hujus cum diaphrag-  
 mate connexionis hepar in respiratione dia-  
 phragmatis motum sequitur. Superior ejus pars  
 convexa, inferior vero concava est. *Substantia*  
 ejus *glandulosa* & *vasculosa* est, quam cingit mem-  
 brana quædam tenuis. Vasa ejus copiosissima  
 commode in *adducentia* & *abducentia* dividuntur:  
 illa sunt *vena portæ*, *arteria hepatica* & *nervi*: hæc  
 vero *vena cava*, *ductus biliarii* & *vasa lymphatica* co-  
 piofa. Vasis hisce copiosæ glandulæ, bilem se-  
 cernentes interspersæ sunt, ex quibus bilis primo  
 in plures ductus minores ac tandem in majorem,  
*hepaticum* dictum, & per hunc ad intestina fluit:  
 portio tamen bilis ad *vesiculam* quoque *felleam*  
 per ductus *cysthepaticos* tendit: hæc vesicula con-  
 vexa hepatis parti annectitur & in fundum ac  
 cervicem dividitur. Quo verò bilis eò facilius  
 ex hac vesicula ad intestina fluere queat, tunica  
 fibrosa (quæ ordine secunda & media est) instru-  
 cta est, quæ bilis effluxum promovet: vesicu-  
 læ hujus ductus excretorius atque hepaticus,  
 propè insertionem in intestina, conjunguntur  
 atque communem constituunt ductum. Cir-  
 ca vesiculam felleam adhuc notandum est, ter-  
 tiam & intimam ejus tunicam *crusta mucosa* ob-  
 ductam.



ductam esse, ne à bilis acrimonia lædatur. Plura de bile vid. infra de *Secretione bilis*,

§. 42. In sinistro hypochondrio inter costas spurias & ventriculum cernitur *Lien* sive *Splen*: parte concava sive inferiori omento superiori verò interdum diaphragmati adhæret. Substantia lienis accuratius examinata instar favi apum cellulosa apparet, per quam *arteria* à ramo cœliaco sinistro oriunda & *vena* à ramo venæ portæ sinistro dependens distribuitur. Nervum quoque *lienarem Willisii* dictum & copiosa *vasa lymphatica* possidet lien. Totam hancce lienis substantiam *tunica* ex fibris mire inter se contextis ambit, quam adhuc alia, sed tantum quoad aliquam lienis partem laxè cingit.

§. 50. In infimo ventre in regione lumborum apparent *Renes*, dexter tamen ob viciniam hepatis sinistro inferior est. Connectuntur per membranam anteriorem lumbis, mediantibus vasis emulgentibus arteriæ aortæ & venæ cavæ, ope uréterum verò vesicæ. Substantia eorum est vasculosa & glandulosa, quam duæ ambiunt *tunicæ*, quorum exterior pinguedine instructa laxè tantum, interior verò arctius eam investit. Ex substantia renum glandulosa, dimidium digiti attingente, oriuntur *ductus* excretorii *urinarii* valdè exigui, qui postmodum versus pelvim progredientes & collecti *carunculas papillares* constituunt, quas *fistulæ membranacæ* à pelvi productæ excipiunt. Est autem *pelvis* cavitas renum in parte concava, ubi ureteres inseruntur.

*Ureteres*

*Ureteres* vocantur canales isti duo membranacei, urinam à renibus ad vesicam ferentes : inferuntur autem vesicæ admodum obliquè, quo ipso præcavetur, ne urina per ureteres ad renes regurgitet. *Vesica* immediatè in viris intestino recto incumbit, in feminis autem interjacet uterus: dividitur communiter in fundum atque cervicem & ex tribus validis membranis componitur, *exteriore* sive *communi*, *media* sive *musculosa* & *interiori nervea*, quæ muco obducta est, ne ab urinæ acrimonia lædatur. In vesicæ cervice *Sphincter*, collum constringens & urinæ effluxum involuntarium impediens, occurrit, quem *urethra* in viris longior & angustior, in feminis vero brevior & latior excipit. *Vasa* sanguifera vesica & urethra ab *hypogastricis* & *hæmorrhoidalibus internis* habent.

§. 51. Vesica cum Urethra *mechanicè* considerata, exhibet *Syringam* aut *vesicam cannula instructam*, quæ *clysteres* in anum injiciuntur : quemadmodum enim ex Syringæ aut vesicæ ampliori parte ope compressionis liquor contentus per angustiores cannulam cum impetu ejicitur : ita quoque è vesica, posterius ampliori, ope fibrarum contracta & ab abdominis visceribus compressa urina (superata sphincteris vi) cum impetu per urethram profilit.

§ 52. Inter renes & arteriæ magnæ venæque cavæ truncum super emulgentes sita sunt duo corpora glandulosa minora, quæ vulgo *Re-nes succenturiati*, *capsulæ atrabiliarie*, *Glandulæ renales*

les ut & *Glandulæ ad plexum nerveum sitæ* vocantur. *Figura* eorum diversa est, uti & magnitudo: internè exiguam cavitatem pisum vix admittentem habent, quæ humorem nigricantem in se continet. Quis sit harum glandularum usus nondum adeò liquet.

§. 53. Restant adhuc *Genitales* utriusque sexus *partes*, quæ partim in ipsa abdominis cavitate, partim extra eam conspiciuntur. *Testes* virorum extra abdomen in *Scroto* continentur: quod per *suturam* & *septum* intermedium in dextram & sinistram partem dividitur, & ex duplici tunica *exteriori* & *interiori*, *Dartos* dicta, quæ fibris muscularibus constat & hinc contrahi potest, componitur: si tonus tunicæ internæ perit, scrotum redditur pendulum. Tunicæ hæ vocantur *communes*: *propria* verò testium tunicæ tres sunt, *Vaginalis*, *Erythroides* (quam tamen alii *musculum cremasterem* vocant, & sic duas tantum tunicas admittunt) & *albuginea*. Hæc tunicas propria testium *substantia* sequitur, quam nil nisi minutissimorum vasculorum congeriem esse, Recentiorum Anatomicorum industria detexit. Vasa testium sanguifera vocantur *spermatica* & *præparantia*, quæ inter peritonæi duplicaturam ad testes feruntur: ex propaginibus venarum coalescentibus & surculos emittentibus ac interjectis membranulis *corpus pampiniforme* & *pyramidale* oritur. Ex vasculis seminalibus coalitis & membrana albuginea involutis oriuntur *epydidymides* sive *parastatæ*, quæ sunt corpora, albicantia, & duriuscula



scula testiculis incumbentia, quæ gyrosis ac  
 erpentinis ductibus progredientes, hisce cessan-  
 bus *vasa deferentia* sive *ejaculantia* dicta consti-  
 tuunt, ac semen in testibus elaboratum ad vesicu-  
 las seminales ferunt. Sunt autem *vesiculæ semina-  
 les* capsulæ membranaceæ utrinque à posteriori &  
 inferiori vesicæ colli parte sitæ, quæ in cellulosis  
 cavitatibus semen asservant: & duobus *parvis du-  
 ctibus*, qui *septo*, quod *caput galli gallinacei* vocant,  
 distinguuntur, in posteriorem urethræ partem  
 emittant. Ne autem semen intempestivè in ure-  
 thram emittatur cujusvis ductus ostiolo *caruncula*  
 opposita est. Vesiculis hisce seminalibus cor-  
 pora duo glandulosa, *Prostata* dicta, proximè ad-  
 jacent, quæ tempore coitus liquorem per plures  
 ductus in urethram effundunt, quem seminis ve-  
 hiculum esse vulgò statuitur. Ad partes ge-  
 nitales extra abdomen sitas pertinet etiam *Penis*  
 sive *Membrum virile*, quod etiam *Virga* & *Coles* vo-  
 catur. Hujus pars anterior globosa, carnosæ &  
 exquisiti sensus *Glans* sive *Balanus* penis appella-  
 tur, cutis vero volubilis glandem tegens *Præpu-  
 tium* audit & inferius glandi adhæret ope *frenuli*.  
 Reliquum penis *cuticula*, *cute* & *panniculo* carnosæ  
 tegitur, sub quibus duo corpora nervosa, interne  
 admodum spongiosa, quæ per *septum membrana-  
 ceum* conjunguntur, *urethra*, *musculi* & *vasa* latent.  
 Musculi penis sunt *erectores* & *urethræ dilatatores*.

§. 54. *Mulierum partes genitales* itidem vel  
 in abdomine vel extra illud conspiciuntur. Ex-  
 ternæ, quæ *pudenda* vulgo audiunt, vel statim sub  
 aspectum

aspectum cadunt, vel diductis labiis demum apparent: illæ sunt *labia*, in quorum medio est *Vulva* sive *fissura magna*, & *pubes*, sive crines in adultiss labia tegentes, cujus superior & eminens pars *mons veneris* appellatur: hæc verò sunt *Clitoris*, *nymphæ*, *orificium vaginae* & *urethræ*. Inter partes genitales internas primò se offert *Uterus*, in cavitæ illa, quam ossa pubis, ilium, sacrum & ischium formant, quæque vulgo *Pelvis* audit, situs. Dividitur in *fundum* atque *cervicem* sive *collum*, cui *vagina* penem in coitu recipiens adhæret. Substantia ejus est membranacea & carnosâ & constat ex tribus tunicis, *communi* à peritonæo oriunda, *media musculoſa*, & *intima nervosa*: cavitæ, quam hæc tunicæ formant, in non gravidis vix fabam majorem aut amygdalam capit: hæc tendit ad cervicem admodum contractam. Annectitur Uterus posterius intestino recto, antè verò vesicæ urinariæ: latera verò per quatuor *ligamenta*, *duo* scilicet *lata*, totidemque *rotunda* alligantur: *rotunda* per duplicaturam peritonæi descendunt, & super os pubis oblique ducta prope clitoridem desinunt. Vidi ab hisce ligamenti speciem quandam herniæ inguinalis, quæ incipiente graviditate sensim sensimque disparebat, post partum verò semper redibat. Prope Uteri latera cernuntur *Testes* sive *Ovaria mulierum*, quæ utero ope ligamenti lati, quod *aliam vespertilionum* ob similitudinem, alii verò *vas deferens* appellant, alligantur. Interius in mulierum testibus cernuntur plures parvæ vesiculæ:

sive:

ve ovula, quæ primam foetus materiam in se continent: præter hæc vera ovula alia adhuc videntur, quæ *hydatides*, & *subventanea* vocantur, quæ nil nisi humorem aqueum in se continent, & ad conceptionem inepta censentur: de quibus vid. *Verheyen Anat.* p. 191. Utero etiam, in labiis fundi duo meatus, quos *Tubas Fallopianas* vocant, adhærent: harum usus est semen ad ovarium, ovulum verò ad uteri cavitatem ferre. Eandem etiam ad partes internas pertinet *Vagina*, super intestinum rectum sita, intus inæqualis & rugosa, ex cujus poris continuo, in majori vero copia in coitu, humor quidam eandem humorem transmittit.

§. 55. Hæc de partibus generationi dicatis, hisque sufficiant. Cum vero *Arteriarum*, *Venarum*, *lymphaticorum vasorum* ac muscutorum tractatio, ut & quædam *Osteologiam* concernentia ad hoc superflua sint, paucis de iisdem quoque agere consilium videtur.

§. 56. *Arteriæ* in Anatomia vocantur *vasa sanguinem à corde ad partes ferentia*. Omnes autem totius corporis arteriæ ad duas tantum, *artem* scil. & *pulmonariam* arteriam referuntur: quarum illa ejusque ramificationes sanguinem per universum corpus, hæc verò in pulmones distribuit. Constant arteriæ ex quatuor tunicis, *externa*, *nervorum* & in primis *vasorum sanguiferorum* textura densissima instructa, unde etiam *reticularis* & *vasculosa* audit: altera *glandulosa*, admodumque crassa: tertia *fibrosa* sive *muscularis* audit:



audit: quarta & intima *membranacea* sive *nervea* est. *Prima* harum tunicarum reliquas tegit: *secunda* serum superfluum *secernit*: *tertia* motui & *pulsui* arteriæ inservit: & quarta *sensibilitatem* largitur.

§. 57. *Arteria pulmonalis*, Veteribus *vena arteriosa* dicta, dextro cordis Ventriculo adhaerens pericardium egressa in ramum dextrum atque sinistram dividitur, quorum ille dextram, hic verò sinistram pulmonum partem ingreditur & sanguinem contentum per plures ramos minores, bronchia ubique comitantes, in universam pulmonum substantiam distribuit, quoad colorem externum venæ similis est hac arteria.

§. 58. *Arteria magna* sive *aorta*, antequam e pericardo egrediatur, *arteriam coronariam* cordis largitur, pericardium vero elapsa truncum, qui in *ascendentem* & *descendentem* sive *superiorem* & *inferiorem* dividitur, constituit. Ex *ascendente* primò prodeunt *arteriæ subclaviae*, *dextra* & *sinistra*, quorum illa altior & amplior, eo in loco, ubi aorta in carotides dividitur; hæc verò, humilior & angustior, ubi arteria deorsum retorquetur, enascitur. Hæ arteriæ quamdiu in thorace sub clavicula progrediuntur, nomen suum retinent, & ab inferiore parte *intercostales superiores* à superiore verò *mammarias*, *cervicales* & *musculares* *arterias* emittunt: thoracem vero egressæ *axillares* audiunt: antequam verò ad brachium delabuntur, superius *humeraria*, inferius *thoracica superior* &

*inferior cum scapulari* exindè prodeunt: reliquum harum arteriarum sub flexura cubiti in *ramum superiorem & inferiorem* divisum ramos ad manus atque digitos mittit varios. Post subclavias ex aorta *carotides* prodeunt, sinistra quidem ex superiore ipsius trunco, dextra vero ex principio subclaviæ dextræ: in collo à quibusdam vocantur *jugulares*. Quam primum caput attingunt, dividuntur in *Carotides internas & externas*: externæ in quatuor ramos, ad musculos linguæ & faucium, labia, cutim capitis &c. tendentes dividuntur: horum ramorum tertius constituit *arterias temporales*. *Carotides* verò *internæ* per totum cerebrum distribuuntur.

§. 59. Ex trunco inferiore primo omnium *arteriæ bronchiales* & deindè *intercostales inferiores* prodeunt, quas *phrenicæ* sive *diaphragmaticæ* sequuntur: paulo inferius thoracem egressa emitte *celiacam*, quæ in *ramum dextrum* atque *sinistrum* dividitur: hic, qui etiam *splenicus* vocatur: *gastriam majorem*, ex qua *Coronaria stomachica* & *Gastriam sinistram* oriuntur, producit: major hujus pars ad lienem vergit, antequam verò lienem ingre-  
diatur, in parte ejus inferiore *epiplois postica* & *epiplois sinistra*, vas breve arteriosum & *gastro epiplois sinistra* procedit: ille verò sive *dexter* producit superius *gastricam dextram*, aliis *pyloricam* dictam, & *cysticas gemellas*: inferius verò *epiploicam dextram*, *duodenam*, *hepaticam*, & *gastro epiploicam dextram*. Hasce sequuntur *mesaraica superior*, (quæ per *mesenterium* ad intestina tendit) *arteriæ emulgentes*

*Sentes, spermaticæ, lumbares, muscula superior & mesaraica inferior ex qua oritur ramus hæmorrhoidalis internus.*

§. 60. Arteriis hisce emissis aorta circa principium ossis sacri dividitur in duos ramos *iliacos* : ad quam divisionem prodit arteria *sacra*. Postmodum rami iliaci abeunt in *ramum externorem* minorem & *interiorem* majorem sive *iliacam majorem & minorem* : ab hac interna minori dependet *muscula inferior, hypogastrica*, (quæ ad podicem usque excurrens *hæmorrhoidales externas* constituit) & *umbilicales*, quæ in fœtu per funiculum umbilicalem ad placentam usque se extendunt,, in homine vero adulto in ligamentum vesicæ latera sustinens convertitur. Ab *iliaca externa epigastrica* & paulo inferius *pudenda* oriuntur. Postmodum ubi arteriæ *iliacæ* peritonæum egrediuntur, *Crurales* appellantur : hujus rami superiores ad poplitem usque sunt arteria *muscula, cruralis exterior, interior & poplitæa*. Infra poplitem descendens ab ea arteria *Suralis*, prope tibiam vero arteriæ *tibiæ tres, tibiæa* scil. *exterior, tibiæa posterior elatior, tibiæa posterior humilior* : reliquum arteriæ *curalis* per inferiora pedis distribuitur.

§. 61. *Venæ* Anatomicis sunt *vasa sanguinem* obscuriorem (arteriosus enim floridior est) à partibus ad cor revehentia. *Tunicæ* venarum eadem quidem ac arteriarum, sed tenuiores & alio ordine dispositæ sunt : nam prima est *membrancea*, uti quarta arteriarum : *secunda vasculosa* : *tertia glandulosa* : *quarta fibrosa* est, ex fibris annularibus



ibus constans. In venis hinc inde, inprimis circa earum divisionem *valvulae*, sanguinis reditum ad partes impediētes, reperiuntur. Venæ omnes ad tres tantum referuntur, *Venam scil cavam, Venam pulmonariam & Venam portæ* : De quibus singulis seorsim agemus.

§. 61. *Vena cava* dextro cordis adhæret ventriculo : prima quæ ab ejus trunco superiori prodit vena, est *coronaria* : postmodum, ubi pericardium egressa est, vena azygos, sine pari, ex utroque ejus latere prodit, & *venas intercostales* ad thoraciam intercostalia mittit : paulo infra hanc est *vena bronchialis*, supra eam verò *mediastina* : postmodum truncus in *subclavias* dividitur venas : quorum parti inferiori inseruntur *intercostalis superior, mammaria, mediastina, cervicalis, & muscula inferior*. Superiori vero *jugularis interna & externa & muscula superior* : in jugularem externam se exerant quoque *vena frontis & vena puppis* : *venæ autem raminae jugularis internæ* propago sunt. Jugularis interna sanguinem è sinibus cerebri aliisque anterioribus receptum ad venam cavam revehit. Postquam vena subclavia thoracis cavitatem ingressa est, *axillaris* nomen accipit, & recipit sanguinem *venæ scapularis internæ & externæ* : paulo post dividitur in duas venas superiorem *cephalicam* & inferiorem *basilicam* : *cephalica* inter anulum & minimum digitum constituit *venam brachii* : ex ramo cephalicæ interno, propè cubitum ramo majori basilicæ juncto, oritur *vena mediana*. Propè humerum basilicam ingrediuntur *venæ thoracica superior atque inferior*. D §. 62.

§. 62. Ex *venæ cavæ parte inferiori* variæ quoque oriuntur aliæ *venæ*, quarum prima est *phrenica* sive *diaphragmatica* : quam *hepatica*, im- tres aut etiam plures amplos ramos divisa, exci- pit. Postmodum ubi *hepar* deserit *vena cava*, emittit *lumbares superiores* : *atrabilarias* & *adiposass*. Hasce *venæ emulgentes*, renibus propriæ, sequun- tur, quarum sinistra altiorem occupat locum : in hisce venis sæpius naturæ lusus deprehenditur, dum interdum ramus ab iisdem ad thoracem ascendit, qui cum *venæ azygos* radicibus coiret & misceri videtur : interdum à lumbis & me- dulla spinali ramus in emulgentem delabitur : nonnunquam à renibus succenturiatis ramuli eò protenduntur : & tandem etiam ramuli à vicini- nis partibus in eam aperiuntur & hiant. vid. *Diermerbroeck. Anat. p. 527.* Porro etiam in *ve- nam cavam* sanguinem exonerant *venæ spermaticæ*, quamvis sinistra plerumque ad emulgentem sinistram tendat. Tandem quoque *lumbares inferiores* duæ, tres vel quatuor ex medulla spinali & musculis lumbaribus sanguinem ad *venam cavam* revehunt.

§ 63. Postea *vena cava* aortam subiens circa os sacrum in duos ramos majores sive *ve- nas iliacas* dirimitur, & in angulo divisionis *ve- nam sacram* modo simplicem, modo geminam recipit. Uterque deinde ramus in *ramum iliacum externum* atque *internum* dividitur : *iliaca interna* recipit *venam hypogastricam*, ad quam rami in viris à pene & vesica, in mulieribus à vesica, ab utero fundoo

ando ejusque collo, ut & *hæmorrhoidales externæ*,  
 iique rami, à partibus foramini ossis pubis in-  
 xerentibus prodeuntes, tendunt. *Iliaca* vero  
 externa, antequam cruralis nomen assumat *epi-*  
*gastricam* & paulo infra peritonæum *pubendam*  
*musculam inferiorem* admittit. Deindè *iliaca*  
 externa cruralis nomen assumens, iterum in ra-  
 rum majorem externum & internum minorem di-  
 mitur: hic vulgo *saphæna* audit & inter cu-  
 m & panniculum carnosum ad malleolum in-  
 ternum & ad pedis digitos usque excurrit, ubi  
 ami quidam in pollice concurrentes *Cephalicam*  
 vulgo dictam constituunt. Ramus autem major  
 externus prope articulationem femoris *ischiam*  
*superiorem* sive *minorem*, paulo inferius *musculam*  
*internam*, deindè *popliteam*, actandem *suralem* &  
*ischiam* majorem ad extremum pedis excurrentes  
 recipit.

§. 64. Tertia venarum, ad quam plures  
 iæ tendunt, est *Vena Portæ*, quæ ab Anatomicis  
 in truncum & ramificationes superiores & inferiores  
 dividitur: inferiores, ab iis, qui arbori Venam  
 portæ comparant, *radices*, superiores vero per he-  
 patis substantiam dispersi, *rami* vocantur: quo-  
 am illi venarum, hi verò arteriarum officio fun-  
 untur, & sanguinem à prioribus acceptum per  
 otum hepatis distribuunt. E ramis inferioribus  
 rimò *cysticæ gemellæ*, deindè *gastrica dextra* & in  
 liquibus *duodena* sanguinem in truncum infun-  
 unt.



§. 65. Postea truncus in duos ramos *sinistrum* scil. minorem & dextrum majorem dividitur, quorum ille *splenicus* hic verò *mesentericus* sive *mesariacus* audit. Splenicus, in ramum superiorem & inferiorem divisus, è pluribus aliis venis sanguinem recipit, & quidem inferior 1. *extramulis splenicis* copiosissimis in unum ramum majorem tandem coeuntibus. 2. ex *epiploica* & *gastroepiploica* sinistra. Superiori autem sanguis ex *vasis brevibus* infunditur. Ubi duo rami hi coalescunt & ductum splenicum constituunt, in cujus partem superiorem descendit *gastrica minor* & *major*, quæ cum gastrica superiori *coronariam* Ventriculi constituunt. Inferiori verò ejus partem *epiplois dextra*, *epiplois sinistra* & *vena pancreatica* inferuntur. A ramo splenico, mox ubi à trunco secessit, insignis ramus procedit, & ad intestinum rectum usque excurrit, quem vulgò *venam hæmorrhoidalem internam*, ad differentiam externæ ab iliaticis, venæ cavæ ramis, originem trahentis, vocant: nonnunquam tamen etiam interna ab initio rami portæ dextri vel ab ipso divisionis angulo oritur. Hæc inferius tenuibus ramulis anum amplectitur, postea verò assurgens ramulos à vesica & urethra, in feminis quoque ab utero collo, ac intestino colo sanguinem revehentes recipit, ac contentum sanguinem in ramum splenicum vel mesaraicum infundit.

§. 66. Ramus autem dexter venæ portæ sive mesaraicus, antequam in alios dividatur ramos, primò *epiploicam dextram* è ventriculi fundo

fundo & omento prodeuntem ac deinde *duodenam* five *intestinalem* à duodeni medio, jejuni principio, omenti superiori parte ac pancreate sanguinem revehentem recipit. Postmodum dividitur in tres venas majores, aut juxta alios, in *mesentericam dextram* duplicem & *sinistram*, quæ per duplicaturam mesenterii progredientes in plures ramos minores dirimuntur & ad intestina distribuuntur. Circa ramificationes venæ portæ adhuc notari meretur, nullas in iisdem, uti in aliis venis reperiri valvulas, quare sanguis etiam retrorsum in iisdem pelli potest.

§. 67. *Vasa lymphatica* Veteribus ignota à Recentioribus *Bartholino, Rudbeckio, Ruyschio, Nuckio* &c. detecta sunt. Sunt autem vascula tenuissima atque pellucida, lympham subtilissimam partibus revehentia, in quibus hinc inde noduli copiosi apparent, quæ nil nisi valvulæ seminuнаres, lymphæ motum promoventes & rediunt ad partes impediētes, sunt. Primum in hepate visæ fuerunt, postmodum verò Anatomici eas in variis aliis partibus deprehenderunt: ita ut hodie constans omnium Anatomicorum sit opinio, eas ab omnibus corporis partibus lympham revehere. Dum autem à partibus versus cor regrediuntur, hinc inde arterias atque venas comitantur ac glandulas conglobatas varias hinc inde ingrediuntur & egrediuntur: quare etiam hujus ingressus & egressus respectu, vasa lymphatica in revehentia & revehentia dividuntur. Tenuissima deinde quæ ex inferioribus partibus & ab-

D 3

domi-

domine prodeunt vasa lymphatica ad receptaculum chyli, lymphamque contentam in id infundunt: ductus thoracicus ea, quæ ex pectore oriuntur, recipit: quæ verò ex brachiis & superioribus partibus procedunt, vel pluribus ductibus jugulares venas ingrediuntur, vel per vas collare majus Ortlobio dictum, cisternam quasi constituens ampliorem lympham venæ subclaviæ infundunt. Plura de lymphâ ut & Glandularum conglobatarum structura & usu vide infra de *Lymphæ secretionē & motu*.

§. 68. Musculum esse motus in corpore instrumentum, unanimis Anatomicorum est consensus. Hujus tres sunt partes *Caput* sive *Principium*, *Medium* sive *Venter* & *Finis*, quem etiam *Caudam*, *Tendinem* & *Chordam* vocant. Præter hosce dantur etiam *musculi circulares*, quos communiter *Sphincteres* appellant, qui instar anuli sibi ubique similes sunt, & principio, medio atque fine carent: quales sunt *Sphincteros ani* & *vesicæ*. Præterea adhuc alii musculi, vel potius membranæ musculosæ, dantur, quos alias *musculos imperfectos* vocant. Inter ipsos autem musculos magna intercedit differentia, ratione *substantiæ*, *quantitatis*, *figuræ*, *situs*, *ortus*, *implantationis*, *coloris*, *coalescentiæ* & *usus*. vid. *Diemerbræck Anat.* p. 474. Quis sit musculorum numerus, quænam sit eorundem origo, insertio & actio ac quibusnam nominibus specialibus gaudeant, hoc loco recensere nimis prolixum foret: quare Medicinæ Tyro evolvat *Welschii Tabulam*



*Anatomicas* aliosque *Anatomicos*, ubi omnia hæcce sufficienter tradita, inveniet.

§. 69. Ultimo loco etiam de *Ossibus* dicendum est, quæ totius corporis basin constituunt: cum verò de capitis ossibus superius jam actum fuerit, reliquorum tantum hoc loco mentionem faciemus. Caput immediate *colli vertebrae*, quæ numero sunt *septem*, impositum est, quorum prima *Atlas*, secunda *Epistropheus*, tertia *Axis* vocatur, reliquæ vero, septima tamen excepta, quam quidam *colli basin* vocant, nominibus carent. Hæc *Thoracis vertebrae duodecim* excipiunt, quarum prima juxta *Welschium* *Lophia*, secunda *Maschaliter*, octo sequentes *Pleuritæ*, undecima *Arrephis*, duodecima *Diazooster* appellatur. Deinde *quinque lumborum vertebrae*, reliquis majores, sequuntur, quarum prima *Nephrites*, ultima *Aschalites* vocatur, tres mediæ verò *anonymæ* sunt. Sub hisce *Os sacrum* & *Coccygis* sita sunt: illud ex quinque vel sex ossibus, in infantibus laxius, in adultis verò firmitus coherentibus, constat, ita ut in adultis unicum tantum os constituat: hoc verò ex tribus vel quatuor ossiculis & duabus cartilaginibus compositum est. *Vertebrae* cum osse sacro & *coccygis* constituunt *spinam dorsæ*, quæ à Græcis *Rhachis* vocatur, unde infantum affectus, *Rhachitis* dictus, nomen obtinuit. Intus quælibet *vertebra* habet foramen: unde iris sibi invicem superimpositis, insignis cavitas per totum *vertebrarum tractum* excurrens, *medullamque spinalem* includens, oritur. Ne verò fa-

cilè à se invicem secedant vertebræ, mediantibus cartilaginibus, connectuntur. Reliqua de Vertebrais videantur apud Anatomicos.

§. 70 Cum duodecim thoracis vertebris totidem costæ, antè cum sternò cohærentes, connectuntur, uti superius jam monitum fuit. Superiori & posteriori thoracis parti os latum, triangulare, instar scuti incumbit; pars ejus exterior gibba *scapulæ dorsum* vocatur, hujus pars eminentior *spina*, cavitates verò, quas supra & infra respicit, *inter scapulia* audiunt. Præterea etiam in eo tres occurrunt processus; *brevis* scil. in cuius superficiei cavitatem caput ossis humeri inseritur: *longus* (quem & *Acromium*, humeri mucronem & *humeri summum* vocant,) quorum latior claviculæ extremitas connectitur: & tandem *mediocris*, *coracoides* & *anchoroides* dictus. *Claviculae* sunt ossa semipedem longa, crassitie digiti minorem vix excedentia, quæ cum scapulis & sternò connexa, scapulas & brachia firmant.

§. 71. Inferius utrinque ad latus ossis sacri situm est *Os innominatum* sive *Os coxæ*, quod in adultis quidem unicum tantum os est, in infantibus autem ex tribus distinctis constat ossibus, quæ etiam in adultis nomina sua retinent. Primum horum ossium *Ilium* vocatur: secundum est *Ischium*, quod etiam *Coxendix* & *Schia* vocatur: in hoc *acetabulum* sive *pyxis*, globosum femoris caput recipiens notari meretur: ab hoc osse *Malum Ischiadicum* sive *Schiaticum* nomen obtinuit. Tertium *Os pubis* appellatur.

§. 72. Ossibus truncum constituentibus superius & inferius *ossa artuum*, sive *manuum* & *pedum* adhærent. Ossa manuum sunt vel *humeri* vel *cubiti* vel *extremæ manus*, sive manus strictè dictæ. Os humeri unicum tantum est validum & magnum, quod superius capite magno & globoso instructum cum scapula per arthrodiam, inferius verò cum duobus cubiti ossibus per ginglymum articulatur. Cubiti ossa sunt *Ulna*, (quæ etiam *Cubitus*, *Os cubiti* & *Focile majus* vocatur) & *Radius* sive *Focile minus*. *Manus extrema* in tres partes, *Carpum*, *Metacarpum* & *digitos* dividitur. *Carpus* octo parvis ossibus, *Metacarpus* verò quatuor longis & gracilibus constat. Digitorum ossa, si primum pollicis annumeratur, sunt quindecim, quæ in tres ordines, Græcis *Phalanges* dicti, disposita sunt. Ossa primi ordinis reliquis majora sunt, tertii ordinis verò omnium minima & unguibus teguntur.

§. 73. Uti manus ita & pedis tres sunt partes, nimirum *Femur*, *Tibia* & *Pes extremus*. Os *femoris* admodum validum & totius corporis longissimum est: superius caput ejus *magnum* & *globosum* in femoris acetabulum reconditur: propè hocce caput sive processum magnum duo alii processus, *Trochanter* scil. *major* & *minor* observari merentur. *Tibia* duobus ossibus, *tibia* propriè dicta & *fibula* constat: superius ubi os *tibiæ* cum femore connectitur, anterius appositum est os parvum umbonis figuram referens, quod *Patellam* vocant: pars anterior *tibiæ* acuta *spina* audit:



dit: inferius processus tibiæ *malleolum internum* in latere verò opposito fibula *malleolum externum* constituit. Pedis extremi ossa in *Tarsum* sive *Pedium*, *Metatarsum* sive *Metapedium* & *Digitos* dividuntur. *Tarsus* ex septem compositus est ossibus, *Talo*, (alias quoque *Osse balistæ* & *astragalo* dicto) *Calcæ* sive *Calcaneo*, ossium pedis maximorum *Osse naviculari*, *Cuboide* & *tribus innominatis*. Ossium *Metatarsi* quinque, digitorum verò quatuordecim sunt. In internodiis ossium manuum ac pedum officula parva *Anatomicis Sesamoidea* dicta adhuc notari merentur.

§. 74. Omnia corporis ossa, quo firmitus coherere & basis reliquarum partium esse queant, variis modis connexa sunt. Est autem connexio illa vel *ad motum* vel *ad quietem*: illa communiter *Arthrosis* sive *Articulatio*, hæc verò *Symphysis* seu *Coalitus* vocatur. Est autem Articulatio alia *ad motum manifestum* sive magnum & *valde conspicuum*, alia *ad obscurum* sive minus sensibilem & *parvum*. *Articulatio ad motum manifestum* est triplex, & quidem 1. *Enarthrosis* sive *Inarticulatio*, quando caput magnum protuberans à cavitate profunda excipitur, uti in articulatione ossis femoris cum ischio. 2. *Arthrodia* sive *Articulatio superficialia*, cum caput parvum cavitatem superficiariam ingreditur, qualis articulatio in osse humeri cum scapula cernitur. 3. *Ginglymus* sive *mutua articulatio*, cum os aliud in se recipit & ab alio iterum excipitur, uti fit in articulatione humeri & cubiti. *Articulatio verò quæ fit ad motum*

*um parvum*, deprehenditur potissimum in ossibus carpi & metacarpi, ut & in osse calcis & astragali, in osse calcis & tali, ac tandem in osse cuboide & calce. Quod *Symphysin* seu *Coalitum* concernit, eisdem triplex est 1. *Satura*, quando ossa sibi invicem inæqualiter junguntur. Est autem *sutura* vel *vera* vel *spuria*: illa est, quando ossa instar serræ se excipiunt; talis connexio deprehenditur in futuris cranii, *coronali* scil. *sagittali* & *lambdoidea*: hæc verò est, quando ossa instar squamarum sibi invicem incumbunt, qualis est in connexionione ossis temporum & syncipitis, unde etiam communiter futura squamosa vocatur. 2. *Harmonia*, sive ossium compositio per simplicem lineam, eamque vel rectam vel obliquam, vel circularem, uti est connexio ossium maxillæ superioris. 3. *Gomphosis* sive *Conclavatio*, quando os ossi instar clavi infigitur, ut dentes maxillis. Præter hancce ossium immediatam connexionem datur adhuc alia mediata, quando ossa vel ope ligamentorum vel ope cartilaginum & musculorum conjunguntur. Primus hujus connexionis modus vocatur *Synevrosis* aut *Syndesmosis*, & deprehenditur in conjunctione femoris cum osse ischio. Secundus *Synchondrosis* audit, uti fit in connexionione costarum cum sterno. Tertius *Syssarcosis* appellatur: qualis in omnibus articulis, musculis obductis, & dentibus cum maxillis, ope gingivarum conjunctis, deprehenditur. Reliqua, quæ ad Osteologiam spectant, petantur ab *Anatomicis*.

§. 75. Hæc de structura partium corporis generali & speciali in gratiam Tyronum annotasse sufficiat. Unicum tamen adhuc circa structuram hancce monere consultum, imò necessarium, duco: quod sc. ex omnibus satis superque elucescat, totam corporis structuram & singularum partium conformationem à principio quodam intelligente & rationali dirigi: id quod apparet 1. ex *numero particularum constituentium*: quælibet enim pars certum & definitum particularum numerum ad sui constitutionem postulat, quod si non observaretur, magnitudo partium facile vel excederet vel deficeret. 2. ex *selectu particularum constituentium*, ad ossis enim compositionem, ad nervos, ad vasa &c. diversæ requiruntur partes constituentes. 3. ex *figura*: quælibet enim corporis pars peculiarem atque à reliquis differentem habet figuram. 4. ex *mutuo respectu magnitudinis partium inter se*, uti enim figura, ita & magnitudo partium non solum respectu sui, sed etiam intuitu reliqui totius corporis ad conformationem decentem quam maximè facit; quod si non observaretur, corpus facillimè monstruosam acquisiturum esset figuram. 5. ex *conformatione partium respectu usus*: quælibet enim partes tam quoad figuram, quam quoad magnitudinem ita conformatæ sunt, ut usibus specialissimis, ad quos destinatæ sunt, optime inservire queant. Quæ omnia, si quis æqua mente considerat, longè facilius animæ humanæ rationali, quam principio cuidam bruto aut fortuito partitici-



cularum variarum concursu, hæc omnia adscribet.

## CAPUT III.

De

## Principio motus in corpore.

*sive*

De

## Natura.

§. I.

§. 1. Sic E. paratam jam habemus machinam humanam cum omnibus partibus (fluidis exceptis, de quibus inferius erit sermo) ad ejus integritatem facientibus, sed cum trunci instar immobilis jaceat, & ideò vitam adhuc expectet, principium quoddam agens quærendum est, quod & motum & vitam immobili nostræ machinæ largiri, ejusque destructionem, ad quam respectu mixtiones & structuræ adeo prona est, quantum quidem possibile, avertere queat.

§. 2. Horum quidem principiorum totæque occurrunt, ut, quodnam eligere velis necicias: hic enim *anima brutorum sensitiva* cum *vegetabilium vegetativa*, varia fermenta, fracedinem, ut potius rancorem spirantia: illic varii spiritus vitales & animales, aërei, ignei, lucidi, insiti, influi, aut nescio quibus qualitatibus præditi, apparent:

parent: ex hac parte cogitabundus & medita-  
 bundus *Microcosmeter*, exultans *Cardimelech*, obe-  
 sus *Gasteranax*, iracundus & indignabundus *Cos-*  
*meterges*, & mollis atque muliebris *Rachammelca*:  
 ex altera verò parte Chimicorum sapida, odori-  
 fera & evaporabilia principia, *Sal*, *Sulphur* & *Mer-*  
*curius*, partim absolutum, partim divisum in cor-  
 pus humanum expetunt imperium, & literas pa-  
 tronorum & inventorum commendatitias, mira-  
 bilium effectuum ab ipsis professorum indices  
 scriptis variis petentibus & non petentibus of-  
 ferunt: imò tandem etiam sunt, qui neglecto  
 principio interno, uti bestiam, ita etiam homi-  
 nem in meram mutare machinam & omnes  
 actiones à solo mechanismo derivare & con-  
 sensum aliorum variis machinis extorquere vo-  
 lunt. Quare in principia hæcce paulo altius  
 inquirere, non inconsultum sed necessarium vi-  
 detur, quo Medicinæ Tyronibus, quid iisdem  
 tribuendum, & quantum eorum energiæ conce-  
 dendum sit, pateat & appareat.

§. 3. Antiquiores Medici nullum aliud  
 principium corporis movens præter animam ad-  
 mittebant, eique omnes actiones in corpore tri-  
 buebant: quam tamen doctrinam, animæ va-  
 rias facultates tribuendo, easque quasi ab anima  
 abstractas considerando, postmodum satis ob-  
 scuram reddebant. Qui autem hosce sequeban-  
 tur Philosophi & Medici, etsi animam rationa-  
 lem & immaterialem corpori organico junctam  
 esse, sciverint & agnoverint, nihilominus tamen,

que-

uoniam modum, quo anima immaterialis in corpus materiale agere illudque movere posset, comprehendere nequibant, varia alia principia media, quæ quasi interpretum loco esse debebant, in medium proferebant, inter quæ variæ animæ rationali substitutæ primum locum obtinent: cum enim animalia bruta absque rationali, vegetabilia vero absque sensitiva vivere & conservari cernerent, homini easdem quoque tribuebant, & sic tres distinctas in homine animas, rationalem, sensitivam & vegetativam supponebant, quarum primæ rationem, secundæ sensum & motum, tertiæ nutritionem & auctiorem concedebant. Cum verò in hac doctrina non paucæ deprehenderentur difficultates, alii, missa anima sensitiva & vegetativa, Spiritus varios vitales, animales, naturales & genitales in scenam produxerunt: & cum hacce de spiritibus opinio non paucis arrideret, variis modis eandem exornare ac magna elogia spiritibus tribuere ceperunt: affectiones autem spirituum juxta *Viridig. Medic. Spirit. in Proëm. §. 12.* sunt. 1. *Vivacitas seu vividitas, vigor, sensatio: vis generandi, sese multiplicandi in infinitum, creandi ideas.* 2. *Subtilitas, tenuitas, teneritudo, penetrabilitas, pernicitas, homogeneitas, simplicitas, paritas, serenitas.* 3. *Caliditas, igneitas, lumen, luminositas, pelluciditas, claritas, radiatio, illuminatio.* 4. *Mobilitas, levitas, circulatio, irradiatio, velocitas, influxus, extensio, robur, firmitas.* 5. *Humiditas, dulcedo: in diversis tamen temperamentis diversi sunt spiritus: magna-*



nimus enim spiritus leoninos: meticulosus, leporinos: stupidus asininos habet. Ut alia taceam de quibuss admodum prolixè tractat *Wirdig*. l. a. Hi ipsi tamen Spirituum Patroni mox in diversas abièrunt sententias, dum de numero & qualitate spirituum inter se litigare ceperunt: alii enim quatuor, alii tres, alii duos, alii unicum tantum admittere voluerunt: unde sensim cum ipsis spiritibus magna eorum authoritas & ficta elogia perire ceperunt, solo animali spiritu excepto, qui adhuc hodie à non paucis defenditur, eique omnes actiones corporis adscribuntur. Sed & hic adhuc habent quod disputent, hic enim æthereum, ille nitrosum, iste acidum, alius sulphureum, alius urinosum, alius lucidum eum esse clamat, & prolixis argumentis suæ sententiæ robur conciliare conatur.

§. 4. A spirituum doctrina parum differt *Helmontii* de archeo sententia, quam ferè antiquatam nuper denuo stabilire conatus est *Henricus* ab *Heer* peculiari Tractatu quem *Archivum Archei* nominat. Hic archeus in primis archeus faber magnis maectatur laudibus, nam l. a. p. 149. dicit, *Archeum* esse *Animæ sensitivæ substerniculum*, & hanc in *Aura Archei* gliscere luminis instar, sicq; existere *Archeum* & fieri lucidum hominis imaginem: & p. 151 *Hic Archeus* est actus corporeus auræ istar idea seminali instructus & suis fermentis armatus, estq; *Vulcanus*, generationis nostræ mirabilis faber, aura indicibilis parvitat, ubi post conceptionem sui fomitem inveniens statim se incipit amore suæ Egoitatis movere, dila-

*dilatare, se investire, juxta suæ seminalis ideæ ductum se explicare & stupendam hominis structurā moliri &c.* Hic in throno Duum viratus, stomacho scil. & splene, in primis autem in stomachi orificio superiori quasi punctualiter in unius membranæ medullæ spissitudine habitat, & radiative, appetitive, elective & attractive sive luminariter ope Blas motivi & alterativi agit, & pro objectorum diversitate varias ideas cudens, modo gaudio, modo tristitia afficitur: imò interdum in furorem conjicitur, & ens quasi stultum evadit. Præter Blas motivum & alterativum variis quoque fermentis ossifico, cutifico, membranifico instructus est, quorum ope corporis partes cudit & conservat. Quamvis autem Archeus unus sit, *archei tamen sunt tot particulares, quot partium nostrarum divisiones, tot archei particulares, quot sunt officinæ digestionum, & hi stabulantur in visceribus tanquam Rectores, cum stomachico Archeo gubernatore constituentes unum Ens aëreum archeale despoticum.* Hasce autem potestates archei particulares ab archeo fabro tanquam sigilla archealia habent: quodlibet autem sigillum archeale juxta numerum septem viscerum planetariorum proprio instructum est fermento. Archeus itaque faber non princeps tantum, sed primæ quoque ceu principalis digestionis archeus est, ubi beneficio fermenti acidi stomachici, ceu instrumenti elevati, quod splen inspirat, chylicat. Hunc sequitur *Archeus secundæ digestionis*, qui ope secundi sigilli archealis, fermenti immutativi, correctivi

E &

& perfectivi fellis scil. aciditatem chylo inexistentem corrigit, chylumque in salem purè salisum mutat, serum superfluum segregat ac feces præcipitat. *Tertiæ autem digestionis* Archeus per fermenti chymifici exaltativam vim aquositatem chyli separat, eum inspissat & in chymum convertit: aut juxta *Heerium* in chyli receptaculū beneficio fermenti perfectivi, depurativi & secretivi superfluum humiditatem à chylo separatam per peculiarem ramum ad renes mittit. Chymus hoc modo depuratus & exaltatus à *quartæ digestionis Archeo*, cordis scil sugendo quasi attrahitur in ventriculum dextrum, seu cameram quartæ digestionis regiam: suctus autem hic est Blas Archei motivum in dextro ventriculo stabulans, & in ductum thoracicum chymiferum & venam subclaviam prorogatum: hic per vim instantaneam fermenti cruorifici chymus in cruorem convertitur, & per lumen vitale archei sive blas motivum, motus cordis principium, ulterius pellitur: & in pulmonibus ab aëre elemento hominis conservativo aërescit: ne verò aër nimis frigidus ad pulmones feratur, naribus & cibibus præposita est Potestas, Custos dicta, qui dictum aërem alterat: si verò nimis frigidus fuerit aër, custos narium sternutatione, laryngis vero custos tussis contra eum pugnant, & laticem ei obijciendo eius vim infringere conantur. Postea sanguis attrahitur ad cordis Ventriculum sinistrum, ubi *quintum archeale digestionis* sigillum est. Hic archeus cordis per fermentum spiritui-

ficum



Sicum sanguinem attenuative & transmutative in  
 balsamicam auram, in entelechiam salis volati-  
 lis, in actum activissimum post unum archeum  
 insitum, in vitæ substerniculum, in apicem quin-  
 que digestionum, in puritatis cœlum, verbo in  
 spiritum vitalem, purgando, dividendo, subtili-  
 sando, alterando & elevando transmutat: qui  
 spiritus vitalis postmodum omnibus partibus  
 communicatur, sive in easdem influit, ubi ab  
 Archeo insito modificatur, & dispensatur, non  
 autem immutatur: undè etiam in cerebro spiri-  
 tus vitalis non convertitur in animalem, sed ex  
 duumviratu ascendit lumen illuminans spiritum  
 in cerebro: unde sumit determinationem suam  
 ex duumviratu fontaliter, è cerebro potestative,  
 in ipsa parte executive & determinative, in quam  
 influit citra omnem suæ naturæ immutationem.  
 Tandem, ubi singulæ partes sanguine aluntur, &  
 spiritu vitali influo irrorantur & refocillantur, si-  
 millum vitale *digestionis sextæ* se aperit, ubi archeus  
 omnia in partium usum convertit. Hisce adhuc  
 accedit *Archeus generans, exercens potestatem sui singu-*  
*larem generativam in unione sexuali, ubi archeus agit*  
*pro diversitate characteris sexualis per marem coagen-*  
*do cum archeo femellæ & archeus femellæ coagendo*  
*cum archeo maris: totum autem absolvitur vitaliter,*  
*idealiter, archealiter, fermentaliter.* Hæc sunt, quæ  
 ex Heerii *Introductione in Archivum Archei* breviter  
 excerptare consultum duxi: plura qui desiderat  
 eisdem tractatum evolvat, ubi multa adhuc, quæ  
 ad stabiliendos archeos spectant, inveniet.

§. 5. Proxime quoque ad hanc Helmontianam doctrinam ea, quæ de variis corporis Regibus *Dolæus* protulit, accedunt. Hic scilicet quatuor Spiritus insitos, quibus Regium nomen imposuit, in scenam produxit. Regem capitis *Microcosmetorem* appellat; qui vero in corde residet, *Cardimelech* audit: Abdominis præses *Gasterranax* & *Bithnimalca* vocatur; quibus Regina uteri, *Racham Melcha* dicta, accedit sub horum signis spiritus in varios manipulos divisi militant, quorum ope Regeshi hostes eorum Regno imminentes impugnant, aut etiam aliis Regibus quibuscum amicitiam colunt, succurrunt ita *Microcosmetor* in *phrenitide* & *delirio* à sanguine nimis effervescente & scoriis sulphureis in furorem actus, *Cosmetorges* sive *Rex iræ* fit, ac spiritus animales in furore suo dispergit, unde necessario deliria sequuntur: in *melancholia* verò, ob scintillas ex acido vitioso surgentes, torpidus redditur cum satellitibus; & cum hoc modo Rex suorum non amplius curam gerat, satellites ejus imperpetuo sunt metu atque tristitia, uti pulli à Gallina derelicti. In *affectibus soporosis* *Microcosmetor* sopore tanquam nebulis offusis cinctus, ut plurimum in viscido limo acido hæret, quo glutinum etiam interdum satellites obducti sunt, unde functionum variarum cessatio necessario sequitur. In *Apoplexia* hostis incedit gladius, hastatus aliisque ferreis cuspidibus, & armis instructus inopino fulminis more ingruit, & cæsis satellitibus ipsum quoque Regem è solio suo turbat.

Convulsi

*Convulsione*, hostis variis armis, hastâ, gladiolis, bipennibus obtusis & obtusangulis munimenta externa, in quibus milites Regis excubias agunt, aggreditur, quibus reliqui satellites magno cum impetu & velocitate succurrunt, unde membrorum succussiones sequuntur. Ut alia quam plura, quæ de Regibus hisce eorumque satellitibus, variis hostibus & armis in *Dolæi Encyclopædia Medica* prolixius traduntur, silentio præteream.

§. 6. Cum tamen hæcce principia non omnibus arriserint, alium corporis motorem alii quæsiuerunt, & præeunte Cartesio omnia, uti in Macrocosmo, ita etiam in Microcosmo ex mechanicis principiis deducere ceperunt, vi quorum principiorum hodiernis temporibus non solum brutorum, sed & hominum corpora in machinas mutata fuere. Ne verò novitatis accusari posset hæc opinio, ipsum Medicinæ parentem Hippocratem ejus Authorem statuunt, eique hunc mechanismum exactè cognitum fuisse disertis verbis asserunt. Juxta hæcce E. principia in homine (quem ceu machinam hydraulico pnevumaticam considerant) omnia ex necessitate mechanica fiunt; anima rationalis nullum habet imperium in corpus suum nisi admodum restrictum: imò sunt, qui etiam ipsas cogitationes, per tot secula animæ rationali concessas, ei eadem adimere & materiæ fluidæ, ætheris maximè mobili, sub spirituum animalium nomine ex cerebro fluenti, & corpus mechanicè moventi, tribuere conantur: hæc ipsa quoque materia fluida



da per nervos ad partes lata juxta eorum opinionem, omnium causa est actionum; Ut alia specialia quæ communiter ad confirmandum mechanismum proferunt, silentio præteream.

§. 7. Hæ sunt communes Authorum de motore corporis opiniones, quas si penitus considero, non satis mirari possum, cur plerique Medicorum adeò anxie inquisiverint in principium quoddam agens actionesque corporis dirigens, cum tamen in ipso corpore contineatur spiritus intelligens & rationalis ad movendum præ cæteris, in scenam productis, aptissimus. Miror sane cur in detegendis & exornandis hisce idolis vel potius non entibus adeò operosi fuerint, ac simul oleum atque operam perdiderint. Quæ enim quæso necessitas efflagitavit, animæ rationali, animam sensitivam, vegetativam, archæos & varios spiritus substituere & corporis imperium dividere? ego sanè nullam prægnantem video causam. Si enim actus rationalis cæteris corporis actionibus est excellentior, cur idem principium quod actiones nobiliores exercet, reliquas ignobiliores perficere non posset? Peccant contra communem Philosophorum consensum, qui consequentiam à majori ad minus concedunt, & eundem, qui potest majus vel plus, minus etiam posse uno ore asserunt. Sed respondent hic communiter. 1. inter materiale & immateriale nullum dari commercium. 2. in brutis anima rationali destitutis actiones vitales & naturales fieri uti in homine. 3. Spiritus,

tus, ad quos anima rationalis pertinet, ad operationes suas non indigere organis sive instrumentis materialibus, corpus verò ceu materiale materiali quoque opus habere motore. 4. Animam nullam sui corporis & actionum vitalium habere cognitionem & 5. comprehendi non posse modum, quo anima in regendo corpore utatur.

§. 8. Verum enim verò quamvis hæc argumenta satis speciosa videantur, parvi tamen, si penitus considerantur, sunt momenti! nam 1. falsissimum est inter materiale & immateriale nullum dari commercium; ipsum enim corpus humanum, animæ immateriali domicilium præbens, falsitatis hocce assertum arguere potest: cui quæso bonò anima immaterialis inclusa esset corpori materiali, si nullum inter duas hæce hominis partes essentielles deberet esse commercium? nonne anima in multis actionibus, in sensus externos incurrentibus, corpore ceu instrumento utitur? si E. corpus in hisce actionibus est animæ instrumentum, necessario quoque commercium animæ & corporis arctissimum est supponendum. Spiritus fictitii, qui hoc loco ceu mediatores & interpretes producuntur, parum lucis huic sententiæ affundunt, cum enim sint materiales juxta propriam confessionem, nullum quoque, stante hacce sententia, cum anima rationali, habere possunt commercium. Quod 2. bruta concernit, facilè largior, ea immortali & rationali anima, qualis est humana, carere,

sed omnem prorsus sensum & rationem , imò etiam analogon rationis ipsis denegare , & in meas machinas eadem mutare, uti falsissimum , ita & absurdissimum est. Aspiciat enim quis brutarum & eorundem actiones proba ac æqua mente consideret , & dicat annon ex omnibus illorum actionibus manifestè elucescat , ipsis inesse principium quoddam intelligens & volens, quod bona & corpori proficua eligere , noxia verò & corpori damnum inferentia fugere novit. Eò magis autem conformabitur in hac sententia , si debito modo perpendere vult animi pathemata brutorum , quanto amore alios prosequantur, alios vero odio habeant, & quæ sunt alia. Sed regerunt hic communiter omnem materiam cogitationis esse incapacem & hinc absurdum, impium atque contra sacram scripturam brutissimam aliquam assignare rationem , si enim anima rationalis brutis concederetur , immortalitatem quoque animæ iis esse concedendam. Huic autem objectioni facilè responderi potest , quod adhuc sub iudice lis sit, an omnis materia absolute omnis cognitionis incapax sit, & si quis præfractè hocce asserere vellet , eum asina Bileami facilè convincere posset. An verò impium & contra S. S. sit, ego quidem non adeò facilè largior eadem enim S. S. quæ *Psalmo 32. v. 9.* intellectum equis & mulis denegat, *Esaïæ cap. I. v. 3.* cognitionem bovi & asino tribuit. Nec etiam sequitur, si anima brutorum aliquo modo rationalis, E. & immortalis est : Deus enim uti ex specia-



speciali gratia animæ humanæ immortalitatem concessit, ita eandem ex mero beneplacito brutis denegavit, & voluit ut post mortem anima cum corpore brutorum periret. Sed aliud adhuc superest argumentum admodum speciosum, quo brutorum corpora machinas esse probare volunt; ajunt scil. Deum uti sapientia omnes creaturas superat, ita etiam vi suæ omnipotentia eum tales machinas viventes producere potuisse, quæ hominum artificia maximopere superant. Omnipotentiam DEI credo, an verò juxta hypothesin animalia, à Deo creata, tantum machinæ sint, dubito, imò ob certas rationes (inferius de mechanismo allegandas) prorsus nego. 3. Quod tertiam concernit objectionem, spiritus nullis indigere organis ad suas operationes, quoad alios quidem spiritus facilè largior, quoad animam verò humanam, quamdiu cum corpore unita est, nego. Nam quamvis animam è corpore separatam suas operationes edere posse omnes fateantur, illud tamen certissimum est, animam cum corpore unitam corpore carere non posse, id quod ebrii, apoplectici & delirantes satis superque testantur: undè etiam perperam postmodum concluditur, quia corpus est materiale E. & motore opus habet materiali: hoc enim si certum esset, Deus, qui mundum materiale gubernat, regit & conservat, materialis dicendus esset, quod tamen contra omnem rationem & impium est. 4. Quarta objectio, quod anima nullam sui corporis & actionum

habeat cognitionem, difficultatis fateor plena est, difficultas tamen aliquo modo tolli potest, si ordine tractatur hæcce objectio : quo verò omnes difficultates eo facilius tollantur, distinguendum est ante omnia inter Rationem & Ratiocinium ; illa animæ soli, quatenus immaterialis & spiritualis est, propria est, hoc verò cum corpore commune habet, ita quidem ut nullum ratiocinium fieri queat, nisi anima cum corpore concurrat, & de rebus per sensus externos perceptis iudicium ferat : easque vel appetat vel fugiat : undè etiam ratiocinium, respectu simplicis rationis, animæ soli competentis, admodum, ut ita loquar, crassum est, & multo tempore indiget, donec aliquid firmum & stabile aut verum inde sequatur, cum è contra effectus rationis ab anima proficuentes sint admodum prompti & nullo longo ratiocinio indigeant. Ratiocinium E. semper sensibus externis opus habet, & beneficio eorum de objectis varias format ideas : undè etiam hoc respectu canon Philosophorum, *quod nihil sit in intellectu, quod non prius fuerit in sensu*, certissimus est ; cum è contra respectu rationis simplicis, animæ soli competentis, sit falsissimus : hæc enim internè in corpore omnibus partibus præsens ceu spiritus omnia cognoscit, idque absque ullo sensuum externorum adminiculo. Quod cum juxta sanæ rationis dictamen certum sit, facile liquet in intellectu nullas formari posse ideas earum rerum, quæ interiorius in corpore geruntur & latent : quam primum vero ope cultri Anatomici

mici interiora deteguntur, intellectus de iisdem sibi format ideas, quamvis & hæ sint admodum crassæ, uti superius jam monitum fuit, veram enim rerum essentiam intellectus raro plenarie cognoscere potest. Quod tandem §. ultimam concernit objectionem, risu digna est: quis enim adeò absurdus esset, ut propter ignorantiam modi rem ipsam negare auderet? animam corpori intimè unitam esse scimus, modum ignoramus: quivis scit & experitur se cogitare, modum tamen quomodo cogitet, ignorat; Deum omnia gubernare scimus ac credimus, modum nescimus; & nihilominus tamen non obitante hacce ignorantia, res ipsa certissima est & manet: pari modo se res habet cum operationibus animæ in corpore, quarum etsi intellectus nullam habeat cognitionem & modum ignoret, nihilominus tamen easdem ab anima sola dependere certissimum est.

§. 9. Hæc quoad objectionum solutiones sufficiant, videamus jam quænam sint rationes, quæ animæ imperium in corpus ulterius confirmare queant: sunt autem sequentes: I. *Anima rationalis est causa vitæ naturalis*, postquam enim Deus ex terra creasset corpus humanum, inspirabat ei *spiraculum vitarum* i. e. vitam ei inspirabat: per hoc autem spiraculum vitarum hætenus omnes Theologi nil nisi animam intellexerunt rationalem. Si E. post inspirationem animæ rationalis corpus, antea trunci instar immobile jacens, statim vivere cepit, necessario quæque anima



anima rationalis causa vitæ naturalis statuenda est. Notanter autem S. S. dicit, Deum ipsi inflasse spiraculum vitarum, hoc ipso enim indigitatur, animam non solum propriam vivere vitam, ita ut etiam à corpore separata subsistere possit, sed etiam cum corpore unitam esse causam vitæ naturalis, undè etiam recte in plurali dicitur, quod sit spiraculum vitarum. 2. Omnes in universum Medici atque Philosophi uno ore fatentur, *animam rationalem toti corpori singulisq; ejus partibus arctissime esse unitam* & uti vulgo loquuntur, *totam esse in toto corpore ac totam in singulis partibus*: Si E. anima singulis partibus præsens, iisdemque arctissime unita est, necessario quoque ceu spiritus intelligens & rationalis statum omnium partium intimè cognoscere, iis maturè prospicere & noxas imminentes quantum possibile & secundum vires à Deo concessas ac juxta leges præscriptas avertere potest; animæ enim quam maxime interest, ut corpus, quod ejus instrumentum & propter animam creatum est, quam diu sartum tectumque conservetur, quo eo tanquam instrumento ad operationes suas in hoc mundo peragendas decenter & legitime uti possit. 3. Animæ imperium in corpus luculentissime probat *motus voluntarius*, in quo corpus & ejus partes merè instrumentaliter se habent: v. g. concepit quis aliquid mente, quod ne oblivioni tradatur, in chartam conjicere vult: eo ipso momento manus dextra voluntati obtemperans apprehendit pennam & id quod

mente

mente conceptum est chartæ mandat: oculi ipsi simul diriguntur in chartam atque omnia probè intuentur, nullum alium in finem, quam ut anima oculorum ope percipiat, an omnia in charta debito modo consignata sint, & id quod mente conceptum erat, exacte referant. Quis quæso in hoc actu est, qui manum dirigit & oculos? nonne anima rationalis est causa efficiens principalis, manus verò animæ organum sive instrumentum, cujus ope totum hunc actum absolvit? Si E. anima causa efficiens hujus motus est, necessario quoque, instrumentorum ad hunc motum peragendum necessariorum & convenientium cognitionem habere & ea debito modo ad finem assequendum movere debet. 4. Porro animæ imperium in corpus ejusque actiones tam vitales quam animales probant *animi pathemata*, ubi non solum pulsus cordis, sed & motus tonicus partium cum secretionibus & excretionibus notabiliter immutantur. v. g. in *terrore* repentino eodem momento, quo hic nascitur sequitur pulsus frequens & in debilioribus subjectis parvus & debilis, imò interdum prorsus evanescit: tonus partium remittit, partes tremunt, & interdum vel convulsiones, vel, præsertim in delicatioribus, animi deliquia sequuntur: in partibus exterioribus color & calor perit, ac vasa detumescunt: animus ipse propter instantem vel veram vel apparentem tantum noxam dubius & consilii inops hæret: cessante autem periculo & animo vires recipiente pulsus iterum

æqua,

æqualis & fortior redditur, vasa denuò sanguine replentur, tremor partium cessat, ac color cum calore redit. E contra in ira omnia ferè contrario modo se habent, pulsus cordis fit magnus & frequens, sanguis motu rapido per arterias ad partes fertur, arteriæ inflantur, partes intumescunt, calor & color partium augetur, vires totius corporis augentur, oculi fulgent, secretiones celerius procedunt, undè in quibusdam bilis magna copia infunditur in intestina & in quibusdam vomitum in aliis diarrhœam, in aliis periculosos morbos excitat, in quibusdam spuma ante os apparet, ut alia taceam. Imo in omnibus affectibus certa faciei mutatio observatur, ita ut sapius ex solo faciei aspectu de hujus vel illius affectus præsentia judicium ferre queamus. Quæ omnia cum, teste quotidiana experientia, revera ita se habeant, quis adeo vel sanæ mentis esset, ut animæ imperium in corpus negare auderet? 5. Animæ potentiam in corpus probat *nausea imaginaria*, & *vomitus*, quando quis vel aspectu quodam ferculo ingrato vel audito saltem ejus nomine nausea maxima & vomitu corripitur: quænam quæso hic loci sunt effluvia, quæ adeò validè ventriculum irritare & stimulare possunt, ut indè vomitus sequatur? Spiritus sane, ab effluviis aut à sono verborum moti, ad cerebrum recurrentes & in primo sensorio ingratam ideam formantes, ac postmodum ad Ventriculum motu undulatorio tendentes & vi quasi explosiva irritationem in Ventriculi fibris excitantes,



res, parum hic lucis affundunt. Tandem etiam  
6. animæ imperium in corpus probat *convenien-  
tia actionum moralium & vitalium*: uti enim  
actiones morales, ita & vitales in hominibus  
comparatæ sunt, v g uti cholericis in omnibus  
actionibus sunt admodum præcipites, & facile  
mediocritatis limites excedunt, ita etiam actio-  
nes eorundem vitales fortiores sunt & ad exces-  
sum tam in statu secundum, quam præter natu-  
ram inclinant. Quibus 7. *nævi materni*, animæ  
potentiam in corpus quam maximè probantes  
addi possunt. Navorum istorum causa ut pluri-  
mum est fortior quidam animi affectus, fortissi-  
mum sc. desiderium aut terror gravissimus subi-  
taneus, profundam, ut ita loquar, in matris ani-  
mam ideam imprimens; quæ idea dum foetus a-  
nimæ à matre comunicatur, anima foetus in for-  
mando corpore occupata per errorem, illud  
ipsam quod matri oblatum fuit, eodem in loco,  
quum forte manibus mater attigit, efformat. Si  
E anima matris in animam foetus & hæc in pro-  
porium corpusculum tantam habet potentiam, ut  
etiam res, ad structuram corporis non pertinen-  
tes, momento citius in corpore formare possit,  
cur animæ imposterum nulla in corpus potestas  
concedi, & cur actiones non amplius dirigere  
debet? Reliqua quæ ad confirmandum animæ  
imperium adhuc adduci possent, silentio præter-  
eo, quoniam allata argumenta ad hypothesis  
confirmationem sufficientia esse certò persuasus  
sum.

§. 10. Hæc verum corporis motorem con-  
 cernebant, videamus & perlustremus jam re-  
 liqua idola & phantasmata, quæ hætenus ani-  
 mæ imperium dubium reddere voluerunt. Ac-  
 cedant E. primo omnium *spirituum cohortes*: &  
 cum *naturalis* atque *genitalis* jam mundo vale-  
 dixerint, *vitalis* verò in agone jaceat, videamus  
 quænam necessitas urgens hodiernum *spiritum*  
*animalem*, quem adeò anxie & prolixè adhuc  
 defendunt, postulet. Qui ex Recentiorum nu-  
 mero Medicorum corpus humanum ceu ma-  
 chinam hydraulico pneumaticam considerant,  
 hunc spiritum adeò necessarium credunt, ut abs-  
 que ejus præsentia nulla prorsus in corpore hu-  
 mano actio fieri queat: quæsitæ verò de ejus es-  
 sentia in tot diversas abeunt sententias, ut nescias  
 cui credere debeas: pari modo se res habet, si  
 de modo influxus, de modo præparationis aliis-  
 que quæstio instituitur, ita ut inquirenti in hosce  
 spiritus facile appareat, eosdem esse rem adhuc  
 maximè incertam. Quicquid sit de essentia aliis-  
 que requisitis hujus suppositi spiritus, omnes fa-  
 teri cogentur, eum esse materialem, elaborari in  
 cerebro è sanguinis portione subtiliori, & pro-  
 pelli per nervos ad partes: cum verò hæc  
 omnia passivum quid, quod necessario aliud  
 agens præsupponit, denotent, meritò quæritur,  
 quodnam illud sit principium activum, quod  
 spirituum elaborationi & distributioni ad partes  
 præsit; sed hic iterum diversas audire licet sen-  
 tentias, alii enim materiam ætheream, globulo-  
 sam

sam (quæ tamen neque ratione neque sensibus  
 probari potest) maximè mobilem, allegant, alii  
 pulsus cordis, alii oscillationes membranarum  
 cerebri in medium producunt; quando verò  
 denuo quæritur, quodnam principium hæc  
 moveat partes, spiritus animales ceu causa mo-  
 vens allegantur, ut adeò revera quæstio redeat ad  
 idem principium & circulum formet, in quo ne-  
 que principium neque finis demonstrari potest,  
 ita ut quærens idem experiatur ac ille qui rustici  
 cujusdam junioris nomen sciscitans, responsi lo-  
 co ferebat, *er heisse wie sein Vater / & cum*  
*ulterius in patris nomen inquireret, sein Vater*  
*heisse wie er / cum verò utriusque nomen scire*  
*cuperet, ei respondebatur, es heisse einer wie*  
*der ander.* Nemo tamen credat, me hoc ipso  
 fluidum nervorum prorsus negare, inferius  
 enim, ubi de fluidi nervorum secretionem sermo  
 erit, non contemnendis argumentis, fluidum  
 nervorum dari, demonstrabo: id saltem volo,  
 spirituum horum Patronos, antequam tot lau-  
 des iisdem tribuunt spiritibus, probare debere,  
 an principii moventis sive Naturæ officio verè  
 fungi queant, & an definitio Natura ab omnibus  
 Philosophis recepta in spiritus animales quadret;  
 an scil. *sint principium motus & quietis, in quo est*  
*(motus) primo, per se, & non per accidens: sed cum*  
 nemo hætenus hocce salva veritate affirmare  
 potuerit, spirituum Patroni mihi permittent, ut  
 ad plenariam usque probationem, credam, *spiri-*  
*tus animales (si revera dantur) aut esse animæ instru-*



*mentum, aut frustra & absq̃, prægnanti causa in Medicinam esse introductos. Plura de hisce spiritibus vid. infra loc. all.*

§. II. Pergamus jam ad *Helmontii archæum fabrum* ejusque *consanguineos*, & cum hisce coincidentes *spiritus insitos, influos*, ac *Dolæi Reges* terrificis nominibus præditos. Nemo autem Medicorum puto erit, qui hæcce figmenta risu potius, quam applausu digna, & mulierculis colum tractantibus magis, quam Medicis Rationalibus convenientia, non judicet. Quid enim tot elogiis ornatus, tot fermentis instructus & custodibus armatus *Helmontii Archeus* est; certè nil nisi simplex à Veteribus supposita *anima vegetativa*, Quænam E. necessitas postulavit, hancce brutorum anima inferiorem vegetativam, tot involucris tectam, denuo in scholas introducere, eique, cum anima rationalis corpori humano intime unita præsens sit, corporis imperium tradere? ego nullam video. Satis fuisset, si *Helmontius*, qui tamen artis Medicæ deliramenta aliis explicare voluit, hujusmodi proprii cerebri deliramenta in forum Medicum non introduxisset. Idem judicium esto de *Dolæi Regibus*, quid enim sub *terribilibus Hæbraico-Græcanicis* hisce nominibus latet; nil nisi simpliciter ita dicti & ficti *spiritus insiti & influi*. Si E. de omnibus hæctenus dictis Spiritibus, Archeis & Regibus æquum & verum ferendum est judicium, verissimè affirmari potest: *Omnes hosce spiritus & principia agentia in Inventorum & Patronorum cerebris & imaginatione*

*tionem aliquid quidem, in rei autem veritate nihil esse, & tandem ad pomposum & operosum nihil recidere.*

§. 12 Sed superest adhuc novissima & celeberrima Mechanicorum secta, quæ omnia phænomena in corpore humano occurrentia à solo mechanismo sive mechanica partium structura deducit: quæ quo magis hodiernum recepta est, eò majorem terrorem variis machinis incutere, & eos, qui contra eorum placita mussitare tantum audeant, deterrire potest. Ast cum in detegenda veritate omnis metus, & omnis respectus ad alia principia, etiamsi universalia & infallibilia credita, seponi debeat, mechanismi cuiuscunque Patroni mihi vitio haud vertent, si in asserta hodiernum quibuscunque Medicis & Philosophis philosophandi libertate, dubia mea contra mechanismum apertè & sincerè proponere audeo. Illud tamen ante omnia moneo, me mechanicam partium structuram earundemque ad certos, & ad totius corporis conservationem tendentes usus, destinationem, minimè negare, quod quidem ex antea præmissis satis superque patere potest, illud saltem volo, *impossibile esse corpus humanum mere mechanicè & ex necessitate mechanica moveri, nullo ad certos & ad corporis conservationem tendentes fines habito respectu.*

§. 13. Rationes autem quæ mihi persuadent corpus humanum non esse meram machinam, nec mechanismum motus principalem causam, sunt sequentes: 1. quod nulla unquam machina inventa fuerit, quæ & nutrirì & augeri

potuerit; semper enim eandem servant magnitudinem: cum è contra corpus humanum, non solum per totam vitam convenientibus alimentis nutriatur, sed ad vigesimum quartum usque annum quoad longitudinem augeatur. 2. Quod nulla machina aliam machinam per generationem producere & sic suam speciem propagare potuerit: cum tamen genus humanum & reliqua quoque viventia ger generationem propagentur & conserventur. 3. Quod in nulla machina sensus, intellectus, voluntas, appetitus, electio boni &c. unquam demonstrari potuerit, quæ tamen omnia in homine deprehenduntur. 4. Quod omnes machinæ ex necessitate mechanismi hoc & non alio modo agere cogantur, cum è contra homines agere & non agere atque ad varias actiones pro lubitu se determinare possint. 5. Quod in homine & brutis certæ, & ad conservationem corporis tendentes, Secretiones & Excretiones observentur, quibus omnes machinæ carent. 6. Quod homines & animalia post exantlatos labores quiescant in somno, & sensus atque motus voluntarii cessent, quod tamen in machinis non observatur. 7. Quod nulla machina cum intentione finem quendam assequendi agat, cum è contra in hominibus semper observetur intentio ad finem, quo potito postmodum intentio cessat. 8. Quod corpus vivum & machina sint contraria, si E. corpus humanum & brutorum sunt corpora viventia, non possunt esse machinæ. Ut alia quæ  
contra



contra mechanismum proferri possent, silentio præteream.

§. 14. Sed reperiuntur quidam ex moderatioribus mechanicis, qui quidem fatentur, absurdam esse eorum sententiam, qui corpora viventia meras machinas esse asserunt, nihilominus tamen omnes actiones per mechanismum & mechanicam partium constructionem fieri contendunt. Cum verò hoc ipso, dum per mechanismum actiones fieri concedunt, mechanismum tantum instrumentaliter se habere fateantur, necessario aliud principium movens & motus in corpore causam efficientem agnoscere coguntur. Quare quidem animam motus dirigere concedunt, sed organorum & actionum cognitionem ipsi animæ denegant. Sed cum ad hocce jam superius responsum fuerit, actum agere nolo.

§. 15. Unica adhuc superest obiectio, cuius superius mentio fieri debuisset, quam ceu fortissimam omnium quidam proferunt, ajunt scil. *si anima haberet imperium in actiones vitales, posset easdem pro lubitu alterare & ad tempus certum sufflaminare, cum verò, etiamsi quam maxime vellet, hoc tamen minime posset, satis esse clarum animam in actiones vitales nullam habere potentiam.* Hæc tamen obiectio, quamvis fortissima & satis speciosa videatur, tanti tamen momenti non est, ac quidem ejus inventores sibi persuadent. Ex superioribus enim animæ potestas in actiones vitales in animi pathematibus satis patere potest:

ridiculum autem satis est, quando petunt, ut anima actiones vitales ad tempus supprimat, hoc enim item est ac interitum corporis petere: cum enim 1. à pulsu & respiratione, à secretionibus & excretionibus ceu actionibus vitalibus vita unicè dependeat, & hisce cessantibus pereat: animæ verò 2. maximè intersit, ut corpus per hasce continuo durantes actiones in integritate conservetur, quo ei ceu instrumentum ad operationes in hoc mundo peragendas diu inservire possit, absurdum esset, si anima hasce adeo necessarias actiones ad tempus suppressere vellet.

§. 16. Cum E. ex hætenus dictis, omnia in medium à variis Authoribus prolata activa principia merè passivè se habere, & absque ulla prægnanti causa agendi vim ipsis adscriptam esse, satis apparere existimem: absque omni absurditate, animæ soli omnem agendi in corpus potestatem concedi posse & debere, firmissime persuasus sum; ut nimirum ea corpore juxta leges mechanicas constructo ceu instrumento aut organo ad fines assequendos necessario utatur: qua ratione autem id fiat, quibus instrumentis utatur, & quinam inde effectus sequantur, sequentibus capitibus, quantum quidem possibile, declarare & explicare studebo.

## CAPUT IV.

De

## Motu Humorū.

§. I.

**V**isa hætenus causa efficiente motuum Principali, videndum jam est, quibus instrumentis fini assequendo necessariis Natura utatur. Generale animæ instrumentum est *Motus Humorū universalis* per totum corpus & singulas ejus partes, qui alias usitato nomine *Circulatio sanguinis* aut *Motus sanguinis progressivus*, ad distinctionem *intestini* vocatur.

§. 2. Cujus usus cum maximus sit, necessitas quoque, ut ordine tractetur, postulat: quare 1. Generalem ejus Historiam præmittemus. 2. Agemus de Materia humorum. 3. Trademus causas motus humorum instrumentales ac tandem 4. effectus hujus motus subjungemus.

## MEMBRUM I.

De

*Generali Historia Circulationis  
Humorū.*

§. I.

**M**otus hic humorum, uti dictum est, communiter Circularis audit, non quod exactè



Circulum mathematicum describat, sed quod sanguis è corde per arterias ad partes propulsus ad idem principium redeat & circulum physicum constituat. Veteribus motus hicce incognitus erat, undè etiam ob hancce ignorantiam in multis hallucinati sunt, & variorum phænomenorum causas & cum aliis connexionem tradere non potuerunt.

§. 2. Credebant autem *Veteres sanguinem*, quem duplicem, *Vitalem & Nutritium* supposebant, in vasis tantum stagnare, & præter fluiditatem prorsus nullo progressivo motu gaudere. Sanguinem Vitalem in arteriis contineri asseriebant, & quo ejus fluiditas conservaretur & eò facilius ad partes necessitate urgente ab anima propelli posset, Spiritus vitales, in corde generatos & sanguini vitali innatantes, in scenam producebant, ut scilicet anima horum ope ad assequendos fines uteretur. Cum verò cernerent & experientia deprehenderent, sanguinem sensim sensimque fatiscere & consumi, & sic continua restitutione opus habere; statuebant venas, præsentem materiæ nutritiæ defectu sugere & attrahere chylum sive succum nutritium; quo verò & sanguinis venosi vitalitas conservaretur, spiritus vitales per anastomases arteriarum & venarum in venas infundi credebant.

§. 3. Hæc per multa secula Veterum erat sententia quam pro aris & focis defendebant, adeò ut, cum circulatio sanguinis detegeretur, quidam lacrymas profunderent, turpe existimantes,

nantes, novo hocce, uti putabant, Recentiorum commento, Veterum per multa secula stabilitam opinionem destruere; alii contra omnes demonstrationes, à *Bartholino* aliisque ad confirmandum Circulum variis scriptis propositas, vires obturantes, Veterum sententiam ad mortem usque defendebant, & sic cum Veteribus errare, quam cum Recentioribus apertam hancce veritatem agnoscere malebant.

§. 4. Primus qui admirandum huncce humorum motum detexit, est *Guilielmus Harveus*, natione Anglicus, id quod factum est Anno 1628. non desunt tamen, qui *Paulo Sarpio* sive *Servitæ* hanc inventionem adscribunt: imò alii ulterius progrediuntur & *Cesalpino*, *Nemesio* & ipsi *Hippocrati* sanguinis circulum notum fuisse affirmant. Sed quicquid sit de hisce, qui per nebulam tantum viderunt huncce circulum, prima tamen laus & honor debetur Harveo, quia hicce prius cum publici juris fecit, & experimentis confirmavit. Occasionem autem ipsi dedere *Vena-um Valvulæ* ab *Aqua pendente* Patavii ipsi monstratæ: eum enim hæ omnes cor versus spectent, & sanguini à partibus fluenti cursum, reditum autem ad partes minimè concedant; eæ verò quæ in arteriis propè cor reperiuntur exitum sanguinis è corde concedant, reditum verò ad cor prohibeant, dubitare de motu sanguinis juxta mentem Veterum cepit, & institutis multis experimentis tandemprehendit, sanguinem à

cordis ventriculis continuo propelli per arterias per venas verò ad cor redire.

§. 5. Detecto itaque hoc motu & per valvulas probato, alia adhuc experimenta addituere, inter quæ primas ferè tenet *ligaturâ* vasorum: quando enim arteria ligatur, cor versus intumescit, ejus verò portio partes respiciens detumescit: contrario autem modo se res habet in venis, hisce enim ligatis, exterior ejus pars partibus rediens intumescit, quæ verò ejusdem portio cor respicit, flaccida redditur, manifeste hinc indicio sanguinem à corde per arterias ad partes ferri, ab iisdem verò per venas ad cor redire. Quibus addi possunt observationes *Leuwenhockii Arcan. Nat. Detect, Epist. 65. 66. 67. & 68.* qui oculis, microscopio armatis, in *gyrinis*, sive ranis mox ex ovo exclusis, & etiam in paulo adultioribus, ut & in piscibus, sanguinis progressum è corde in arterias & ex his transitum in venas arteriis adhærentes, reditumque per venas ad cor observavit. Quibus tandem accedit, quod ipsa sana ratio, hujusmodi motum humorum progressivum revera dari, suadeat, cum enim in singulis diastolis portio sanguinis in Ventriculos illabatur & in systolis iterum expellatur, necessario sanguis arteriosus, dum alius à tergo sequens priorem premit, continuante contractione cordis semper ulterius propelli debet: qui verò in venis continetur, cum semper portio cordi proxima in Ventriculos illabatur, cordi propius accedere & sic etiam motum progressivum



sivum à partibus versus cor exercere cogitur.

## MEMBRUM II.

De

*Materia Humorum.*

## §. I.

Quamvis materia quæ circulatione per totum corpus circumagitur, videatur liquor admodum homogeneus, ex *tribus* tamen constat *partibus principalibus*, Sanguine scil. strictè sic dicto, *Lympha nutritia* & *sero excrementitio*.

§. 2. *Sanguis* strictè sic dictus alias etiam grumus appellatur & portio rubicunda, respectu feri aquosi vel flavescentis. Hanc rubicundam partem multi ex fibris constare sibi persuadent, ideò quod agitatione sanguinis calidi fibræ oriantur & bacillo adhæreant: & quod sanguis aquæ infusus calidæ instar lanæ carptæ appareat. Sed fibræ hæc nil nisi gelatinosa sanguinis portio sunt, & sanguini revera non insunt: si enim tales in sanguine supponendæ essent, sanguis subtilissima vasorum capillarium ostiola minimè penetrare posset, & necessariò continuæ horum vasorum obstructions sequi deberent. Veritati autem magis convenit observatio *Leuwenhockii*, asserentis, grumum sanguinis nil nisi globulos esse *lymphæ* innatantes, horumque alios esse diaphanos, alios vero magis opacos: id quod sequenti modo demonstravit: inclusit nimirum

rum sanguinem recentem tubo vitreo admodum pellucido, in quo hermeticè sigillato ope microscopii observavit, minutissimos globulos liquori diaphano innatantes. Ab hisce globulis & lumine in iisdem varie reflexo quidam rubedinem sanguinis deducunt, quam chymici sulphuri adscribunt. Sunt autem hi globuli sine dubio portio sanguinis maximè pinguis & oleosa serosis admixta: si enim quodcunque oleum liquori aquoso admiscetur, post fortiorem agitationem innumeri minutissimi globuli aquæ innatantes observantur, post aliqualem verò quietem iterum coeunt globuli oleosi, ac aquam relinquunt: pari modo se res habere videtur in corpore humano, ubi particule oleosæ, per continuam cordis conquassationem & aeris appulsum in respiratione, & continuam per partes porosas & viscera transpressionem cum aquosis sive serosis miscentur, & globulos tales constituunt: quamprimum verò ista agitatio cessat, globuli oleosi relicta aquosa parte coeunt, & grumum formant.

§. 3. Altera sanguinis essentialis pars est *Lympha nutritia*, maximam partem ex particulis gelatinosis constans, quibus tamen aliæ ad constitutionem & nutritionem partium maximè necessariæ admixtæ sunt particule, *aquosæ* scil. plus vel minus *pingues*, ut & aliæ quæ ad terrestritatem magis vel minus pronæ sunt. Cum enim hæc essentialis sanguinis pars ad nutritionem corporis potissimum destinata sit, necessario quo-

quoque convenientes & ad nutritionem singulorum partium aptas particulas continere debet; quædam enim plus pinguedinis, aliæ plus aquæ, aliæ verò maiorem terræ portionem postulant, uti ex superioribus satis superque constat.

§. 4. Tertia sanguinis pars *Serum* est, quod ex partibus merè inutilibus constat, & hinc merito *excrementitium* in Medicorum scholis vocatur. Undè etiam cum quibusdam Physiologis, duas tantum sanguinis partes, serum scil. & grumum admittentibus, hæc inutilis sanguinis portio cum lymphâ nutritia non est confundenda: uti enim hæc ex partibus laudabilibus gelatinosis constat: ita illud partium, maxime *aquosarum, halitusosarum, ad fermentescentiam pronarum, bilinarum & biliosarum* colluvies est, quæ, nisi promptè per commoda secretoria è corpore secernantur & excernantur, magnarum turbarum in œconomia animali causa esse possunt.

§. 5. Diversæ hæc sanguinis partes partim chylo, partim verò à continuo humorum motu originem trahunt. Laudabiles quidem & nutritiæ, chylo potissimum suum ortum debent, undè etiam chylus, priusquam Massæ sanguineæ affunditur, lymphæ à partibus inferioribus refluæ admiscetur, quæ etiam in ductum thoracicum & venam subclaviam non exigua quantitate effunditur, & postea cum sanguine tam diu per totum corpus ejusque poros movetur, donec partim in globulos, partim in subtilem gelatinos-



tinofam lympham mutetur. Cum verò 1. colalimentorum assumptorum & viscerum in diversis temperamentis diversam constitutionem chylus non parum differat, & sic interdum plus pinguedinis, interdum plus terræ, interdum verò plus aquæ, quam ad corporis conservationem requiritur, Massæ sanguineæ admisceatur, & per convenientia colatoria secerni nequeat, superfluum illud postmodum facile à statu integritatis degenerat, & in serum excrementitium mutatur. Cui 2. accedit, quod ob continuum, tam progressivum, quam intestinum humorum motum, partes ipsæ laudabiles ita atterantur & subtiles reddantur, ut tandem prorsus fatiscant, & ad conservationem corporis inutiles evadant: unde non potest non quotidie in corpore humano etiam si sano, colluvies humorum excrementitiorum generari: quæ tamen, cum facile corpori damnum inferre queat, per varia secretoria uti inferius audiemus, continuo secernitur, atque excernitur.

§. 6. Massa hæcce diversorum humorum etsi continuo per vasa moveatur, horum tamen respectu diversa est: Sanguis enim latè sumtus, in arteriis, respectu coloris, magis floridus est, cum è contra is qui per venas ad cor revehitur, obscurioris sit coloris. Cujus quidem rei nulla alia est causa, quam quod arterioso sanguini plus lymphæ & serî admixtum sit: cum vero lymphæ in vasa lymphatica incedat, & denuo ad cor vehatur, serum verò in variis colatoriis

toriis secernatur & in varias cavitates effundatur, sanguis venosus, partibus hisce fluidioribus privatus, & respectivè minus fluxilis, non potest non obscuriorem acquirere colorem.

§. 7. Quo in loco aut in quo viscere hæc humorum massa elaboretur, diu disputatum fuit. Veteres quidem unanimi ore in hepate chylum in sanguinem mutari asserebant: postquam verò vasa lactea detecta fuerint cum circulatione sanguinis, cordi sanguificationis munus mandatum fuit: sed nec hæc sententia diu stetit, dum multi de veritate ejus dubitare ceperunt, ideò quod, sanguinem liquorem heterogeneum, in diversis visceribus depurandum & ad fluxilitatis debitz gradum evehendum esse considerarent: quare non soli cordi, sed omnibus aliis partibus & visceribus, quæ quocunque modo ad sanguinis elaborationem & depurationem concurrunt, vim sanguificandi adscripserunt: cui sententiæ & ego subscribo, nam licet cor ad motum sanguinis progressivum & ad mixtionem intimiorem plus ferè quam alia viscera conferat, alia tamen, quæ partim ad fluxilitatem & calorem sanguinis conferunt, uti sunt imprimis pulmones; partim verò heterogenea è Massa sanguinea removeant, uti viscera secretoria, non sunt excludenda. Hæc tamen viscera omnia non nisi instrumenta sive organa sunt, quibus anima ceu causa efficiens sanguificationis principalis utitur.

§. 8. Quoad mixtionem sanguinis adhuc notandum est, quod sanguis plus oleagineæ substantiæ contineat, quam omnes reliquæ partes, excepta sola pinguedine; cujus quidem rei duplex probabilis allegari potest causa 1. ut respectu partis copiosæ oleaginosæ ad concipiendum calorem in corpore vivente humano admodum necessarium sanguis magis aptus reddatur. 2. Undum sanguis hicce calidus ad partes fertur, opere caloris partes in tenacitate sua conserventur, & à nimia humiditate, partes ultra modum emolliente, liberentur. vid. *Stahlii Theor. Med. Part. I. p. 44.*

### MEMBRUM III.

De

### *Causis Motus Humorum instrumentalibus.*

#### §. 1.

Quamvis, uti modo monitum fuit, in sanguine ne multum materiæ oleaginosæ sive sulphureæ latitet, nihilominus tamen sanguis, teste experientia, corruptionem faciliè subit: quare quamdiu in corpore continetur, continuo moveri debet, ut fluxilitas ejus conservetur, & partes heterogeneæ ad fermentationem putredinosam pronæ removeantur.

§. 2. Ad motum hunc præstandum Natura variis utitur instrumentis & quidem 1. Motu Cordis. 2. Motu Tonico & voluntario ad

3. Rec



3. Respiratione: de quibus singulis distinctis Articulis agemus.

ARTICULUS I  
De  
*Motu Cordis*  
*sive*  
*Pulsu.*

§. 1.

**M**otum cordis præcipuam motus sanguinis progressivi esse causam, omnes Physiologi uno ore confitentur; efficit autem hunc motum potissimum *Pulsu* sive constrictione aut *Systole* cordis: *diastole* enim magis est remissio istius motus, & cor eo tempore, dum sanguis ex istius auriculis in Ventriculos cum impetu impellitur, passive se habet.

§. 2. Quanta hujus pulsus sit efficacia, ipsa sana ratio dictitat: si enim consideramus structuram arteriarum, ex majoribus in minores & minutissimos ramos abeuntium, ut & musculos atque substantiam aliarum partium, per quarum minutissimos poros sanguis, liquor admodum crassus, continuo trajici debet, maximam cordis in pellendo sanguine esse vim, concedere cogimur. Audiamus de hac re *Baglivum Oper. p. 410. ex Borello. Duæ ait sunt resistentiæ, quas superare debet cor. Prima, ut arteriæ repleantur san-*  
*guine*

guine usq<sup>3</sup> ad turgentiam, quæ non est minor ponderis librarum 18000. Secunda, ut ab arteriis exeat idem sanguis à corde propulsus, quæ secunda vis esse debet ingens, nam superandæ sunt infinitæ resistentiæ musculorum, vasorum, glandularum & partium omnium per quas trajicitur sanguis, & superandæ profecto vi solæ & impulsu fibrarum emboli cordis. At si una solum in pulsatione teste cit. Borello cor superat tam vastam resistentiam majorem librarum 135000. cum in una hora millies & amplius cor pulset, ergo in una hora potentia cordis superat resistentiam 135000000. & spatio unius solius diei superat resistentiam majorem librarum 3140000000. Tota autem vis motiva cordis conjici & explorari potest ex comparatione cum potentia musculorum masticationi inservientium, eodem teste loc cit. Admirabilis profecto est tam ingens vis emboli cordis ac ferme incredibilis, nisi adesset energia percussiois, quæ natura sua superare potest quamcunq<sup>3</sup> finitam resistentiam quiescentem. Si E. tanta cordis est efficacia, quod tamen merè instrumentali-ter se habet, quanta erit energia principii commoventis sive animæ? Spiritus sanè animales, quos vulgo ceu causam admirandi hujus motus allegant, impares sunt huic oneri ferendo

3. Similis etiam motus *constrictorius* & *dilatatorius* deprehenditur in auriculis cordis, qui tamen cum pulsu cordis non coincidit, dum enim cor constringitur & sanguis expellitur, auriculæ dilatantur & sanguinem à venis recipiunt; quem, dum constringuntur, in cor dilatatum infundunt, ex quo deindè per arterias in universum corpus distribuitur.

S. 4.

CAPUT IV. MEMBR. III. ART. I. 99

§. 4. *Via per quas sanguis ad partes propellitur & ad cor revehitur sunt arteriæ & venæ. Ubi tamen notanda venit controversia illa, an arteriæ ad pulsum aliquid conferant, an verò merò passivè se habeant?* Qui prius affirmant, dicunt, arterias ideò instructas esse variis membranis & imprimis tertia fibrosa, ut ejus ope sanguinis motus promoveatur: sed falluntur, pulsus enim arteriarum est nil nisi dilatatio arteriæ, quæ constrictionem cordis sequitur, adeò ut arteriæ hoc passu passivè tantum se habeant; manifestè hoc videmus in læsione & plenaria dissectione arteriarum, ubi sub quovis pulsu sanguis magno cum impetu profilit, quod tamen arteriæ dilatationi minimè adscribi potest: activè tamen se habent arteriæ in diastole cordis, quando ope membranæ fibrosæ denuò constringuntur, & sic etiam hoc modo aliquid ad pulsum, qui systole & diastole, juxta communem sententiam, absolvitur, aliquid conferre dici possunt. Revera autem sanguinis motui ad partes hac ipsa constrictione inserviunt arteriæ, cum enim ob valvulas semilunares ad cor redire nequeat, necessario in systole arteriarum aliquo modo ulterius propelli debet sanguis.

§. 5. Hoc loco adhuc alia se offert controversia, *an scil. sanguis immediate ex arteriis in venas transeat, an verò in ipsam partium porositatem infundatur & postea à venis recipiatur?* Prius non pauci affirmant, & suam sententiam variis argumentis probare nituntur, quæ videri possunt

G 2 apud



apud *Bergerum Physiol. pag. 91. & seq.* alii tamen hæc vasorum anastomoses prorsus negant, & argumentis non contemnendis contrarium probant, inter quos præcipuus ferè est *Bohnius Circ. Anatom. Physiol. p. 107. & seq.* ita ut difficile sit, cum utraque pars ad experimenta provocet, certam quandam sententiam eligere. Probabilius tamen mihi videtur sanguinem in ipsam partium substantiam infundi, sic enim longè facilius partium poros ingredi, & nutritionem perficere potest: nec ideo ulla sanguinis stasis metuenda est, quia non motum tonicum omnes partes sufficienter extensæ sunt, ita ut sanguis per harum poros non in substantiam tantum partium penetrare, sed etiam quod superfluum in vasa lymphatica & venas ingredi queat. Si verò quis anastomoses tales præfractè asserere cupit, cum eorum contentione ferram non recipiabo, sufficit mihi, quod utroque modo, dum sanguis per angustissimos poros aut vias transprimitur, partes optimè divellantur & fluxilitas sanguinis conservetur.

§. 6. Sanguis ad partes propulsus, per venas redit ad Cor, Quamvis autem in hisce sensibilis motor, uti est cor, deficiat, variæ tamen sunt causæ, quæ motum huncce promovent, & quidem 1. motus sanguinis arteriosi, qui semper à tergo premit venosum, ob motum cordis fortiolem. 2. Concurrit motus venarum, & imprimis tunicæ fibrosæ, quæ sanguinem è ramis minoribus ad majores facile propellit. 3. Coa-

gunt

gunt etiam aliquo modo valvulæ venarum sanguinis reditum ad cor promoventes. Inprimis vero 4. motus partium tonicus, constrictorius, qui sanguinem per venas refluendum ad cor quam maxime promovet, de quo motu sequenti Articulo sermo erit.

## ARTICULUS II.

De

*Motu partium tonico & voluntario.*

## §. I.

**M**Otum tonicum in partibus solidis mollibus dari, varii Authores qui de Tono partium locuti sunt, concesserunt, quid verò præcise sit, & quosnam effectus in corpore edat, hætenus ferè à nemine, nisi à Celeberrimo Dn. D. *Stahlio* explicatum fuit, quare hancce materiam paulo prolixius enucleare animus est.

§. 2. Est autem motus tonicus, nil nisi certa atque debita partium extensio, qua mediantè pori partium, ita tensi servantur, ut humores in debita quantitate per easdem moveri queant, & vel nimius humorum affluxus impediatur, vel pro circumstantiarum ratione major copia ad partem admittatur: undè hic motus tonicus non semper unus idemque est, sed modo intenditur, modò magis remissus est, & sic ferè cum *stricto* & *laxo* Methodicorum Veterum convenit.

§. 3. Si verò quis de partium & imprimissimum musculorum tensione dubitare voluerit, eum Praxis Chirurgica facillimè convincere poterit, quâ constat 1. lasso per transversum musculo, labia ita à se invicem diduci, ut imperiti aliquid inde excisum esse credant. 2. In luxatione membrum vi musculorum adeò retrahitur, ut altero non luxato membro brevius evadat. 3. si in parte quadam musculus paralyti afficitur, ejus antagonista, cessante alterius tractione, partem versus se trahit, undè maxima postmodum deformitas sequitur.

§. 4. Manifeste autem hujusmodi motum tonicum strictorium & relaxatorium probant varia phænomena tam à statu s. n. quam à morbo desumpta. In statu quidem sano manifestum motus tonici relaxationem habemus in somno, ubi totum corpus aliquomodo tumidum redditur, & cum ob hanc relaxationem major etiam ad partes exteriores sanguinis copia ferri possit, non color tantum faciei floridior evadit, sed & calor totius ita augetur, ut in aliis mador, in aliis verò largissimus sudor sequatur: imò si ligaturæ caligarum sub somno relinquuntur, utrinque circa ligaturam partes molles intumescunt, manifesto relaxationis toni iudicio. Intensionem verò motus tonici sive stricturam manifeste videmus in terrore, ubi color & calor partium externarum perit, vasa detumescunt, cutis contrahitur &c. Videmus id quoque tempore hyberno, ubi cutis maximè constringitur,  
ita



ita ut etiam pori emineant, & cutis cuti anseris deplumati similis evadat. Imò quæ in dormientibus observatur motus tonici relaxatio, in vigilantibus mox cessat, cum leni cutis madore.

§. 5. In statu morbofo adhuc clariora motus hujus tonici deprehenduntur exempla. Manifestissimum relaxationis exemplum habemus in paralyfi vera, ubi ob tonum nimis relaxatum humores magna copia irruunt, & membrum tumidum reddunt. Intensionem vero motus tonici probant spasmi. Intensionis verò & remissionis exemplar convulsiones & febres exhibent: in illis quidem ferè singulis momentis intenditur ac denuò remittit, in febribus autem præsertim intermittentibus & constrictio & relaxatio diutius durat. Ab initio quidem paroxyfmi torpor quidam membrorum cum pandiculationibus & oscitationibus observatur, quas pallor faciei, detumescencia vasorum ac horror sequuntur, quem dum ad finem inclinatur, nausea sæpius & vomitus excipiunt. Cessantibus hisce facies & superficies corporis ante constricta sensim intumescit, calor redit cum colore; quibus autem hoc sub æstu non contingit, anguntur & arctantur admodum circa præcordia dolent longè intensius capite &c. Æstu ad declinationem vergente & tono magis magisque relaxato tandem sequitur sudor, primis quidem paroxyfmiis lenis, sequentibus verò largior cum notabili euphoria.

§. 6. Usus hujus tonici motus sumus est : ad motum enim sanguinis progressivi per venas ad cor quam maxime concurrat; dum enim venas non solum proprias, sed & alias partes membranosas & carnosas ambiunt, hæ venas undique premendo, sanguinis fluxum è vasis minoribus in majora promovent, undè pro diversitate harum partium ambientium motu tonico diversus quoque est motus tonicus, & sanguinis motus progressivus. Non autem in hoc tantum hujus toni usus consistit, sed ejus ope quoque humores modo majori modo minori copia ad partes admittuntur, & secretiones quoque atque excretiones ideò vel citius vel tardius procedunt: ita tempore æstivo, ubi tonus partium exteriorum laxior est, sanguis majori copia exteriora versus fertur & uberius sequitur sudor; è contra hyberno tempore, ubi tonus est strictior, largior urinæ fit secretio, ideo quod partes exteriores strictiores magnam sanguinis copiam non admittant, undè necessario in partibus interioribus major sanguinis copia colligi & secretiones celerius succedere debent. Hisce accedit, quod, dum sanguis ita per partes porosas & interstitia fibrarum tenfarum magno cum impetu trajicitur, particule sanguinis ad spissitudinem admodum pronæ, in minores moleculas dirimantur, & ad transitum per subtilissimos tubulos habiles reddantur: & cum hoc ipso continuo ad partium fibras allidant, calor excitatur; ut adeo per hunc ipsum motum & calor & fluxilitas sanguinis :

guinis conservetur ac motus simul progressivus optimè promoveatur. Præterea etiam motus hic ad vigorem corporis facit: undè statim post somnum corpus admodum torpidum est: quando vero pristinus tonus redit, pristinus quoque vigor præsens est. Deprehendimus quoque hunc vigorem vel majorem vel minorem in diversis temperamentis: phlegmatici enim quorum fibræ minus tensæ sunt, torpidi sunt, cum è contra cholericici ob majorem tensionem longè vegetiores sint. Tandem etiam ad exquisitiorem sensationem confert motus tonicus, quo magis enim tensæ sunt fibræ eò major adest sensibilitas; undè hujus respectu Cholericus Phlegmaticum in sensibilitate longè superat. Imo hæc ipsa sensibilitas in multis subjectis in causa est, cur tam facilè & tam graviter morbis corripiantur, quod vulgo falso debilitati corporis adscribitur, videmus enim sæpius homines & maximè sanos & robustos, qui nihilominus, ob solam tantum sensibilitatem nimiam, à morbis quibusvis gravissimè statim afficiuntur: quoniam motus hujusmodi tonici alterationes statim magni etiam sanguinis motus sequuntur, id quod quotidiana exempla Practica probant, præsertim iis in morbis, ubi Natura excretionem sanguinis molitur. Ut tota res eo clarior evadat, observationes quasdam subjiciam: *Filia 13. ann. & aliquot mensium temperamenti cholericico melancholico, & ad iram maximè prona, die 19. Martii circa vespeream subito corripiebatur convulsionibus epilepticis: se-*  

G 5

*cabatur*



cebatur statim vena, aliâq; convenientia remedia præscribebantur, quibus usurpatis tandem convulsiones cessabant, sed elapsis aliquot diebus recrudescebant, & fere singulis diebus aliquoties affligebant, tandem cessabant per aliquot dies & denuo redibant. Præcedebat autem hæc convulsiones semper lenis quidâ spasmus, uti aegrotæ aiebat, sensim sensimq; ab imis pedibus per suras & femora superiora versus tendens, quando ad Ventrículum usq; perveniebat, ructus & singultus sequebantur: cum vero altius ascenderet ad pectus, respiratio admodum reddebatur laboriosa, ita ut suffocatio imminere videretur. Succedebat postmodum inflatio & pulsatio vasorum colli, tumor & rubor faciei, ac tandem convulsiones pressopede sequebantur: illud autem probè notandum, quod incipiente spasmo partes inferiores statim frigere inceperint. Durabant hæc omnia usque ad medium Aprilis, irritis omnibus adhibitis remediis, V. Sectione in pede, pediluvio aliisque; tandem febris tertiana superveniens convulsiones post duos paroxysmos solvebat, ac ægra, cum antea ne pedibus quidem insistere valeret, pristinam valetudinem cito recuperabat. Hoc in casu puto satis clarè observari posse motum tonicum, sanguinem superiora versus prementem; spasmus enim hic nil nisi motus constrictorius tonicus erat, cujus ope vasa constringebantur & fluxus sanguinis uberior ad partes inferiores non solum impediabatur, sed etiam venosus sanguis citius superiora versus urgebatur, & hinc non solum ob defectum sanguinis frigus pedum, sed & congestio sanguinis circa præcordia, ac inde singultus cum summa respi-

expirationis difficultate sequebantur. Cum au-  
 tem hoc modo sanguinis maxima congestio in  
 capite contingebat, necessario quoq; vasa inflari,  
 pulsus augeri, ac facies tumida & magis colorata,  
 reddi debebat. Ipsæ convulsiones quæ postmo-  
 dum superveniebant, novum specimen motus  
 tonici nimium aucti præbebant, & nimix con-  
 gestioni & inde imminentibus damnis resiste-  
 ant. Jam si quis horum phænomenorum ætio-  
 logiam à me peteret, hæc esse posset: Femina à  
 Deo condita eum in finem est, ut foetum in utero  
 concipiat, nutriat atque gerat, quem in finem ne-  
 cessario largior sanguinis copia ipsis conceden-  
 da est: cum verò non omni tempore foetum in  
 utero gerat, sanguis singulis mensibus, pro re-  
 spectu temperamentorum modò largius, modò  
 minus profluit. Incipit autem hic fluxus ple-  
 nique sub finem secundi aut sub initium tertii  
 septenarii: quo tempore, dum Natura fluxum  
 hunc molitur, varias tensiones in hypochond-  
 riis, abdomine & lumbis sentiunt, quæ erum-  
 pentibus mensibus cessant, ita ut subsequenti  
 tempore menses absque magna molestia fluant.  
 Quod si vero vel sanguis nimis spissus, vel vasa  
 nimis angusta fuerint, ita ut menses prorumpere  
 nequeant, multo majores molestias experiuntur  
 & multis aliis malis, congestionibus scil. san-  
 guinis ad alias partes, doloribus &c. portantur.  
 Si E. nostram jam ægotam considera-  
 vis, erat illa annorum tredecim & aliquot men-  
 ses & sic tertio septenario proxima; quapropter

pter motus hi, etsi satis extraordinarii omnes ad negotium mensium spectabant: cum verò eruptio non succederet, fiebat sanguinis congestio non solum in ramificationibus venæ portæ, sed & in ipsis pulmonibus, ita ut necessario deindè pathemata circa præcordia admodum molestæ & respirationem maximè turbantia sequi debuerint. Cum verò hoc ipso magnum vitæ periculum immineret, dum non solum actiones vitales maximè turbabantur, sed & sanguis nimia copia caput petens suppressionem actionum animalium minitaretur, Natura necessario motu fortissimo resistere & convulsionum ope sanguinem ad partes inferiores propellere coacta fuit. Cum verò remediis hisce violentis nihil efficere potuerit, tandem febrem excitavit, atque hujus ope quod superfluum erat, è corpore expulit. Quod si verò cuidam hæc ratio, quam prolixius enucleare nolo, non arridet, is particularum sacculum afferat, & ex Philosophia corpusculari, particulis figuratis ornata, meliorem tradat. Alterum exemplum hoc est: *Vir mediæ ætatis temperamenti sanguineo-phlegmatici crebrioribus sudoribus versus diluculum affligentibus obnoxius est, à quibus, si benè succedunt, nihil prorsus incommodi sentit, sed potius benè se habet: quamprimum verò ante sudorem finitum surgit, etiamsi vestibus probè munitus sit, le-nem sentit horrorem cum partium externarum constrictione, quam prima respiratio laboriosa, hanc verò deindè inflatio abdominis cum ructibus copiosis excipit; coniunguntur simul tensiones molestæ & dolorificæ ab-*  
*dominis,*



lominis, quæ non cessant, nisi denique superveniat largus sudor post motum fortio-rem, quamvis nihilominus post huncce sudorem notabilis adhuc tensio remaneat; prom-  
tius autem hæc tensio, quæ semper ad os sacrum & anum tendit, cessat, si aliquot excretiones seri spume-  
ntis per alvum, in parva tamen quantitate sequun-  
tur, aut si urina copiosius excernitur; quod si verò  
nullum horum contingat, sternutationes crebriores tan-  
tem tensionem & alia pathemata solvunt. Ex qua  
observatione itidem satis patere posse existimo,  
quam variis modis natura motum tonicum alte-  
ret, donec propositum finem, excretionem  
tempè seri superflui, assequatur. Plura exem-  
pla, quoniam ad Pathologiam spectant, silentio  
prætereo: hæc duo enim ad motus tonici proba-  
tionem sufficere possunt.

§. 7. Quamvis autem Pulsus cordis atque  
motus partium mollium tonicus ad motum san-  
guinis progressivum sufficere posse videantur,  
nihilominus tamen motus corporis voluntarius  
ad sanguinem promovendum admodum ne-  
cessarius est, imprimis iis, qui appetitui indul-  
gent, & laboribus corpus non exercent: cum  
nim hoc modo major humorum copia in cor-  
pore colligatur & motuum, (inter quos tamen  
& humores perpetua debet esse proportio) vim  
superet, necessario motus corporis accedere de-  
bet, quo hoc modo plethora, & ab ea pendentia  
mala præcaveantur.

§. 8. Commoda autem quæ à motu vo-  
luntario in corpus redundant, varia sunt: & qui-  
dem

dem 1. fibræ partium mollium, tonico motui inservientium, dum membra modo firmiter extenduntur modo validè retrahuntur, admodum flexiles & ad motum aptiores redduntur: imò hoc ipso motu maximam acquirunt firmitatem atque robur: id quod manifestè cernere licet in hominibus durioribus laboribus assuetis, quorum fibræ admodum sunt firmæ & robustæ; cum è contra delicatorum, corpus neque labores neque alio motu exercentium fibræ sint admodum molles & teneræ. 2. Dum autem h. m. fibræ modo stringuntur, modo autem relaxantur, pori quoque partium modo angustiores, modo laxiores redduntur, ac humores per eos transeuntes conquassantur, fluxiliores fiunt, & calor debitus non tantum conservatur, sed etiam augetur. 3. Quo ipso omnia heterogenea in partibus solidis hærentia, non solum absterguntur, sed & alia ejusdem indolis in humoribus contenta, (dum debita fluxilitas semper conservatur, ac partes humorum à se invicem separatæ sunt,) per commoda secretoria secernuntur atque excernuntur. Sed cum de Motu Voluntario interius adhuc agere consultum duxerim, reliqua quæ h. l. proferri possent, proprio loco reservo. Qui verò de *Motu Tonico* plura legere cupit evolvet Dn D. Stahlii *Dissert. de Motu Tonico Vitali, de Mechanismo Motus Progressivi Sanguinis, de Æstu Maris Microcosmici, & de Motibus Humorum Spasmodicis*. De Motu verò Voluntario, *Dissert. de Motu Voluntarii Usu Medico*.

## ARTICULUS III.

De

*Respiratione.*

## §. I.

**D**uo sanguinis necessaria esse requisita *fluxilitatem & calorem* ex antea dictis jam constare potest, quare hæc per debita instrumenta semper conservari debent fit id non solum per *pulsum cordis*, motum *tonicum & voluntarium* sed etiam per *Respirationem*: quare, quomodo hæc ad motum humorum tam intestinum quam localem concurrat, paucis videbimus.

§. 2. Est autem *Respiratio* actio illa thoracis qua mediante aër alternatim in pulmones immittitur & expellitur: in qua thorax cum pulmonibus instar follis se habet, in quos dilatatos aër per asperam arteriam ceu follis siphonem intrat, uti superius jam monitum fuit. Hoc autem in actu pulmones merè passivè se habent, thoracis motum, dum scil. per *musculos intercostales externos, serratum posticum superiorem, subcostium & supercostales* dilatatur, sequuntur.

§. 3. Dilatato h. m. pectore, aër propria gravitate per asperam arteriam in pulmones irruit, & per bronchia quaquaversum distribuitur: cum autem aër singulari instructus sit vi asslica, totam cellulofam pulmonum substantiam simul admodum expandit. Quando verò  
thorax,



thorax, per musculos *sacro lumbum, serratum posticum inferiorem, sternocostales & infra costales* de quibus vid. *Verheyen Anat. Tract. VI. Cap. 7. & 8.* constringitur, aer denuò expellitur.

§. 4. An autem in inspiratione aliquid aëris ipsam Massam humorum ingrediatur? maxime adhuc hodiè controvertitur. Qui affirmativam tenent, diversarum sunt partium, alii enim aërem elasticum atmosphaericum, alii aërem mediæ naturæ, alii verò ætherem tantum per poros pulmonum in Massam sanguineam penetrare dicunt: omnes autem in eo consentiunt, maximè necessarium esse huncce aëris ingressum ad motum intestinum sive vitalem sanguinis conservandum. Sed quamvis ætheris, juxta Physicos, omnes minutissimos poros penetrantis, ingressum in sanguinem minimè negare velim, quoad reliqua tamen assentiri nequeo: 1. enim pulmonum pori minores sunt, quam ut aërem crassum atmosphaericum admittere queant: & 2. si magna aëris portio sanguinem ingrederetur & cum hoc ad partes distribueretur, ob insignem calorem summopere elasticus evaderet, & turbaret potius sanguinis motum, quam promoveret. Quod autem aërem mediæ naturæ attinet, hætenus nondum explicatum est; quid præcisè sit. Si verò per eundem intelligitur aër subtilior, is sanè neque ad respirationem, neque ad vitam aptus est: id quod expertus est *Acosta*, hic enim referente *Boyle Nov. Exper. Phys. Mechan.* p. m. 137. altos Peruvix montes transiens, cum sociis

ociis vomitu violento (non sine emissio etiam sanguine) tamdiu correptus fuit, donec in commodam magis & naturalem aëris temperiem pervenerint. Magis E. probabilis mihi videtur eorum sententia, qui ingressum aëris in massam sanguineam negant.

§. 5. Si de usu Respirationis quæritur, Veneres & eorum asseclæ, qui sanguinem ceu liquorem calidum, & ad maiorem adhuc caloris gradum adspirantem, considerat, refrigerationis ratio homini & animalibus viventibus datam esse respirationem respondent: hunc autem calorem sanguini in corde à *calido innato*, *spiritibus vitalibus & flammula vitali*, imprimi asserunt, & cum omnem calorem & flammam fulgines coactari experientia edocti essent, credunt quoque fulgines à flammula vitali & calido innato provenientes in expiratione cum aëre egredi. Proponunt autem suam de Respirationis usu refrigeratorio opinionem exindè, quod febricitantes, ut cursu aut motu fortiori fatigati, ad æstum mitigandum frequentius respirare cogantur, manifestò indicio respirationem refrigerandi sanguinis causa viventibus concessam esse.

§. 6. Sed maximè falluntur omnes, qui necesse refrigeratorium respirationis usum cum meritis admittunt, ratio enim & experientia contrarium probant: *experientia* enim constat, quod, quo intensior est respiratio, eo magis sanguis calefiat, id quod clamantes & cantantes manifestum probare possunt, qui notabilem post

H

can.

cantum sentiunt calorem & sitim quoque, unde adeò exinde ratio Physica, *cur cantores ament humores?* statim appareat. Ratio autem probat, quod quo magis rarefiant humores, eò magis ad calorem concipiendum fiant apti: Cum autem in pulmonibus, dum aër eosdem intrat, omnesque eorundem vesiculas replet, vasa sanguifera ab aère maximè comprimantur, & sanguis in iisdem contentus conquassetur, & in minores partes dirigitur, non potest non fluxilis atque calidus reddi, idque eò magis, quoniam actus hicce continuè celebratur. Quod verò allatam, pro usu refrigeratorio, probationem, *quod nempe febricitantes & currentes frequentius respirare cogantur* concernit, parum ea probat: cum enim in febricitantibus & currentibus sanguis celerius moveatur, & frequentior fiat circulatio, necessarium quoque, dum sanguis sæpius per pulmones moveatur, respiratio, quæ ad motum sanguinis quantum maximè confert, frequentior esse debet, quo h. n. stagnationes sanguinis in pulmonibus præcaveantur. Nec etiam illa objectio, *quod animalia calidiora fortius respirent*, respirationem illis ad sanguinis refrigerium datam esse probat, contrarium enim veritati magis consonum est, *quod nempe calidiora sint, quia fortius respirant.*

§. 7. An fuligines in expiratione exeat cum aère & quid pereas intelligendum sit? adhuc hodiè inter Physiologos controvertitur: alii enim illas defendunt, alii easdem rejiciunt. Quod primum attinet, an scil. fuligines hujus



CAP. IV. MEMBR. III. ART. III. 115  
modi è pulmonibus exeant, certissimum illud  
est: tempore enim hyberno, ubi à frigore vapores  
condensantur, vapor visibilis continuo ex  
ire prodit; manifesto indicio, in pulmonibus  
feri aliquam secretionem & excretionem. Quod  
erò alterum concernit, quid per fuligines intel-  
legendum sit? responderi potest, eas nil nisi se-  
rum halituosum, per pulmonum poros in tra-  
cheam transsudans, esse, quod postmodum cum  
ire egreditur. Serum hocce ferè ejusdem est  
naturæ ac illud quod per transpirationem insen-  
tilem excernitur, undè etiam inter expirationem  
& transpirationem magnus est consensus,  
quidem, ut, impeditius procedente transpira-  
tione, fortius procedat exspiratio. Manifeste id  
videmus in infantibus, qui si corpore nudo aëri  
pulululum frigidiori exponuntur, statim tussi cor-  
piuntur, nullam aliam ob rationem, quam  
quod cessante feri halituosi evacuatione per cu-  
ram, nimius ad pulmones hujus feri fiat affluxus,  
quod natura per tussim ejicere conatur. Si au-  
tem quis veras fuligines, quales igni aut candelis  
propriæ sunt, in exspiratione excerni asserit, is  
maximè fallitur: biolychnia enim seu  
candelæ vitales, quæ hasce fuligines emittere  
sunt, jam diu extinctæ sunt.

§. 8. Hæc de causis motus humorum sus-  
cipiant: quo autem Medici Tyrones quandam  
culi delineationem habeant, eam brevi tra-  
ctat. Sanguis per venam cavam ascendentem  
descendentem à partibus refluus, tendit ad cen-

trum sive cor, ut lymphæ ac chylus ipsi arctius admisceantur : ne autem à capite descendens cruer in venam cavam inferiorem præcipitetur & sanguinis ascendentis cursum impediat, provida natura tuberculum venæ cavæ implantavit quod sanguinis cursum sinistrorsum ad cordis auriculam dextram dirigit. Sanguis in hanc dilatam infusus, tamdiu hic moratur, donec is qui in cordis Ventriculo dextro continebatur per systolen expulsus sit. Hinc contracta auricula (quæ eodem modo systole ac diastole gaudet ac cor) in dextrum cordis ventriculum impellitur sanguis, cujus reditum ad auriculam & venam cavam valvulæ tres (triangulares, tricuspidæ sive mitrales dictæ) impediunt, undè corde contracto per arteriam pulmonalem in pulmones impellitur : ne tamen ex hisce ob eorum intumescentiam & motum reditum tentet, valvulæ itidem tres semilunares & sigmoideæ à figura vocatæ, obicem ponunt. In pulmonibus autem subsistere nescius sanguis, dum novus tergo affluens eum continuo urget, ex arteriarum propaginibus in venæ pulmonalis ramulos receptu adjuvante aëris pressione, per truncum ejus in sinistram cordis infunditur auriculam, è qua postea, corde in diastole constituto, per auriculam systolen in sinistram ventriculum propellitur. ne verò antiqua, dum cor contrahitur, ad pulmones & auriculam legat vestigia, valvulæ duæ triangulares obstant. Ex sinistro denique ventriculo, in cujus principio itidem tres valvulæ

milu

milunares, sanguinis reditum impediētes, occurrunt, expellitur, ex qua per varios ejus ramos in univēsum corpus distributus, per venas minores ad cavam, & per hanc ad cor revehitur, de- nuò per priores vias ad partes propellendus & revehendus.

§. 9. Quo statim differentia circulationis foetus & adulti pateat, eam, quamvis non sit huius loci, hic subjiciam. Sanguis ex hepate uterino, utero matris adnato, per venam umbilicalem ad hepar fertur, & venæ portæ infunditur: non tamen per hujus ramos in univēsum hepar dispergitur, uti in adultis id contingit (& inferius ubi de secretionē bilis agetur, declarabitur) sed per ductum Glissonianum immediatè ad venam cavam ab inferioribus ascendentem pergit & ad cor ascendit, ejusque portio auriculam ingreditur dextram, portio verò per foramen ovale ad auriculam transit sinistram: hinc qui dextram ingressus erat auriculam, ex hac in ejusdem lateris ventriculum infunditur: ex hoc autem opere systoles in pulmones expulsus, non in eos distribuitur, sed per ductum arteriosum Botalli ad arteriam derivatur aortam: alter verò, quem per foramen ovale sinistra receperat auricula, ventriculo infunditur sinistro, & ex hoc in arteriam aortam expellitur: sicque sanguis foetus non bis, uti in adultis, sed semel tantum cor ingreditur. Expulsus h. m. sanguis in totum corpus nutritionis gratia distribuitur & pervenas redit: portio tamen ejus per duas arterias umbilicales, utrin-



que ex ramis aortæ iliacis oriundas, ad placentam revehitur, ut ibidem novo imprægnetur succo nutritio & per venam ad fœtum revehatur.

## M E M B R U M   I V .

De

### *Effectibus Motus Humorum.*

**P**erspecta materia circulatione movenda, & causis motus humorum, restat, ut quoque videamus effectus à motu hocce humorum pendentess. Consistunt autem potissimum 1. in continua heterogeneorum & superfluatorum remotione. 2. Convenientium & laudabilium conservatione & appositione : ex quibus tandem 3. ultimus resultat effectus Vita & Sanitas.

## A R T I C U L U S   I .

De

### *Secretione & Excretionē.*

#### §. I.

**Q**Uando sanguinis massa h. m. ad omnes partes & viscera colatoria fertur, variæ particulae per poros partium & viscerum secedunt, & vel corpore, tanquam inutiles excernuntur, vel secretæ sanguini tamen denuò per varias ambages miscentur & in alios usus impenduntur : ad primam classem spectant in primis *sudor, urina, feces alvi*

*alvinæ &c. ad secundam lymphæ, ad tertiam verò lac & semen &c.*

§. 2. *Organum secretionis, consentientibus plerisque Physiologis, sunt glandulæ conglomeratæ, & quæ cum hisce analogiam habent, pori arteriarum. Sunt autem glandulæ conglomeratæ juxta Bergeri Physiolog. p. 116. membranosi folliculi, qui tanquam basis fulciendis saltem vasis sanguineis, & inde egredientibus tubulis excretoriis serviunt, & parte una collectos gerunt capillares arteriarum ramulos, ante, quam in venas replicentur, in cincinnos veluti inflexos, atq; intestinorum more magis, vel minus, plicatos, parte verò altera ab his orientes poros & tubulos, quorum plures plerumq; confluant, & majores ductus excretorios constituunt, emittunt, & omni sua fabrica seminum instar milii vel acinulorum, per cutim, atq; membranas plures alias disseminati, & vel solitarie hinc inde dispersi, vel in peculiaria variæ figuræ, & magnitudinis, organa glomerati, variis nominibus insigniuntur. Quemadmodum in mammis, pancreate, glandulis salivalibus, & oculorum, Ventriculo etiam, præcipuè Castoris, observemus licet. Quæ verò in intestinis, hepate & cerebro vulgò supponuntur glandulæ, juxta eundem Bergerum, apices tantum arteriarum sunt, per quarum poros fit transcolatio.*

§. 3. *Quamvis autem, quoad organum generationis, plerique consentiant, quoad modum tamen admodum dissentiunt: alii enim in singulis visceribus peculiaria fermenta: alii certos & figuratos supponunt poros: alii verò reje-*

Etis hisce differentem tantum pororum magnitudinem in visceribus diversis admittunt. Quod fermenta attinet, originem hæc ex Chymicorum scholis traxerunt, quod ex iis patere potest, quæ Cap. 3. ex *Henrico* ab *Heer* allegata fuerunt. Sed uti *Archei*, ita & arma eorundem fermenta sunt figmenta: si enim juxta hanc hypothesin omnis humor præparatur per fermenta, sequitur, quod fermenta illa alia præsupponant fermenta, (cum ceu liquida à se ipsis præparari nequeant) & hæc iterum alia priora. Sed cum alii prævideant, sic facile dari processum in infinitum, dicunt statim à primo principio cuiusvis visceri proprium concessum esse fermentum, cujus ope humoribus præterlabentibus sui indolem imprimat: quibus tamen facile responderi potest, quod, si statim à primo principio tale datum est fermentum, illud, cum præterlabenti humori semper aliquid communicare cogatur, necessario tandem absumi, & sic visceris virtus secretoria & alteratoria tandem cessare debeat. Sed regeret forsan quispiam, fermentum hocce continuò restitui & reparari, & sic semper in eodem vigore permanere. Sit ita juxta hypothesin. Quis autem restituit istud fermentum, & undè provenit istud? an restituitur ex *Massa Sanguinea*, an vero extra corpus datur materia ad fermenta restituenda apta? Si prius, necessario aliud iterum supponendum est fermentum, quod primi defectum ex *Massa sanguinea* resarcire queat; quoniam juxta hypothesin liquor omnis præsupponit fermentum, quod



quod ei peculiarem naturam imprimere queat. Sin verò posterius verum est, meritò iterum quæritur, undè proveniat illa materia? cujusnam indolis sit? an præparatione indigeat? an verò jam eandem cum fermento habeat naturam? per quasnam vias absque alteratione reliquorum humorum ad locum destinatum perveniat. Si verò præparatione adhuc indiget, quisnam eam perficiat? Et quod adhuc magis fermentorum doctrina est, quod sanguis continuò magna vi per viscerum poros propellatur, & fibras viscerum abstergat, ita ut nihil heterogenei ipsis adhærere queat: necessario itaque fermentum tale, fibris adhærens, successu temporis abstergi & aboleri deberet. Si verò quis fermentis peculiare receptaculum tribuere vellet, monstret mihi illud. Sed existimo, quemvis facile perspicere, maximis difficultatibus subjectam esse hanc de fermentis viscerum doctrinam, & satius esse clariora quærere principia, quam *difficilibus nugis* tempus inutiliter terere.

§. 4. Non minoribus quoque difficultatibus obnoxia est altera hypothesis, *quæ poros viscerum speciali figura præditos, particulas in Massa sanguinea hisce poris exactè respondentem* supponit. Sunt autem difficultates illæ. 1. Quod viscera consent ex fibris mollibus, ad constrictionem & relaxationem aptis, ac viscera ope motus tonici modo constringantur, modo verò relaxentur, ita ut ob hanc eandem causam secretio modo citius modo tardius procedat: quare impossibile

videtur, servari posse exactum pororum figuram. 2. Quod fluida nullam pororum certam atque determinatam figuram requirant, sed sufficit solum, si magnitudo pororum particulis liquoris secernendi transitum concedit; quod exemplo aquæ, per omnes poros transeuntis, (si modo pororum magnitudo id permittit,) probari potest. 3. Quod stante hac hypothese, particula figurata sigillatim tantum poros penetrare deberent, cum tamen interdum largissimæ fiant sudoris & urinæ secretiones, quod sanè fieri non posset, si particula sigillatim tantum secernerentur. 4. Quod particula Massæ sanguinæ ob continuum motum intestinum & fortiolem attritum continuo atterantur & sic constantem figuram servare nequeant. 5. Quod stante determinata pororum & particularum transeuntium figura, anguli particularum pororum angulis semper exacte respondere debeant: cum verò in celerrimo & fortissimo sanguinis per arterias motu particula situm multis modis variare cogantur, impossibile est, ut particula adeò exacte semper cum figura partium convenire queant. 6. Quod; si juxta hanc hypothese figuram exacta poris respondens semper requireretur, continuæ oriri deberent obstructiones, & sic necessario requireretur novus visceris præses, qui particulas, si forsan quædam angulis pororum non rectè responderent, ita dirigeret, ut directè angulis pororum quadrarent. 7. Quod juxta hanc hypothese, nulla alius figuræ particula, per po-

ros

ros penetrare posset, cum tamen contrarium chylus, ex variis eculentis & potulentis (in quibus tamen necessario differentis figuræ particulæ admitti debent) compositus, probet: imò in ipsa urina particulæ salinæ, terrestres, sulphuræ, biliosæ, & aquosæ continentur, quæ per eosdem renum poros transcolantur, quas tamen omnes diversæ figuræ esse nemo negaverit. Ut alia, de quibus videri potest *Dn. D. Stahlii Theor. Med. Part. 1. p. 82. & Berg. Physiol. p. 123.* silentio præteream. Magis ergo probabilis ultima videtur hypothesis, quæ poros viscerum, quoad magnitudinem liquorum discernendorum particulis proportionatos, admittit.

§. 5. Quo verò eò magis diversitas humorum secretorum appareat, singulos, qua fieri potest brevitate, pertractabimus.

## PUNCTUM I.

De

### *Lympha Secretione*

*ejusq. motu.*

§. 1.

**L**ympha in Scholis Medicorum denotat liquorem tenuem aquoso gelatinosum, ex Massa sanguinea secretum, & in vasa lymphatica tenuissima receptum. Veteribus lympa cum vasis lymphaticis ignota erat, usque ad tempora Bartholini, Rudbeckii &c. qui vasa lymphatica detexerunt.

§. 2.



§. 2. Quod ipsa vasa lymphatica, de quibus supra *Cap.* 2. §. 67. jam dictum fuit, concernit, admiratione summa dignum est, quod hæc vasa sint adeò tenuia, & nihilominus tamen tam rarò rumpantur. ruptura enim eorum, quæ ut plurimum ceu causa hydropis allegatur, sæpissimè nulla est. Et deindè pariter notatu dignum est, quod hæc vasa liquorem vehant utilissimum, multis particulis nutritiis laudabilibus refertum, & tamen adeò sint tenuia, ut leniter tractata, nihilominus facilè rumpantur; ut adeò quis existimare posset, vasa hæc, respectu liquoris contenti, negligenter admodum esse facta. Sed quamvis vasa hæc admodum tenuia, liquorem verò contentum laudabilem esse certum sit, nullius tamen negligentix hoc ipso accusanda est natura, quatenus vasa lymphatica ab aliis partibus membranosis & fibrosis satis muniuntur, ita ut non facilè lædi queant. Potius E. dicendum est, non sine summo consilio vasa hæc adeò tenuia facta fuisse, ut scil. per poros eorundem in transitu per partes superflua serosa humiditas, lymphæ adhuc admixta, secedere queat, & lymphæ ab omnibus feri inquinamenti libere-  
tur, ac purior evadat.

§. 3. Quodnam sit organum secretionis lymphæ, & quomodo lymphæ à Massa sanguinea separetur & vasa lymphatica ingrediatur, adhuc dubium est. Fuere enim, quid ad omnem secretionem glandulas necessarias esse ducentes, extremitatibus arteriarum parvas glandulas, lym-

lympham separantes, adhærere voluerunt: cum verò hæ glandulæ demonstrari non potuerint, paucos nacta est affeclas hæcce opinio. Sunt adhuc alii, qui, dum anostomoses vasorum & immediatum sanguinis ex arteriis in venas admittunt transitum, lymphæ secretionem per arteriarum poros fieri, & portionem ejusdem per poros excidentis ad nutritionem impendi, partem verò residuam à vasis lymphaticis absorberi & revehi volunt. Alii tandem sanguinem in partium substantiam effundi & partem crassiorem à venis, subtiliorem vero gelatinosam partem à lymphaticis recipi contendunt: quæ ultima quoque sententia mihi præ cæteris probabilior videtur. Sed cum hæcce Physicam magis quam ipsam Medicinam concernant, ideò in iisdem prolixior esse nolo.

§. 4. Quare autem lymphæ & quem in finem continuò à sanguine separetur, hæc videtur esse ratio, quod lymphæ gelatinosæ cum sero salino bilioso faciliè concrefcere possit in mucum lentum, vasa & glandulas obstruentem, ac atrophiam, cachexiam, hydropem aliaque mala producentem. Posse autem serum cum lymphæ tale concretum lentum & mucosum formare, manifestè sæpius videre licet in hydrope, ubi humores extravasati instar tragacanthæ tenaces redduntur. Consulto E. & continuo lymphæ secernitur, ne hujusmodi concretio mucida sequatur.

§. 5. Cum verò lymphæ ad concretionem & ad stagnationem adeò prona sit, motoribus opusest, ejus reditum ad interiora promoventes. Concurrunt autem 1. *conformatio vasorum*. dum summe angusta sensim sensimque ampliora redduntur, & sic faciliorem lymphæ cursum concedunt. 2. *Valvulae copiosæ*, quæ lymphæ motum versus interiora promovent, reditum verò ad partes impediunt. 3. *Pulsus arteriarum*, quas ferè ubique comitantur vasa lymphatica. 4. *Motus tonicus* partium ambientium vasa lymphatica stringens, & sic motum fluidi contenti promovens. Quibus 5. à quibusdam Recentioribus adduntur *glandulae coglobatae*. Sunt autem juxta *Nuckium Adenograph. p. 27.* compositæ ex duabus membranis, quarum exterior admodum tenuis est, alteri tamen fortiori & fibrosæ firmissimè adhæret, interior autem substantia tota quanta fibrosa est: quæ fibræ variis modis seintersecantes, *Nuckio* glandulas hasce *muscosas* appellandi occasionem dedere. Ulterius adhuc progressus est *Malpighius*, qui inter hasce fibras vesiculas parvas & pellucas detexit, quarum intuitu, glandulas coglobatas vocat vesiculosas, vid. *Berger. Physiol. p. 166.* Præterea arteriis quoque & venulis hinc inde super fibrillas carnosas excurrentibus & copiosis nervulis per totam substantiam dispersis præditæ sunt. Ex hac E. glandularum structura quidam Recentiorum satis probabiliter concludunt, lympham per vasa lymphatica adducentia infundi in vesiculas gland-



glandularum à Malpighio detectas , inque his ope fibrarum validarum vesiculas ambientium validè conquassari , ac fluxiliorem h. m. redditam per vasa egredientia expelli, sicque has glandulas in movenda lymphæ eodem munere ac cor in movendo sanguine fungi. Quantus harum glandularum sit usus in promovenda lymphæ, experientia satis probat , si enim hæ in officio suo turbantur, variæ lymphæ sequuntur stagnationes, quod in primis in infantibus atrophia laborantibus cernere licet.

§. 6. Pergit sic promota lymphæ omnis ad centrum ; & quidem , quæ ab inferioribus partibus & ex toto abdomine redit , infunditur omnis in receptaculum chyli , è quo per ductum thoracicum cum chylo ad venam pergit subclaviam & in hoc itinere lympham quoque è pectore refluentem assumit. Quæ verò è brachiis & capite refluit , propè eandem ductus thoracici insertionem per vas collare majus in dictam venam subclaviam infunditur : sicque quæ ex sanguine in partibus deposita fuerat lymphæ, per propria vasa ei denuo affunditur, ut novis imprægnetur particulis gelatinosis, sanguinemque fluxiliorem reddat. Undè apparet non opus esse , ut lymphæ originem à succo nervorum in substantia partium liquefacta derivemus, cum ea nil nisi sanguinis soboles sit.

## PUNCTUM II.

De

*Liquoris nervorum secretione  
& motu.*

## §. I.

**S**I ulla materia in tota Physiologia, hæc sanè quæ de *fluidonervorum* sive vulgo sic dictis Spiritibus animalibus agit, innumeris difficultatibus subjecta est; hic enim existentiam eorundem affirmat, ille negat: hic de essentia fluidi hujus sic, alius aliter sentit: hic motum hoc, ille alio modo fieri contendit: hic hosce effectus illis tribuit, quos alter rejicit: quære cum in materia adeo intricata cautè procedendum sit, ordine, quantum fieri potest, omnia, quæ ad eos pertinent, pertractabimus, ut Tyronibus appareat, quid de fluido hocce sive spiritibus animalibus sentiendum sit. Cum autem fluidum hocce in cerebro elaborari & per nervos distribui in universum corpus vulgò statuatur, ante omnia videndum est, *an cerebrum ad elaborandos spiritus, nervi verò ad eos vehendos apti sint.*

§. 2. Quod cerebri *structuram* attinet, non est necessarium eam denuò hoc loco tradere, cum Cap. 2. §. 10. de ea jam actum fuerit, sufficit saltem paucis inuisse, quod juxta quosdam Recentiores *corticalis cerebri substantia ex innumeris glandulis, apicibus arteriolarum adhærentibus;*  
*medulla-*

medullaris verò ex minutissimis tubulis perviis constet, ex quibus in fasciculos collectis postmodum nervi oriantur, & in totum corpus distribuuntur. Quamvis autem hoc à quibusdam pro certo habeatur, non desunt tamen alii, qui omnem porositate fibrillis nerveis denegant, inter quos præcipuus est Bidloo, qui *Exercit. Anatom. Chirurg.* I. p. 3. ait: quod ipsa nervorum substantia non aliter perlustrandam se exhibeat, quam forma indefinitorum, tensilium, pellucidorum fibroforum, per universum distributorum corpus, filamentorum, quorum latera, sine interstitiis continguitate uniantur, membranæ obvelentur & in fasciculos distinguantur. Rationes aut potius experimenta quibus id probatur, sunt 1. quod portio nervi utrinque ligati, antliæ pneumaticæ inclusa, aëre evacuato non intuerit. 2. Quod in nervis nunc parum, nunc maximè exsiccatis, tubis vitrisque opticis, nullam cavitatem tubulorum detegere potuerit. Ex quibus & aliis ibidem videndis *Exercit. X. p. 121.* concludit. 1. *nervum non esse tubulum, & proinde valvulis carere.* 2. *nervorum stamina non admittere interstitia atq; ita tubulos non conficere, neq;* 3. *in iis proveniri liquidum, vaporem vivificantem, vel spiritum animale:* pag. tamen 122. concedit à cerebri mole & in ultimam nervorum propagationem, stamina nervea extus & proximè concomitari liquidum, ea eadem quantitate, ut tereti stylo pertusa nucha, occipitis inter & primam vertebra unciæ quædam, brevi temporis spatio, dimittantur, tantiq; esse ejus li-

quidè.



quidi in nervorum usum momenti, ut nervi eo destituti  
(nec tamen corpore læsi officio priventer, & pag. 124..  
subjungit: *nervum moveri, mediante motu liquidit;*  
*corpus suum concomitantis, eumq; hoc agitato liquido*  
*de tono suo mutari, de tensione sua rectilinea in an-*  
*gulum duci, accurtari, partesq; sibi conjunctas mo-*  
*vere.*

§. 3. Hæc Recentiorum Anatomicorum  
& quidem potissimorum placita sunt: ex quibus  
apparet hosce Authores quidem quoad stru-  
cturam nervorum differre, quoad fluidi verò  
præsentiam & usum inter se convenire, quoad  
scil. sine fluido hocce nervi moveri nequeant  
id quod etiam experientia demonstrat, dissectio  
enim vel ligato nervo sensus atque motus partis  
ad quam nervus tendit, perit: manifesto indicio  
aliquid è cerebro per nervos ad partes ferri: imò  
si ligatura nervi per aliquot dies relinquitur, in-  
flammatiō & sphacelus partem corripunt, in  
quod apparet ex modo citati Dn. *Bidloo. Exercit.*  
*p. 2.* Cum enim maximo cani venatico femoris  
nervum per aliquot dies, firmissimo constrictum  
teneret vinculo, perdidit, multos post latratu  
ejulatusque hujus, ut & vicinarum partiū  
usum, motum, posteaque vitam, irruente in par-  
tem ligatam inflammatione, & tandem in totum  
femur, sphacelo.

§. 4. Cum itaque ex hisce certissimum  
dari liquidum quoddam, quod, sive in cerebri  
glandulis sive alibi generetur, ad motum & sensum  
est necessarium: videndum jam quana-

1. sit ejus materia & essentia : 2. quanam sit causa , quæ liquidum illud ad partes promovet , & quanam sit motus illius. 3. qua ratione effectus suos in corpore præstet , & 4. an ut causa efficiens principalis , an verò tantum ceu instrumentalis sit considerandum.

§. 5. Quod itaque materiam ejus concernit, Helmontii affectæ credunt, spiritum vitalem in corde elaboratum in cerebro in fluidum nervorum converti ; sed cum spiritus hicce vitalis à paucissimis admittatur , à plerisque verò , qui entia præter necessitatem multiplicare nolunt , rejiciatur facile apparet fluidi nervei originem , si à spiritibus animalibus petitur , esse admodum incertam & dubiam. Alii qui emunctæ naris sunt , cum *Borello sulphuream & urinosam* materiam ad fluidi nervei materiam desiderant. Alii , quibus tenerrimæ linguæ sunt papillulæ , *acidum* quid in fluido nervorum deprehendunt. Alii , ut è sublimi loco natos habeant spiritus , ex *aëre* , alii verò ex *nitro aëreo* eosdem præparant : ut alias materias fluidi taceam.

§. 6. Sed cum quivis facile perspicere queat , quod pleræque harum materialium sint fictitiæ , & magis in cerebris Authorum , quam in corpore humano existant : necessario alia quærenda est materia fluidi hujus nervei. Ex sanguine per arterias carotides ad cerebrum vecto , fluidum nervorum elaborari plerique fatentur : cum verò sanguinis tres sint partes , sanguis strictè dictus , *lympha* & *serum excrementitium* , videndum quanam

I a

nam

nam pars ad fluidi materiam præ cæteris apta sit. Serum excrementitium, aquosum, halituosum, salinis, biliosis inutilibus particulis repletum, nemo credo admittet, E. vel sanguis vel lymphæ fluidi erit materia. Ex sanguine rubicundo, cum cerebri substantia medullaris, medulla oblongata & exindè produentes nervi albi sint, sine dubio non fiet: *E. ex lymphâ laudabili nutritia.* Sponte itaque ruunt varia de fluidi materia commenta.

§. 7. Quo autem in loco fluidi hujus à sanguine arterioso fiat secretio ex cerebri fabrica patere potest: cum enim ejus substantia corticalis, plerisque Recentioribus fatentibus, sit glandulosa, aut juxta quosdam glandularum analogiam habeat, sine dubio in hacce cineritia substantia subtilissimæ hujus lymphæ à sanguine carotidum arterioso fiet separatio. Difficultas tamen magna adhuc superest, quorsum scilicet & per quas vias è glandulis feratur fluidum secretum? si enim fibræ nervorum non sunt tubulosæ, & nil nisi collectio fibrarum medullaris cerebri substantiæ sunt, non potest per hasce fluere: alia E. quærenda sunt vasa fluidum in glanduli corticalis substantiæ secretum vehentia. Sed cum in re admodum subtili & obscura mens humana facilè errare queat, tempus forsan docebit, an juxta *Bidloï* observationes fibræ nervorum porositate careant? an vero juxta alios sint porosæ? aut an prorsus novæ dentur viæ fluidum nervorum vehentes? sufficere interim potest



poterit, experientia constare, dari aliquod fluidum nervorum ad sensum & motum maximè necessarium.

§. 8. Quo verò eò purior evadat hæc nervorum lymphæ, antequam ad cerebrum sanguis ascendat, multum pituitæ sive muci, salivæ humoris aliorumque plus vel minus excrementitiorum à sanguine fit separatio : cum enim sanguis per minutissima cerebri vascula penetrare & lymphæ subtilissimæ portio in cerebro secerni debeat, necessario prius varii humores crassiores à sanguine separandi sunt, quo eò facilius sanguis in minutissimos glandularum poros penetrare, & lymphæ nervorum ab eo separari queat.

§. 9. Si de causa motus fluidi nervorum quæritur, communiter pulsus arteriarum allegatur : cum verò arteriæ carotides, statim ac cerebrum ingrediuntur, in multos ramos minores & minutissimos dirimantur, vix à me impetrare possum, ut credam, totam cerebri molem ita à minutis hisce vasculis moveri posse, ut systolen atque diastolen exercere, fluidumque nervorum ad partes propellere queat : quare veritati magis consona videtur, sententia Baglivi, qui in *membranis* cerebri causam motus hujus quærit. Potest autem hæc Baglivi sententia probari sequentibus argumentis I. quod *dura mater non sit tela membranosa simplex, sed ex tribus diversis ordinibus fibrarum composita, quorum alter super alterum magno artificio extendatur, ac intersecetur ad*

invicem, horumq; ordinum alter in ejus parte convexa, reliqui in ejusdem concava observentur. Quod insuper in parte interna, seu concava, quæ directè cerebrum tangit & cerebellum, quosdam obtinuerit duræ meninx lacertos fibrosos ac valdè fortes & solidos, qui varias illius in partes expanduntur, præcipuè in latera & in partem anteriorem ac posteriorem falcis messoria: omnesq; fibrarum ordines desinant in septis, quæ falx gignit, præcipuè in illis, quæ cerebrum à cerebello dividunt, & aliis majoribus, quæ cerebrum bifariam secant. Quæ sanè omnia, meninges ad motum, & quidem validum, structas esse, satis abundè probant. 2. Quod in meningibus continuus observetur motus *Systalticus* & *Diafalticus*: id quod manifeste apparet in vulgo sic dicta recens natorum fontanella, ubi tactu systole & diastole optimè distingui potest: idem hic motus cernitur etiam post trepanationem, ut experimenta diversa, à Baglivo ad detegendam systolen & diastolen in ovibus recens natis instituta, silentio præteream. 3. Quia meninges non solum totum cerebrum ambiunt, varios sinus constituunt, & in duas partes dividunt, sed etiam omnes nervos investiant: manifesto indicio propter motum quendam meninges cerebrum & nervos investire. Id quod 4. manifestissimè probant (1) *Puncturæ meningum* à Baglivo institutæ: Si enim dura mater à dextra pungeretur, in omnibus ferè partibus convulsivi motus excitabantur, in ea præcipuè vehementissimi, in qua ipsa pungebatur: sic etiam si pungeretur à læva. Generaliter

- tamen

tamen labefactato post puncturam meningis tono , confusio incredibilis in partibus omnibus infernis, tam sentientibus, quam se moventibus nascebatur, primò quidem in capite, deinde in reliquis. Ex quibus observationibus duo fluunt, primo verissimè dixisse Hippocratem: *dextra dextris, sinistra verò sinistris respondere*: secundò certissimum esse, *meningum potentiam* (quoniam puncturas convulsiones sequuntur universales) *esse universalem in omnes partes molles*. Eò magis autem horum assertorum: veritatem probant (2) *injectiones variorum liquorum in meninges*: postquam enim per foramen in vertebram canis moloſſi terebratum spiritum vini tepidum ope syringæ injecisset, velocius respirabat, leviter veluti horrebat per totum, ac veluti paulo post somno corripiebatur. At quando in majori copia liquor hic injiciebatur tepidus, tremebat fortius, sed cum hilaritate. Post duas horas injiciebat guttas aliquot Spiritus nitri soluti cum pauca aqua: tremebat vehementius, ejulabat, torquebatur: stupore primò corripiebatur, deindè motibus convulsivis, modo in partibus superioribus, modo in inferioribus, pro ut acidus liquor modo partes superiores modo inferiores spinalis medullæ magis vel minus alluebat ac vellicabat. Comedit interea frustula panis ea nocte, & mane sequenti stupidus videbatur, sed magis expeditos motus peragebat parte posteriori, quam anteriori corporis. Mane siringa injiciebat spiritum



“nitri in majore copia. Statim horrendi ululatus,  
 “ventris intumescencia, aliquando vomitus, ali-  
 “quando spuma ex ore, motus convulsivi in-  
 “gentes, lamentatio & ululatus magnus: facti aliis  
 “syringationibus debita semper, sed pauca cum  
 “liquoris præfati quantitate, crescentibus sensim  
 “convulsionibus derepente obiit, & rigidus sta-  
 “tim evasit veluti truncus. In catulo terebrato  
 “in vertebra tertia colli, facta syringatione decocti  
 “vitrioli in spinalem medullam eoque injecto  
 “valde calido, statim periit convulsus. Factus  
 “itaque variis terebrationibus in vertebriis spina-  
 “lis medullæ canis, suis, leporis, pecudis &c. ob-  
 “servavit, quod spirituosæ & leniter aromatica,  
 “licet levem tremorem pariant, statim post  
 “syringationem, paulo tamen post animal hi-  
 “lariter magisque vividè se gerat. At instillatis  
 “acidis liquoribus statim tremores, convulsio-  
 “nes, ululatus, tumores abdominis, vomitus,  
 “stupores, paralyces, ad motum impotentia,  
 “urinæ aut fecum copiosæ excretiones, ali-  
 “quando totales eorum suppressiones & hisce  
 “similia pro varietate læsionis & punctiōis  
 “meningum spinalis medullæ oriuntur. Hasc  
 Baglivi observationes ꝑ. confirmat etiam *Praxis*  
*Chirurgica*: qua constat læsiones & puncturas  
 duræ matris, à fragmentis cranii ortas, convul-  
 siones universales facillimè sequi. Ut alia plu-  
 ra de quibus Baglivi *Lib. 1. de Fibra Motrice Cap. 5.*  
 aliisq; prolixè agit, silentio præteream.

§. 10. Undè & à quo dura mater moveatur , diversæ sunt Authorum sententiæ , alii enim credunt motum meningis esse à pulsu arteriarum per eandem propagatarum : vid. *Munnick Anat. p. 154.* alii vero à nervis , vel à spinali medulla , vel à cerebro prodeuntibus & in duræ matris substantiam recurrentibus , motum illum deducunt. Sed cum parvæ istæ arteriæ per duram matrem disseminatæ impares sint , ut systolen & diastolen in toto cerebro excitare possint , (tota enim sua mole , ut cum *Baglivo* loquar , systolizat ac diastolizat cerebrum) ac nervi isti recurrentes à nemine hætenus demonstrati ac descripti fuerint : potius cum *Baglivo* peculiari fibrarum structuræ (non exclusa tamen anima , cum primo principio movente) motum huncce adscribere volo.

§. 11. Quibus probè consideratis & perspectis , quivis faciliè concedet , magnam meningis duræ motus in corpore humano esse utilitatem ; dum enim hac ipsa contractione liquidum nervorum continuo ad partes propellit, tonum & motum omnium partium conservat. Quemadmodum enim convulsiones & atonia sive paralyssis duo motus tonici sunt extremi & ab aucto vel cessante motu meningum dependent , ita moderatus earundem motus ritè constituti tonici motus unica est causa. Potest itaque ex hisce allatis experimentis absque ulla absurditate inferri in apoplexia generali motum meningum , si non penitus , maxi-

nam tamen partem cessare ; in paralyſi verò, alterutrius tantum lateris motum ſublato eſſe ; & ideo motum tonicum quoque partium vel univerſaliter in corpore vel in alterutro tantum latere ceſſare. Præterea etiam motus meningum nimiam ſanguinis irruptionem, non ſolum in cerebrum, ſed etiam in reliquas corporis partes refranat : manifeſtum hujus rei exemplum habemus in paralyſi, ubi ceſſante hocce motu ſanguis ſapius membrum paralyticum irrumpit, illudque maximè tumidum reddit.

§. 12. Motus itaque fluidi, vel per nervorum tubulos flueatis, vel tubulos tantum concomitantis, ſemper ſyſtolen meningum ſequitur, adeoque *non continuus*, ſed aliquo modo *interruptus* eſt, uti motus ſanguinis, qui in ſyſtole in arterias è corde expellitur, in diaſtole verò è venis recipitur. Coagunt tamen poſtea propagines meningum nervos inveſtientes, & fluidum ulterius promovent, uti tunica arteriarum & venarum fibroſæ. Concurrit etiam ipſius fluidi motus, illud quod jam propulſum eſt adhuc ulterius protrudens.

§. 13. Quæ cum maximè probabilia ſint, quivis facile comprehendere poterit, quid de illorum opinione ſentiendum ſit, qui motum hujus fluidi non ſolum ad partes, ſed etiam ejusdem reditum ad cerebrum concedunt : ſive enim impulſum meningum, ſive pulſum cordis ceu cauſam moventem ſupponant, reditus tamen hic in ſtatu naturali nullo modo

con-



concipi potest. Si enim pulsus cordis & influxus sanguinis in glandulas cerebri est continuus, secretio quoque fluidi nervorum & protrusio, sive in tubulos nerveos, sive in interstitium inter fibras & membranas abientes, continua & motus à cerebro ad partes perpetuus erit. Idem esto iudicium de systole meningum, quæ cum singulis momentis repetatur, necessario fluidum continuo ad partes propelli debet: ut adeò reditus ejusdem à partibus ad cerebrum impossibilis videatur. Exhalat potius hæc lymphæ per minutissimos cutis poros, postquam per labores & motum nimis attrita & resoluta est, & continuo in cerebro ex sanguine arterioso restituitur, ut sensus & motus, ad quos destinata est, in perpetuo vigore conservari queant.

§. 14. Qua ratione autem fluidum hocce effectus suos præstet in cerebro & nervis, diversæ variorum Authorum sunt sententiæ, quas & difficultates easdem prementes hoc loco recensere prolixum nimis foret. Probabilissima omnium mihi videatur ea, quæ statuit 1. influxu hocce continuo fibrillas cerebri & nervorum irrigari & 2. nervos inde aliquo modo turgidos reddi & in moderatæ tensionis statu conservari. Quibus 3. addi posset, quod hoc ipso fluido filamenta nervea nutriantur. Cur autem præ cæteris mihi hæc arrideat sententia, ratio hæc est, 1. quod sensus occupati sint circa res subtilissimas, & hinc requirant organum quo-

quoque admodum subtile & maximè sensibile, undè necessario ad melius percipiendum fibrillæ nervæ semper aliquo modo tensæ esse debent, ut eò facilius objecta externa in easdem agere & fortiolem impressionem in iisdem perficere queant. Tensionem autem in nervis esse probatur exindè, quod abscisso nervo duæ extremitates statim in substantiam partium retrahantur & breviores reddantur, quod sanè fieri non posset, si nervi aliquo modo non essent tensi. Hanc verò tensionem & turgescentiam nervorum ad sensum & motum necessariam esse probat paralyxis; quamprimum enim in hacce moderata illa tensio & turgescencia cessat, & nervi flaccidi redduntur, sensus & motus partium perit. Et hæc ipsa moderata tensio & turgescencia omnium fibrillarum nervearum, qua reliquæ quoque partes tensæ servantur, si non unica, præcipua tamen motus tonici partium mollium est causa. 2. Quod motus voluntarii promptissimam postulent executionem; qua propter requiritur, ut fibrillæ nervæ in debita flexilitate semper conserventur, quo eò facilius ad omnem motum & varias ejus alterationes inservire queant, unde cessante nervorum flexilitate membra rigida evadunt. 3. Quod, cum omnes partes corporis nutriantur, necessario quoque nervi debitum & necessarium requirant nutrimentum.

§. 15. In toto autem sensationis & motus cujuscunque actu, fluidum hocce merè passive

sive se habet : anima enim sola est , quæ ope nervorum turgidorum sentit & movet pro lubitu. Videant igitur ii , qui tot elogiis magnant hoc fluidum , qui omnes effectus in corpore contingentes eidem , tanquam causæ effici-  
cienti , adscribunt , qui perceptionem ac cogitationem , providentiam , sapientiam , amorem , gaudium , iram , aliaque mentis attributa , fluido huic , aut vulgo sic dictis spiritibus animalibus , rei tantum extensæ & materiali tribuunt , quomodo opinionem suam defendant. Lumen sanè , quod quidem eidem affingunt , & ab ejusdem irradiatione omnia phænomena deducere volunt , satis precarium est : lumen enim oculorum , cum à reflexione externa radiorum luminis (uti prolixè *Bohnius* & *Bergerus* probant) proveniat , hic parum probat : ejusdem com-  
matis sunt scintillæ , quæ eis , quibus facies percutitur , ante oculos versari videntur. Sana ratio hisce repugnat , quis enim in nervo ex subtilissimis fibrillis contexto , quem liquor aquosus & parum gelatinosus in parva quantitate permeat , lumen concipere posset ? Veteres hisce longè prudentiores fuerunt : juxta illos enim :  
*mens videt , mens audit : cæca , surda sunt omnia*  
Et juxta *Ciceronem Qu. Tusc. I. 20.* *Nos ne quidem oculis cernimus ea , quæ videmus : neq; enim est ullus sensus in corpore , sed , ut non solum Physici docent , verum etiam Medici , quia ista aperta & patefacta viderunt , viæ quasi quædam sunt ad oculos , ad aures , ad nares , à sede animæ perforatæ. Itaq; sæpe , aut*  
cogi-



cogitatione, aut aliqua vi morbi impediti, apertis atque integris oculis & auribus, nec videmus, nec audimus: ut facile intelligi possit animum & videre & audire, non eas partes, quæ quasi fenestræ sunt animi. Quæ quamvis sanæ rationi convenientia esse, quivis cordatus Medicus facile comprehendere queat, hodie tamen, in tanto mechanismi & minutissimarum minutiarum & Proteo multabiliorum particularum perverso amore, parum attenduntur. Ast cum vocem meam raucam in hoc opinionum deserto, ad infringendas præconceptas falsas opiniones parum effecturam esse facile prespiciam, ad alia potius pergo. Interim tamen illud Bergeri, *Physiol.* p. 287. certissimum esse credo, *Authores interdum res nihili vocibus, nihil sonantibus impedire, quo imperito vulgo illudant, & singularis cujusdam doctrinæ opinionem sibi concilient. Quo quidem id efficiunt, ut magno labore nihil egisse videantur.*

### PUNCTUM III.

De

### *Secretione Lactis.*

§. I.

**V**Ti duo priora liquida sunt universalia, admodum liquida & in omni corpore necessario requiruntur: ita sequuntur jam duo alia, quæ etsi sint admodum laudabilia, spissioristamen sunt consistentiæ & certis tantum temporibus

ribus in corpore reperiuntur. Sunt autem illa  
*Lac & Semen*

§. 2. Non autem uti alii humores in proprii corporis commodum vertuntur hi liquores, sed alter ad generationem, alter verò ad nutritionem infantum requiritur: undè hic sexui tantum feminino proprius, alter verò, si ovula seminarum cum quibusdam pro semine habentur, utrique sexui communis est; sin vero strictè pro masculino tantum semine habetur, maribus tantum competit.

§. 3. Materiam lactis suppeditat chylus, aut potius, lac est chylus ipse laxè tantum cum reliqua sanguinis Massa cohærens, & in mammis ope glandularum secretus. Veritatem huius asserti probat, convenientia utriusque liquoris, quoad saporem, colorem & consistentiam: quamvis enim lac chylo videatur spissius, hanc tamen spissitudinem in mammis ob solam moram acquirit, antea enim magis limpidum est magisque dilutum.

§. 4. Chylus autem hic non per peculiaris & propria vasa lactea ad mammas immediatè fertur, uti quidam voluerunt, vasa enim hæc à nemini hætenus demonstrari potuerunt: nec etiam vasa ista ductui thoracico inserta, aliquid chyli ad mammas vehunt, vasa enim lymphatica sunt, quæ lympham ex thorace refluam in ductum thoracicum infundunt. Sed potius cum sanguinè per *arterias mammarias*, à subclaviis oriundas, ad mammarum glandulas

dulas fluit : quamvis autem non adeo amplas  
 sint hæ arteriæ, & moli mammarum vix respon-  
 dere videantur, sufficiunt tamen, quoniam afflu-  
 xus sanguinis continuus est, & ita tantum lactis  
 quantum infantis nutritio postulat, commodè se-  
 cerni potest.

§. 6. Fit autem ista secretio in glandulis  
 mammarum conglomeratis, per totam mam-  
 marum substantiam dispersis, è quibus imme-  
 diatè in vasa lactifera minora & ex hisce im-  
 majora fluit, quæ antequam ad papillam per-  
 veniant ampliora sunt : in hisce lac secretum as-  
 servatur, & sensim sensimque, dum pars subtilior  
 exhalat, aliqualem spissitudinem, de qua antea di-  
 ctum est, acquirit. Dicta vasa mammaria ubi pa-  
 pillam versus tendunt, iterum coarctantur, admo-  
 dum angusta redduntur & juxta *Bergerum* ipsam  
 papillam constituunt. Hæc autem vasorum an-  
 gustia summè necessaria est, nisi enim hæ effet  
 lac continuo efflueret.

§. 7. Lac h. m. secretum etsi liquor vi-  
 deatur homogeneous, ex diversis tamen constat  
 partibus *sero*, *pinguedine*, *parte mucilaginosa*, *sale*  
 atque *parte crassiore terrestri*. *Serum* vehiculum  
 præbet reliquis & quantitate etiam reliquas su-  
 perat partes. *Pinguedinem* probat *Cremor lactis*,  
 & *butyrum*. *Pars mucilaginosa* deprehenditur  
 partim post butyri confectionem, partim & in-  
 primis post cremoris ablationem ; undè facile  
 postmodum facta transcolatione cum parte cras-  
 siori & terrestri abit in *caseum*, superflite ma-  
 nente



CAP. IV. MEMBR. IV. ART. I. PUNCT. III. 145  
nente *serosal* continente. De Analyfi lactis chymica vid. *Verheyen Supplement. Anat.* p. 55.

§. 7. Non in omnibus autem subjectis, nec etiam omni tempore, sed in adultis tantum feminis & post partum lac in mammis deprehenditur: quamvis enim è mammis infan-  
tum recens natorum nonnunquam lacteus quidam liquor exprimatur, de quo vid. *Bohnii Circ. Anat. Physiol.* p. 30. & Dn. D. *Stablii Theor. Med. Part. I.* p. 120. ac interdum, sed rarius, in mammis adularum virginum, ob frequentem papillarum pressionem, aut fortio-rem suctionem eliciatur: non tamen hæc juxta consuetum naturæ ordinem fiunt: Planè verò extraordinaria sunt, quæ de viris quibusdam, in quorum mammis lac deprehensum fuit, recensentur. Quare etiam ab hisce extraordinariis ad naturalem & consuetum ordinem, juxta quem non nisi in uerperarum mammis lac contineri debet, argumentandum non est.

§. 8. Deprehenditur autem lac in mammis nonnunquam ante partum, quod tamen aliquo modo rarius contingit, frequentius autem lac statim post partum in mammis secer-  
nari incipit, quod tamen primis diebus est admodum serosum & *Colostrum* audit: sequentibus vero diebus tertio scil. & quarto majorem acquirat spissitudinem & veram lactis consistentiam. Sub hac ipsa autem secretionem mammæ signiter, & in quibusdam non absque dolore, rgescunt, quare feminæ vel fortiori pressione  
K  
vel

vel ſuſtione mammæ evacuari coguntur. Cum autem non omnes infantes ſtatim ab initio ſugant, peculiariſſimis vitris lac extrahere ſolent: vel etiam canes juniores, ut lac exſugant, mammaſ applicant. Quod ſi facere negligunt, facillime tumores mammarum inflammatorios inde reſportant. Continuatur itaque lactis ſecretio in mammis quamdiu infans ſugit, & ſuſtione hæc ce lac in majori copia allicit: nonnunquam tamen ſubito omnis ſecretio ceſſat, & mammae antea turgidæ ſtatim flaccidæ redduntur, aut vārii nodi in iisdem oriuntur, poſt graviorem terrorem; nonnunquam infans eſt debilior, & debito modo ſugere nequit, brevi temporis ſpatio lac evaneſcit: imò percepi aliquoties feminis fide dignis, lac interdum ſubito abſque ulla manifeſta cauſa evaneſcere & portendere infantis mortem; quod an veritati conſocium ſit, hætenus per experientiam ſufficienter probare non potui. Illud adhuc circa lactis ſecretionem notandum eſt, quod feminae interdum ſentiant *motum lactis ab axillis ad mammæ*, & quidem vel ſtatim poſt partum, unde dicunt, *die Milch ſchieſſe ihnen ein*: vel etiam aliis temporibus. Hic autem ſenſus non eſt, niſi motus ſanguinis per arterias mammarias, ex ſubclaviis oriundas, ad ipſas mammæ, quem motus tonicus partium arteriarum ambientium adhuc magis ſenſibilem reddit. Contingere autem poſſe talem conſtrictionem tonicam non ſolum in partibus mammis viciniſſimis ſe

sed etiam in ipsis mammis, manifestissime probat suppressio lactationis à terrore subitaneo: & ipsæ feminae etiam quam maxime hancce contractionem spasmodicam sentiunt, cum doloribus repentinis punctoriis, unde communiter dicunt, sie seyen so sehr erschrocken / daß es ihnen wie Messer und Nadeln in die Brust gefahren. Quamprimum verò hæc strictura per fomenta, & frictiones leniores iterum relaxatur, lac statim iterum effluit. In quibusdam etiam feminis strictura talis quasi naturalis observatur, ita ut ob vasorum angustiam secretio lactis minimè succedat, & hinc lactare nequeant.

§ 9. Quare verò post partum tantum lac ordinarie in mammis generetur, variæ Authorum hætenus propositæ fuere sententiæ. Veteres credebant, lac provenire ex venis epigastricis per anastomoses cum mammariis junctis, sed cum hæc anastomoses hætenus demonstratæ non fuerint, hæc lactis via etiam nullum meretur applausum. Præ aliis verò sententiis probabilis videtur sequens: Cum femina à Deo deo creata sit, ut imprægnata fœtum in utero gerat & post partum lacte nutriat, major ipsis, respectu sexu masculini, concessa est sanguinis copia, ut illius ope fœtus in utero nutriatur: quoniam verò non semper sunt gravidæ, sanguis iste singulis mensibus effluit. Ubi verò gravidæ redduntur, sanguis suppressis mensibus in substantia uteri colligitur, ejusque chylosa



& gelatinosa portione fœtus nutritur. Sed cum post partum uterus statim constringatur, & nutritio, in lucem edito fœtu non amplius necessaria sit, sanguis iste per tubulos uterinos partim in ipsam uteri cavitatem exprimitur & sub lochiolorum nomine effluit, partim in reliqua vasa & partes regurgitat, & ad mammas à Natura diriguntur, ut portione gelatinosa sive chylosa in iisdem secreta, infans recens natus nutriatur.

§. 10. Dictum fuit antea primum lac, quod *Colostrum* vocant, esse admodum serosum, quod verò postea sequitur, esse spissius: cujus rei ratio etsi satis commodè à viarum constitutione deduci possit, quatenus ab initio angustiores sunt, & sic non nisi tenuiori lymphæ transitum præbent, postea verò ampliores redditæ, crassiorem quoque chylum admittere possunt: non tamen sine singulari ratione id factum est, cum enim infantes lac spissius ab initio ferre nequeant, & hinc tenuiori nutriri debeant, ac præterea non exigua excrementorum nigrorum, sive *Meconii*, copia, in eorum intestinis hæreat, quæ nisi promptè evacuetur, multum postmodum incommoda parere potest: Natura provida voluit, ut lac primum sit serosius, quo infantes eo commodius nutriri & meconium, aliis quoque *Papaverculum* dictum, evacuari possit, quam enim vim abstersivam serum habeat, omnibus notum est. Malè E. agunt matres, qui primum hocce lac infantibus recens natis ceu noxium denegant, cum tamen optimum & infantibus proficuum sit.

§. II. Tandem etiam notandum est, lac maximis alterationibus obnoxium esse, & animi pathemata magnam in illud habere potentiam, ita ut vel secretio lactis supprimatur, vel aliæ pravæ qualitates ipsi imprimantur: prius sæpius contingit in terrore, uti superius jam monitum fuit: posterius autem in ira. Undè etiam respectu variorum affectuum varii quoque affectus in infantibus oriuntur. v. g. iram sæpissimè convulsiones, terrorem pavores in somno, tristitiam atrophiam, sequuntur.

## PUNCTUM IV.

De

*Secretione Seminis.*

## §. I.

**V**Ti lac in nutriendo infante maximam habet utilitatem, ita semen adhuc majore pollet usu, dum ad Generis humani propagationem necessario requiritur. Non autem omni tempore, sed pubertatis tantum periodo incipiente generari incipit: quo ipso tempore insignes statim in corpore contingere solent alterationes, pili nimirum in pube erumpunt, paucosque post primordia barbæ conspiciuntur, seu, uti vulgo jocantur, der Milch = Bart sticht hervor/ vox antea acuta gravis redditur, imò ipsa textura corporis tenerior sensibilibiter in formiorem mutatur. Et hæ alterationes potissi-

mum anno decimo quarto, in aliis verò ob temperamentum diversitatem tardius observantur.

§. 2. Organum hujus secretionis sunt testes, qui ordinarie sunt duo, nonnunquam tamen unus tantum in *Monorchidibus* reperitur, qui verò ordinarios magnitudine plerumque superat, & efficacia æquat: nonnunquam tres etiam observati fuere in *Triorchidibus*. Testes hii in peculiari continentur bursa, quam scrotum vocant. Constat autem scrotum ex duabus tunicis, exteriori scil. rugosa & interiori muscolari, *dartos* dicta, ut hujus ope scrotum constringi & dilatari queat: ad coitum enim feliciter celebrandum opus est, ut scrotum contrahatur, & testes attollantur, undè etiam emeritorum scrotum semper pendulum est, & exindè quoque sæpius inhabilitas ad generandum probabiliter colligitur.

§. 3. In pueris ante pubertatis tempus scrotum est admodum contractum & testes vix apparent, imò interdum in quibusdam ad pubertatis usque tempus in abdomine delitescunt, ac deindè magnis cum cruciatibus prodeunt: in quibusdam verò per totum vitæ cursum in abdomine absconditi hærent, quæ tamen exempla admodum rara sunt. vid. *Ortlob. Physiol.* p. 109.

§. 4. Ipsam testium structuram quod concernit, ipsa ad seminis elaborationem admodum conveniens est, tota enim quanta glanduloso vasculosa est, aut juxta *Berger. Physiol.* p. 244.

nil



il nisi congeries quamplurimorum ramulorum sive vasculorum tenuissimorum miro ordine complicatorum ex arteriis spermaticis productorum est. In hosce itaque tenuissimos tubulos lymphæ subtilissima ex arteriis spermaticis infunditur, reliquum verò sanguinis & lymphæ per vasa refluit lymphatica ac venas. Hi autem testium tenues ductus mira gaudent longitudine, ita quidem, ut, si *Bellino Opusc. de Motu Bilis* p. 156. fides habenda est, major sit, quam recentæ ulnæ florentinæ. Quare autem hæc longitudo tanta sit, ratio hæc esse videtur, ut nimirum semen dum per varias hujusmodi anfractus movetur, eò subtilius & magis efficax reddatur.

§. 5. Nullum autem conspicui liquoris in ipsis hisce ductibus reperitur vestigium, sed idem demum, ubi testium filamenta sive ductus in epididymides abeunt, ex quibus postmodum seminalis hic liquor per vasa deferentia ad vesiculas fertur seminales, ut in iisdem ad coitus usque tempus asservetur. Et hoc ipso à reliquis etiam secretis humoribus differt, illi enim secreti ferè statim excernuntur, aut saltem non diu retinentur, exemplo fecum alvinarum, & urinx: semen verò in vesiculis seminalibus satius satis diu asservatur. Cum vero continua sit secretio, nec omne semen in vesiculis contineri queat, pars ejus sine dubio insensibiliter in vasa iterum recipitur, ibidemque nascens cum sero excrementitio excernitur, aut

etiam sensim sensimque cum urina præterlabente eliminatur: pars vero sensibilibiter in pollutionibus nocturnis, inprimis in hominibus pleno victu utentibus & veneris phantasiis indulgentibus, excernitur. Sin verò hujusmodi excretio, sive sensibilis, sive insensibilis ea sit, prorsus non contingit, à seminis corruptione varia mala oriri possunt: ita Gonorrhœæ ab intermisso coitu exemplum habet *Wedel. Pathol. Med. p. 670. & Forestus Lib. 26. Ob. II.* quæ tamen exempla hodiè, ubi tales morbi frequentius ab immoderato & impuro coitu oriuntur, rarissima sunt. Imò si præsentis seminis sufficiente copia nulla ejus sequitur emissio, ratio in nonnullis ita turbatur, ut instar bestiarum in quavis putidissima scorta cæcoruant impetu, qui tamen furor facta emissionem brevi cessat.

§. 6. Materiam seminis subtiliorem sanguinis portionem lymphaticam sive chylosam esse, extra omnem controversiam esse existimo: id quod exindè apparet quod alimenta laudabilia multum chyli boni largientia, seminis uberiolem generationem procurent: & è contrario deficientibus alimentis parum seminis generetur: unde etiam notum est proverbium: *Sine Cerere & Libero friget Venus, Ohn Wein und Brod / leid Venus noth.* Non autem hæc materia, uti Veteres volebant, ab omnibus partibus deceditur, sed ex Massa sanguinea per arterias spermaticas ad testes fertur & ibidem excernitur. Nota autem erat hæc Veterum opinio

nio exindè , quod crederent, ad generationem corporis perfecti omnino opus esse , ut etiam semen ab omnibus partibus decerpatur. Sed contrarium probant sequentia 1. quod etiam mutili infantes perfectos generent. 2. quod per solam imaginationem interdum integræ partes auferantur, aut aliæ atque superflue earum loco generentur.

§. 7. Nec etiam à *Lewenhokii* ejusque asseclarum, partibus stare possum, qui inauditam hactenus opinionem produxit , statuens in semine virili ingentem minutissimorum vermiculorum contineri copiam, eamque tantam esse, ut unico coitu ultra decem horum vermiculorum millia in matricem excernantur : hos tamen omnes in Naturæ arvo mortem invenire, unico tamen excepto , quem certo & unico uteri puncto applicatum, sensim ope nutritionis incrementa capere vult. Sed quivis rem accuratius examinans facile percipiet, quam misera hæc sit hypothesis, & hinc etiam, vermes hosce longè minori difficultate in Inventorum cerebris, quam in semine masculino reperiri posse, facile concedet.

§. 8. De semine adhuc notandum est, eo vitæ cursu, quo semen generari incipit , insigni robur corpori accedere & corpus notabiliter alterari. E. contra quando in castratione testes excinduntur & sic seminis generatio præcaveatur, notabilis non Solum sequitur corporis debilitas, sed etiam vox acuta non mutatur, & im-



berbes evadunt. Idem contingit etiam in bobus castratis, quos tauri gregarii robore longè superant: imò caro ipsa castratorum & integrorum quoad saporem maximè differt.

§. 9. Præter semen verum, de quo hætenus dictum est, alius adhuc datur *liquor*, qui in *glandulis prostaticis* secretus, cum semine tempore coitus excernitur & involucrum sive vehiculum semini vero præbet. Cum hocce prostaticarum liquore convenit etiam ille, quem femina in coitu cum delectatione emittunt: hunc vulgo ad conceptionem nihil, sed tantum ad lubricandam vaginam facere volunt. Sed cum tanta cum delectatione liquorem huncce emittant femina, & in puncto emissionis parva quædam quasi convulsio eas corripiat, probabilis mihi videtur, liquorem huncce exaltare semen masculinum, ut cum liquore dicto junctum eò facilius in uterum penetrare & ovula fecundare possit. Plura de hac re vid. infra de *Generatione*.

## PUNCTUM V.

De

### *Salivæ Secretione.*

#### §. I.

**S**aliva quamvis à Veteribus pro liquore simpliciter excrementitio habita fuerit, non infimum tamen inter corporis liquores utiles meretur locum, quippe quæ ciborum solutioni, deglu-

deglutioni & linguæ volubilitati conservandæ maxime infervit.

§. 2. Fontes ejus diversi sunt, eorumque quidam in ipsa oris cavitate, alii verò extra eam reperiuntur. In ore sunt *glandulæ buccarum, sublinguales, palatinæ, tonsillæ*. Quæ vero extra oris cavitatem sitæ sunt glandulæ, duplicis sunt generis, *aliæ* enim solum propter salivam sunt conditæ, uti sunt *maxillares internæ & parotides*: *aliæ* verò aliis prius usibus destinatæ sunt, & deindè tandem per proprios canales, uti priores salivam sive lympham salivalem ad oris cavitatem effundunt, quales sunt glandulæ oculorum & narium.

§. 3. Prouti autem glandulæ salivam fecernentes diversæ sunt, ita quoque ipsam salivam pro glandularum diversitate diversam esse experientia demonstrat: quæ enim è glandulis sublingualibus, maxillaribus & parotidibus fluit, fluidior est: minori fluiditate gaudet lymphæ glandularum buccarum, spissior verò est quæ ex tonsillis emergit. vid. Dn. D. *Stablii Theor. Med. Part. I. p. 127.* quæ verò ex glandulis oculorum, narium, & aurium fluit saliva, excrementitia potius videtur, quam ut verum salivalem habeat usum. Commodè E. hoc loco salivæ & sputi divisio adhiberi potest: ut salivæ scilicet nomine lymphæ limpida & utilis: sputi vero nomine excrementitia, vel ex ore ejicienda, vel deglutita per anum excernenda, veniat.

§. 4. Partes salivæ constituentes quod concernit, sunt æ aquosæ, salinæ & gelatinosæ: aquosæ tamen reliquas quantitate superant, ita ut salivæ uncia una vix grana salis tria in se contineat; undè etiam, quoniam sal hocce, etsi admodum acre, à magna aquæ copia dilutum est, nullus manifestus in saliva deprehenditur: sapor.

§. 5. Quamvis autem salivæ fluxus in oris cavitatem sit perpetuus, major tamen copia tempore masticationis affluit: cujus quidem rei causam vulgò à motu maxillarum derivant, quod scil. ob earundem motum glandulæ compressæ majorem salivæ copiam fundere cogantur: quæ ratio etsi non adeò sit contemnenda, potior tamen mihi videtur eorum sententia, qui id exinde fieri existimant, quod tempore masticationis ad diluendos & solvendos cibos major requiratur salivæ quantitas, hinc etiam Naturam, corporis præsidem, majorem salivæ copiam ad oris cavitatem mittere: nec etiam motum maxillarum ad experimendam salivam à glandulis semper necessariam esse, sed salivam sæpius, audito saltem grati ferculi nomine, magna copia in os infundi, manifesto indicio salivam propter certum finem à Principio corporis vitali ad oris cavitatem mitti.

§. 6. A saliva parum vel nihil differunt humores è glandulis œsophagi, Ventriculi, intestinorum & è ductu pancreatico profluentes, omnes enim ciborum solutioni & dilutioni in-  
servire



servire, inferius, ubi de Alimentorum præparatione sermo erit, declarabo.

## PUNCTUM VI.

De

*Secretione Humoris aquei &  
lymphæ oculos irrigantis,*

§. I.

**H**Umorem aquosum in oculo contineri & ad rotunditatem ejus facere, superius Cap. 2. §. 20. dictum fuit, undè autem originem trahat, aliquo modo obscurum est, licet certissimum sit eam continuo restitui: quod potissimum post Cataractæ depositionem observari potest, ubi, dum oculus perfoditur, humor aqueus effluit, & paucò tamen temporis spatio restituitur.

§. 2. Existimavit quidem *Nuckius* eum per peculiare ductus aquosus semper restitui; *Bergerus* tamen, ductus istos potius arteriolas à ramulis carotidis ortas esse probat. *Constat enim*, inquit, non uno experimento, facta oculi, intra orbitam animantis vivi adhuc constituti sectione, ablatisq; humoribus una cum tunica uvea, & retina, scleroticam pluribus foraminulis pertusam apparere, immissumq; per ea liquorem, prædictos arteriarum surculos, quos pro ductibus aquosis habuit *Nuckius*, ipsasque arterias subire. Ad hæc oculum observamus, nunc subsidere, corrugari & contrahi, modo plus æquo dila-

dilatari & tumere, prout filo constricta, vel arteria carotis, cujus ramus ad oculum tendit, vel vena jugularis externa fuerit. Nam modo priore affluxus humoris ad oculum intercipitur, altero autem refluxus ejus cohibetur, unde deficiens humor vel redundans illam oculo mutationem affert.

§. 3. Probabile E. videtur, portionem lymphæ subtiliorem & maximè aquosam transsudare ex poris arteriarum tunicæ scleroticæ & choroideæ in cavitatem oculi; portionem verò humoris aquei sensim sensimque partim per poros venarum aut vasorum lymphaticorum recipi in vasa, partim vero per subtiles corneæ poros exhalare. vid. *Berg. Physiol. p. 240.* Falso igitur *Burrhus*, se artis ope humorem huncce restituere, gloriatus est, cum ex jam allatis constet, Naturam solam restitutionis hujus esse authorem.

§. 4. Exterius inter oculum & palpebras continuo quoque secernitur humor quidam, humectandis & irrigandis oculis inserviens. Secernitur autem per duas glandulas, quarum minor, *caruncula lacrymalis* dicta, in cantho majori sive interno sita est; altera verò, nomine carens & major in cantho oculi externo. Liquor in hisce secretus, superfluous, fluit per puncta lacrymalia, ad nares & deinde ad palatum: Sin verò per eadem commodè fluere nequit, concrescit in guttas & sub lacrymarum nomine per genas destillat.

## PUNCTUM VII.

De

*Aqua Pericardii Secretione.*

§. I.

**Q**Uamvis aqua pericardii respectu aliorum humorum minoris forsan videri possit considerationis, non parum tamen inter Physiologos disputatum fuit, an detur? unde proveniat? & quinam ejus sit usus? & sic respectu harum questionum variis controversiis ansam dedit.

§. 2. Existentiam ejus quod concernit, etsi ferè semper ab omnibus concessa fuerit, Bohnius tamen *Circ. Anat.* p. 323. expressis verbis eam negat: *Fabulantur, inquit, multa de usu aquæ in capsula cordis stagnante, dum eorum alii cordi refrigerio existere, alii hujus calorem intendere, alii motum juvare, illam sibi fingunt, nemo tamen unquam de illius existentia dubitavit, nisi quod in hydropicis & hecticis copiam ejus majorem testentur omnes, qui morbis defunctorum cadavera secuerunt. Uno verbo, nulla est, & si reperiatur, aut morbo, aut mortis generi suam scaturiginem debet: si nimirum alterutrum aut utrumq; horum tale extiterit, quod circulationem ad tempus turbet, & ejusmodi violentam ac præternaturalem seri transudationem atque congestionem præsiet: unde in decolatis aut simili velocissimo mortis genere creptis, alias verò sanis, sæpè ne*  
gutta-



*guttula quidem cernitur.* Pauci tamen hæcenus fuerunt, qui *Bohno* assentiri voluerunt, quatenus & vivorum & mortuorum sectio aquæ hujus continuam præsentiam satis superque demonstrat.

§. 3. Quantitas hujus humoris respectu subjectorum differt, in aliis enim vix drachma, in aliis verò drachmæ sex & amplius repertæ fuere. vid. *Verheyen Supplem. Anat.* p. 108. Colorem ejusdem quod concernit, quamvis vulgò instar loturæ tantum carniū esse statuatur, flavum tamen potius sive leni tantum flavedine tinctum esse idem *Verheyen* l. c. aliquot observationibus probat.

§. 4. Undè proveniat, & ubi elaboretur: aqua pericardii, variæ quidem Authorum sunt: opiniones, præ omnibus tamen aliis mihi aridet sententia *Bergeri* ex *Malpighio*, eam scil. secer- ni per acinos glandulosos, interiori pericardii parti adnatos & sensim sensimque in pericardii cavitatem effundi.

§. 5. Quemnam usum habeat, pariter dubium est, probabile tamen videtur, aquam pericardii & cor & pericardium ipsum humectare, & simul coalitum cordis & pericardii impedire, ac hoc ipso efficere, ut cor eò liberius in capsula sua moveri queat.

## PUNCTUM VIII.

De

*Transpiratione insensibili &**Sudoris Secretione.*

## §. 1.

Nulla secretio est universalis, publicumque habet usum ea sane est, quæ per habitum corporis, & vulgo in insensibilem & sensibilem distinguitur: quarum illa est, si serum halituosum ad peripheriam corporis latum, sub specie insensibilis vaporis, sive udoris, uti quidam loqui amant, corpore excernitur: illa verò, si idem serum majori copia secretum in guttas visibiles abit. hæc ipsa autem transpiratio adeò est copiosa, ut, Sanctorio fides est adhibenda, plus una die per antrum excernatur, quam quindecim diebus per alvum & urinam.

§. 2. Organon hujus secretionis sunt *mandulæ miliares* subcutaneæ, *stemonianæ* ab Inventore dictæ, quæ *reti cutis vasculoso*, ex arteriis, nervis & fibrillis subjectorum musculorum tendineis constructo, interjectæ sunt, ac secretum liquorem per poros cutis emittunt. Porri hi à lamellis cuticulæ incurvis teguntur aliquo modo, ut ipsis loco valvularum sint, & effluxum sudoris aliquo modo impediunt: magis tamen adhuc feri exitum moderantur fibrillæ cutis, quippe quæ constrictæ poros

ros contrahendo sudoris effluxum refranant, relaxata vero copioso effluxui portam pandunt, adeoque manifestum motus tonici, constrictorii & relaxatorii, humorum motus varie dirigentis iudicium nobis exhibent. Hujus constrictionis exemplum videmus tempore hyberno, ubi ob frigus externum constrictis fibrillis, cutis pori protuberant, & cutis cuti anseris depumati similis redditur: humores autem magis versus interiora moventur, ita quidem ut secretiones in interioribus partibus, inprimis vero in renibus, longe felicius succedant: cum è contra tempore æstivo, ob calorem relaxata cuti, pori sint ampliores & transpiratio per cutim tam insensibilis quam sensibilis longe sit maior. Et ob hanc ipsam majorem vel minorem strictionem pororum, respectu temperamentorum, homines etiam magis vel minus proni sunt ad sudorem: ita e.g. Sanguinei & Phlegmatici ob fibrarum laxitatem magis ad sudorem dispositi sunt quam Cholericæ & Melancholici.

§. 3. *Materia Sudoris est serum sanguinis halituosum*, multis particulis *Salinis & Sulphureis* subtilibus repletum, quod in corpore ob continuum motum tam progressivum & intestinum quam voluntarium quoque continuo generatur: *aqua* scil. in *vaporem* seu halitum res solvitur, terræ portio in *Sal* mutatur, hoc verò cum partibus sanguinis pinguibus in *Sal volatile oleaginosum*, olidum & inflammabile abit. vid.

Dna



Dn. D *Stahl de Mixti & Vivi differentia* p. 13.  
 Quæ partes omnes, cum ob subtilitatem suam  
 ad corporis conservationem non amplius aptæ,  
 sed potius ad nocendum magis pronæ sint,  
 necessario è corpore expelli debent. Undè  
 etiam ii, quorum corpora talibus partibus reple-  
 ta sunt, vel post lenissimum motum vel etiam  
 spontè interdum sudores copiosos patiuntur :  
 imprimis autem, teste experientia, non pauci dan-  
 tur, qui ferè singulis noctibus sudoribus copio-  
 sis corripuntur, id quod etiam *Pechlinus* obser-  
 vavit *L. I. obs. 68.* Vidi, inquit, omnis generis corpo-  
 ra, crassa, obesula, strigosa, macra, quæ perpetuis de-  
 luerent sudoribus, & in æstate quidem diu & noctu,  
 yeme vero noctu tantum, morante diurnam seri glan-  
 dularis secretionem frigore externo. Neq; jam mo-  
 dicus ille sudor est, sed copiosus, & qui plerumq; statim  
 est distributos in venas cibos occasione fermentan-  
 tis chyli obortus interulas, vestimenta & quicquid in  
 perimentum corporis venit, planè humectat, ita ut sin-  
 gulis horis matutinis mutare vestes necesse habeant,  
 quibus ea res in consuetudinem transiit.

§. 4. *Causa efficiens* Sudoris est ipsa *Natu-*  
*ra* humana sive principium motus in corpo-  
 re: cum enim corpus quotidie alimentis, mul-  
 tis partibus impuris adhuc imprægnatis, nutria-  
 tur, per motum verò multæ partes alias lauda-  
 biles ita attenuentur, ut conservationi corpo-  
 ris amplius inservire nequeant, necesse est, ut è  
 corpore continuo expellantur. Hunc in finem  
 natura duobus utitur instrumentis, *pulsu cordis*

& *motu cutis tonico* : per illum sanguis , non solum per viscera, sed & per porosam partium substantiam continuo trajectus & subtilis redditus , ad cutim propellitur , ubi per glandulas serum superfluum halituosum secernitur , & per cutis poros , à motu tonico modo strictiores, modo laxiores redditos, excernitur. Non autem per poros tantum majores , sed & alios minores continuo fit transpiratio : imò in partibus quoque interioribus talis quoque feri contingit secretio per earundem poros , undè etiam continuo madent viscera & membranæ quavis : & ipsa quoque excrementa , in certis receptaculis ad excretionis usque tempus asservata, spissiora evadunt , quoniam aquositas per poros partium ambientium exhalat , exempli loco possunt esse bilis cystica, mucus & feces alvi.

§. 5. *Ulus E. transpirationis* summus est, quatenus corpus à multis particulis superfluis & noxiis liberatur, quæ, si in corpore retinerentur , magnum damnum visceribus inferre possent : quare etiam omni studio ea est promovenda , nec sudor etiam si largissimus facile est cohibendus. Utilitatem autem sudoris potissimum experinuntur ii, qui sudoribus spontaneis affluti sunt, tantum enim abest, ut exindè aliquid incommodi sentiant , ut potius summam in omnibus membris levitatem persentiscant : cum è contra, si vel sponte, vel ob admissum frigus, cessent hi sudores, statim audiantur querelæ de gravitate membrorum, respiratione dif-

facili

ficili & insigni totius corporis torpore : imò hoc ipso corpora non solum ad Hecticam , sed & ad Oedemata & Anasarcam disponuntur ; quare ad hæc mala præcavenda, sudores hujusmodi Critici artis ope revocandi sunt. Ex quo apparet, (ut verbis Pechlini l. c. utar) *quam provida & studiosa sui Natura morbis aliis in aliorum propulsationem utatur, unoq; incommodo alteri succurrat.* De Sudoribus hisce spontaneis vid. *Dn. D. Stablii Dissert. de Autocratia Natura* p. 16.

## PUNCTUM IX.

De

*Secretione & Excretionem**Urinæ.*

## §. 1.

Quamvis urina quoad elementa, aquam scil. sal & sulphuream substantiam cum sudore maxime conveniat, in eò tamen ab eo differt, quod partes urinæ sint aliquomodo crassiores & magis mucoſæ. Interim tamen duæ hæ feri Secretiones & Excretiones in eo quam maxime conveniunt, quod imminuta transpiratione, urinæ secretio facilius procedat, & partes excrementitiæ, quæ alias per cutim excerni solebant, jam per renes excernantur, quare etiam non inepte *urina à quibusdam enim sudor* appellatur.



§. 2. Et hac ipsa partium miscela oritur  
 urina plus vel minus tincta, plerumque tamen  
*citrini coloris* est: nonnunquam tamen post lar-  
 gorem potum limpida atque minus tincta eva-  
 dit: undè etiam quorundam distinctio inter  
*urinam potus & sanguinis* nata est: & hinc etiam  
 relicta via humorum regia, peculiare viæ pro  
 urina potus qualitate fuerunt: alii enim potum  
 per poros ventriculi exhalare, in vesicam intra-  
 re, ibidemque in urinam condensari: alii verò  
 per peculiare ductus potum à primis viis ad  
 vesicam ferri voluerunt. Sed cum viæ hæ pe-  
 culiæres nondum demonstrari potuerint, & ex-  
 halatio ista per poros ventriculi & in vesicam  
 receptio nimis longum requirat tempus, rectius  
 via humorum regia retinetur, & urinæ secretio  
 solis renibus relinquitur. Cum enim in Massa  
 sanguinea semper proportionata seri & lymphæ  
 deprehendatur quantitas, facile concipi potest,  
 si major potus quantitas assumitur, serum san-  
 guinis quoque augeri & maiorem ad renes  
 quoque fieri impetum, quam necessario ube-  
 rior seri excretio sequi debet: hoc enim si non  
 contingeret, humores vitales & imprimis lym-  
 pha, nimis diluerentur, tonus partium labefa-  
 ctaretur ac corpus humoribus serosis nimis  
 gravaretur, quare ad incommoda hæc præ-  
 cavenda, à Natura motus renum tonicus ali-  
 quo modo relaxatur: & cum ob hoc ipsum  
 non solum major postmodum fiat impetus, &  
 pori etiam ob relaxationem sint majores, ne-  
 cessario

cessario quoque major urinæ secretio sequitur. Quare autem minus tincta appareat hæc urina, ratio hæc est, quod à copiosiore potu partes urinam tingentes nimis diluantur, cum tamen inter tingens & tingendum perpetua debeat esse proportio: cui addi potest, quod propter celeriore excretionem & laxiorem cum Massa sanguinea cohesionem partes alias urinam tingentes imbiberè nequeat.

§ 3. Ipsi autem renes, qui hujus secretionis sunt organum, affabre admodum constructi sunt, arteria enim emulgens in plures minores ramulos divisa per totam renum substantiam dispergitur, & ejusapices ad extimam renum regionem tendentes, in parvas glebas, quas alii glandulas vocant, abeunt, à quibus tubuli quamplurimi oriuntur, qui ab exteriori renum parte versus interiorem sive ad *pelvim* tendunt, serumque ab arteriis receptum urinarum in eam infundunt: reliquum verò sanguinis, à furculis venæ emulgentis receptum, per hanc ad venam cavam fluit.

§. 4. Hanc autem urinæ secretionem, uti jam antea monitum fuit, admodum moderatur motus tonicus, hic enim si interdum remittit, non solum magna urinæ limpida, sed etiam contentorum copia simul excernitur & ad vasis urinarii fundum deponitur: ubi verò intenditur & nimis stringuntur vasa, urina admodum limpida & aquosa redditur: quale quid sæpius experiuntur nephritici, in hisce enim instantis

paroxyſmi index eſt urina tenuis & aquoſa, quoniam ad expellendum calculum vel materiam ſabuloſam è renibus tonus eorum ultra modum intenditur, ita ut propter fibrarum conſtrictionem pori anguſtiores redditi, non niſi tenuiori ſero tranſitum concedere queant. Simile quid etiam contingit in febris acutis, ubi ob conſtrictionem viſcerum infimi ventris, & imprimis renum, ſanguinis fluxus verſus inferiora notabiliter impeditur, ita ut neceſſariò majori copia ad ſuperiora ferri cogatur: unde ob nimiam in renibus pororum ſtricturam non niſi aquoſiores particulæ relictis in maſſa ſanguinea craſſioribus, ſecerni queunt.

§. 5. Ipſa autem urinæ ſecretio neque fit per *fermentationem* à peculiari fermento renibus inhærente productam, neque per fuſionem, neque per putrefactionem aut præcipitationem, ſed ſolùm per tranſcolationem ex ramis arteriæ emulgentibus in ductus urinarios ad pelvim omnes tendentes. Cum verò pelvis capacitas admodum ſit exigua, & ita pauca urinæ quantitas in eaſdem aſſervari queat, ex hac ſtatim per ureteres ad veſicam tranſit, in eaque ad excretionis uſque tempus aſſervatur. Ne verò ad renes regurgitare queat, duplicem obicem poſuit Natura, valvulam ſcil. in ureterum principio & membranarum veſicæ duplicaturam: interior enim membrana ureteres obliquè tegit & claudit.



§. 6. Quod urinæ excretionem concernit, est ea mere quidem voluntaria, urina tamen ordinariè & quantitate & qualitate stimulat, fuitque excretionem postulat: quantitate quidem, quoniam fibræ vesicæ ultra modum distenduntur, & sic molestus quidam sensus oritur: quantitate verò, si urina interdum admodum acris sit, ita quidem, ut, mucosæ vesicæ abraso, continuò excretionem stimulet: unde etiam ad hoc incommodum avertendum vesica interius mucosissimo continuo obducta est. Vi autem peragenda est hæc excretio, cum enim collum vesicæ arctissimè claudatur musculo circulari, sphinctere dicto, cohibitione spiritus & pressione pus est, qua compressione contingit, ut, coagente vesicæ tunica fibrosa, urina, dilatata sic sphinctere, cum impetu profiliat; nisi forsan urethra nimis flaccida sit, sic enim tanto impetu prorumpere equit urina, id quod plerumque in senibus & meritis contingit.

§. 7. Usus hujus secretionis & excretionis maximus est, quatenus partes salinæ superuæ cum sero è corpore excernuntur, & ab iis metuenda mala præcaventur: unde etiam urina eorum, qui cibis salis abutuntur longè crior est: imò si nutrices nimis indulgent cibis salis, infantes non solum multum & frequenter mingunt, sed etiam urina acris primò dolore cutim afficit, ac tandem prorsus arrodit. Deindè etiam notandum est, ea, quæ in se continent oleum acre, magnam habere in vias uri-

narias potentiam, undè *juniperina*, *terebinthinata*, *Oleum destillatum succini* aliaque non tantum urinæ secretionem augent, sed etiam odorem violaceum urinæ conciliat.

## PUNCTUM X.

De

### *Secretione Bilis.*

#### §. I.

**B**ilem quidem vulgo humoribus corporis laudabilibus annumerant, eique singularem vim balsamicam chylum & humores à putredine præservandi adscribunt. Sed si rem exactius consideramus, non pauca occurrunt, quæ dubiam reddere possunt hanc communem sententiam. Nam 1. chylus nulla prorsus flavedine vel amaritie imbuitur, cum tamen minutissima bilis portio liquoribus admixta eis & flavedinem & amaritiem conciliet. 2. Certissimum est & experientia quotidiana constat, bilem in Massa sanguinea retentam magnas excitare turbas & communiter icterum flavum atque nigrum producere. 3. Pariter experientia firmissimè demonstrat, quasvis bilis effusiones, ab ira aliisque causis excitatas, excipere diarrhœam, aut si hæc non contingit, bilem regurgitare ad Ventriculum ibidemque excitare graves anxietates, nauseam, vomitum, aut, hoc non succedente, febres biliosas ardentes, cum

inte-

intestinorum & imprimis duodeni inflammatione plerumque conjunctas, vel etiam alias intermittentes & acutas : quod tamen minimè contingere deberet, si bilis humor esset adeò laudabilis. Sed respondent hic nonnulli distinguendum esse inter bilem subtiliorem laudabilem & excrementitiam : illam ingredi cum chylo per vasa lactea in Massam sanguineam, eamque à spissescencia alii,que corruptelis præservare : hanc verò ceu inutilem cum excrementis continuò secerni. Sed cum 1. talis bilis diversitas hæctenus non nisi verbis demonstrata fuerit, nec etiam 2. locus ubi talis bilis elaboretur, monstrari queat, & 3. omni bili & semper conveniat esse flavam & amaram, ego sanè comprehendere nequeo, quomodo bilis chylo misceri eidemque tamen neque amaritiam neque flavedinem imprimere queat. Et quod deindè vim bilis balsamicam attinet, ea nondum adeò firmiter probata est : nam si bilis vi sua balsamica avertere posset mucidam spissescenciam, virgines, chlorosi laborantes (quoniam bilis præsentiam color flavescens satis superque probat) cachexiam nunquam incurrerent, cum tamen contrarium experientia quotidiana probet, quod scil. *cachexia*, *oedemata* & *anasarca* chlorosin sequantur, quod tamen minimè fieri deberet, si bilis tantam haberet vim balsamicam.

§. 2. Potius E. omnis bilis, respectu humorum vitalium, censenda est excrementitia, quæ tamen hoc non obstante singularem adhuc



hucusum edit in intestinis, dum ea ad fecum excretionem acredine sua stimulat, sicque rectissime à quibusdam *Clyster naturalis* vocatur: ut enim clysteres ano injecti, ita & bilis ex hepate & folliculo in intestina effusa eadem stimulat. Imò ipsa quoque animalium bilis clysteribus admixta fortiter admodum alvum movet, & cum purgantibus exterius abdomini illita, infantes & debiles purgat: hinc etiam facile liquet, quare icterici & cachectici ferè semper alvi obstructione laborent, & ictericorum excrementa albicantia vel minus tincta appareant; quoniam scilicet ob cessantem bilis ad intestina fluxum, feces neque tingi, nec intestina stimulari possunt.

§. 3. *Principia* bilis quod concernit, ea sunt aqua, oleum ac sal, aqua tamen reliquas partes quantitate superat: mixtio autem respectu temperamentorum non est æqualis, undè etiam bilis diversitas sequitur, ita ut in cholericis majorem habeat acrimoniam, quam in phlegmaticis & sanguineis, quatenus in hisce ultimis oleosa & salina partes majori aquæ copia dilutæ sunt, cum è contra in cholericorum corporibus parva, respectu sanguineorum, sit aquæ quantitas.

§. 4. Organon bilis secretioni inserviens est *Hepar*, viscus infimi ventris in dextro hypochondrio situm, & ex ramificationibus *venæ portæ, cavæ, arteriæ hepaticæ, ductibusque bilariis* potissimum compositum, quibus *nervi* atque *vasa lymphatica* addi merentur. Hæc autem vasa

com-

ommodè dividuntur in *adducentia* & *revehencia*: illa sunt *vena portæ*, *arteria hepatica* & *nervi*: hæc verò *vena cava*, *ductus biliarii* & *vasa lymphatica*. Singulæ verò diverso munere gaudent, *vena portæ* scil. sanguinem *bilis secretioni*, *arteria nutritioni* inservientem advehit, *liquidum* verò *nervorum* communicant *nervi*: *sanguinem* residuum *vena cava*, *bilem* secretam *ductus biliarii*, *lympham* copiosam *vasa lymphatica* recipiunt.

§. 5. Nullas tamen in viscere hoc facta diligentiori inquisitione glandulas reperire potuit *Bergerus Physiol.* p. 118. quas communiter secretionis organum esse statuerunt Physiologi; quare iisdem poros *venæ portæ* ceu verum organum secretionis substituit. Quicquid sit, de hisce differentibus opinionibus, sufficit Medico bilem ex sanguine *venæ portæ* in hepate, sive per glandulas sive per analogon glandularum, decerni & in ductus biliarios minores ac ex hisce majores infundi.

§. 6. Quo verò hæcce secretio eò felicius procedat, socium hepati junctum est viscus, *lien* scil. ut in hoc sanguis, per arteriam caparem affluens, ita disponatur, quo eò facilius biliosas dimittere particulas, reliquumque, cui postmodum miscetur, *venæ portæ* cruorem, pari modo disponere queat. Hanc autem faciliorem successionem adjuvat potissimum *capsula lienis* vasa ambiens; hæc enim cum fibrola sit, sanguinem per lienem fluentem conquassat, & sic biliosas particulas, gelatinosis immerfas, ab earum

earum compedibus liberat : undè etiam propter hanc conquaſſationem ſanguinem , è liene ad hepar tendentem , fluxiliorem & floridiorem eſſe Authores teſtantur. Ne vero copioſa lymphæ bilis ſecretionem impediatur , copioſiſſima , in hepate pariter ac liene conſpicua vaſa lymphatica eam excipiunt , & ad loca convenientia revehunt. Similis quoque capsula , fibris motricibus inſtructa , vaſaque ambiens reperitur in hepate : cum enim vena portæ valvulis , venis aliis propriis , deſtituatur , nullumque , cum arteriæ officio fungi debeat , uti arteriæ habeat motorem ; neceſſario talis capsula fibroſa requiritur , ut hujus contractione ſanguis eò facilius diſtribuat.

§. 7. Bilis in hepate ſecreta , partim immediate ad inteſtina , comune craſſiorum excrementorum receptaculum , partim verò ad veſiculam felleam per peculiare ductus , *cysthepaticos* dictos , fluit , ut convenienti tempore in inteſtinorum quoque cavitatem excernatur. Hanc tamen utramque , hepaticam ſcil. & cyſticam , bilem notabilis intercedit differentia , & quidem

1. *ratione coloris* : cyſtica enim magis eſt coloris ſaturati , quam hepatica.
2. *ratione acrimoniæ* : qua bilis hepatica cyſticæ cedit.
3. *ratione conſiſtentiae* : qua cyſtica hepaticam ſuperat.
4. *ratione fluxus* : hepatica enim continuo ad inteſtina fluit , cyſtica verò per vices.

Ratio autem , quare cyſtica bilis non ſemper ad inteſtina fluit , hæc eſſe videtur : ne acrimonia ſua inteſtina velli-



vellicando continuam excitet diarrhœam, hinc eo tantum tempore ad intestina fluit, quo Ventriculus alimentis repletus est, quo horum ope acrimonia nimia occultetur, & vicissim bilis auxilio excrementorum saburra è corpore promoveatur.

## PUNCTUM XI.

De

### *Secretione & Excretionem fecum alvinarum.*

#### §. I.

**C**rassissima omnium excrementorum sunt ea, quæ per alvum ejiciuntur: hæc magnam quidem partem ex partibus crassioribus assumptorum ad nutritionem ineptis constant; laudabilis enim & nutritia portio in vasa lactea recipitur, uti inferius audiemus: multæ tamen hisce aliæ particule excrementitiæ, tam biliosæ quam serosæ & mucosæ, quæ ad intestina quotidie deponuntur, admixtæ sunt.

§. 2. Excrementa autem alvi ex aliis quoque partibus excrementitiis constare exindè potissimum apparere potest 1. quod continuo ad intestina bilis, succus pancreaticus, liquor glandularum miliarium, saliva & sputum deglutitum aliæque excrementitiæ partes deponantur. 2. quod ægrotantes alique à cibis abstinentes nihilominus feces alvinas deponant: quod fieri

ri non posset, si ab assumptis tantum alimentiss  
excrementa provenirent.

§. 3. *Causa excretionis* fecum alvinarum  
est *motus peristalticus* intestinorum; quam alii ver-  
micularem quoque vocant: est autem ille nil-  
nisi sensibilis quædam intestinorum coarcta-  
tio, cujus ope contenta sensim sensimque pro-  
moventur. Incipit hic motus in ipso jam  
Ventriculo & continuatur ad anum usque: in  
statu sano spatio 24. horarum plerumque absol-  
vitur per totum intestinorum tractum, & excre-  
menta hinc excernuntur: ex quo apparet, mo-  
tum huncce admodum esse moderatum. Con-  
suetudo tamen & hic aliquid valet, dantur  
enim, in quibus alternis tantum diebus excretio  
contingit, in aliis motus peristalticus bis absol-  
vitur, & sic etiam alvum bis deponunt, in aliis  
pluribus vicibus id contingit: ita notus est  
mihi vir 30. circiter annorum, qui sæpius de-  
cies alvum deponit, inprimis si cibos difficilio-  
ris digestionis aut magnam ciborum quantita-  
tem assumsit: sentit enim statim aliqualem,  
sed levem tamen præcordiorum pressionem,  
quam statim postea dejectiones excipiunt ma-  
ximam partem aquosæ: quoad cætera tamen  
sanus, vegetus & optimi corporis habitus est.  
Promovent quoque fecum excretionem motus  
corporis moderatus & sufficiens ciborum dilu-  
tio: quare, qui sufficienti copia potum assu-  
munt & corpus moderato motu exercent, alvi  
obstructionibus parum obnoxii sunt, cum ex

con-

contra desidiosi & vitæ sedentariæ dediti ac qui rarius bibunt, eas frequentissimè experiantur. Pertinet huc etiam neglectio stimuli, si scil. stimulantibus excrementis & excretionem urgentibus, nihilominus excretio negligitur, facile postmodum alvi obstructiones sequuntur.

§. 4. *Consistentiam* crassiores acquirunt excrementa, dum non solum laudabiles & nutritiæ particulae vasa lactea ingrediuntur, sed & aliæ humidæ, diutius in intestinorum cavitate hærentibus excrementis, sensim in propiores vias recipiuntur, & cum sint excrementitiæ, postmodum per alia colatoria secernuntur & excernuntur.

§. 5. Peculiarem quoque acquirunt *fæto-*  
*rem* excrementa alvina, qui tamen purè putredinosus non est, putredo enim in statu naturali locum nunquam habet. Fætor hic in diversis animalibus diversus est, ita ut, licet diversa animalia uno eodemque cibo utantur, diversum nihilominus exindè excrementa acquirant fæto-  
rem. Cujus diversitatis nulla alia est causa quam bilis: uti enim hæc, continuo ad intestina ex hepate, & per vices ex folliculo fluens, diversæ respectu animalium est naturæ: ita quoque differentem excrementa indè nanciscuntur fæto-  
rem ac colorem. *Colorem luteum* excrementorum in homine à bile esse, ex superioribus, ubi de bile actum fuit, jam constat: si enim bilis admixtio impeditur, excrementa minimè tincta, sed albicantia apparent. Fæto-  
M rem



rem E. & colorem non opus est, ut à fermento stercorifico cum Helmontio arcessamus, quid enim de fermentis hisce sentiendum sit, ex superioribus constare potest.

§. 6. De fœtore adhuc notandum est, quod pro assumptorum varietate maximè variet: ita *alliacea*, *cepæ*, *raphani*, *caseus*, *cerevisia* &c. magnum & penetrantem admodum excrementiss conciliant fœtorem: cum è contra cibi evchymici tale quid prorsus non efficiant: nunquam tamen, etsi fœtor sit teterrimus, absolutè putredinosus est: si verò talis in morbis acutis cum diarrhœa conjunctis, in dysenteriis & diarrhœa Phthisicorum colliquativa observatur, plerumque funestum est signum.

§. 7. Ipsa excrementa dum motus peristaltici ope per longissime extensa intestina tenuia, ac cellulosam coli cavitatem ad intestinum rectum pelluntur, recto gradu ad anum usque progrediuntur, sui que exitum postulant: sed cum hic sphinctere sive musculo circulari arctissime clausus sit, qui non nisi adhibita aliqua vi aperitur, compressione, spiritusque retentione opus est: undè dilatato diaphragmate, visceribusque infimi ventris versus rectum urgentibus intestinum, *sphincter* ani, vi hacce apertus, excrementis exitum concedit: quæ etsi actu putrida non sint, cum tamen summam ac putredinem habeant aptitudinem, eam postmodum promptissimè subeunt: anum verò in pristinum locum duo *ani levatores* restitunt.

PUNCTUM

## PUNCTUM, XII.

De

*Muci, aliarumque sordium**Secretione & Excretionē.*

## §. I.

**P**Ræter hæc recensita excrementa dantur adhuc alia, quæ diversis in partibus secernuntur, inter quæ primum locum occupat *mucus* variarum partium, qui etsi pure sit excrementitius, usum nihilominus singularem multis adhuc præstat partibus: id quod manifestè, videmus in *intestinis* & *vesica*; teguntur enim hæ partes internè semper mucō quodam, ne scilicet rebus contentis facilè lædantur: undè abraso Ventriculi & intestinorum mucō assumpta insignes molestias creant. Contingit talis abrasio post assumpta purgantia fortiora, ut. & in alvi fluxibus variis: unde propter intestinorum fibrarum nimiam sensibilitatem contenta citò & sæpius indigesta externuntur. Hic mucus quoque bilem acrem ad intestina fluentem admodum temperat, intestinaque defendit, quo minus ea aggredi & lædere queat.

§. 2. Pari modo se res habet in *Vesica*, hæc enim mucō perpetuo obducta est, ne scilicet urinæ acredo vesicam ad continuam excretionem stimulare possit: undè si salia nimia in quantitate assumuntur, aut si cerevisia non be-

nè fermentata in corpore fermentescit & acridinem concipit, mucos abrafo, continuus ad mingendum stimulus cum dolore satis acri sequitur, uti, qui stranguria afficiuntur, satis superque experiuntur.

§. 3. Maximè quoque conspicua muciportio in naribus secernitur & excernitur; cuius secretionis organon est *membrana glandulosa*, quæ non solum nares, sed etiam sinus *Sphænoideos, Ethmoideos & Frontales* interius cingit, ex quibus secretus mucus ad nares fluit. Mucitamen-  
copia respectu temperamentorum & ætatum differt, unde phlegmatici & infantes, quoniam eorum humores serosi ad mucum magis inclinant, majorem mucicopiam è naribus emungunt, quam cholericici & adulti: quo purior enim est *Massa sanguinea* & à sero excrementitio liberata, eò minor quoque muciquantitas in naribus generatur. Per hancce membranam numerosissimæ distributæ sunt arteriolæ, quæ ad glandulas tendunt, ut ibidem materia mucosa separetur & sanguis eò fluxilior reddatur, quò postmodum in cerebro fluidum nerveum eò facilius secerni queat. Ex omnibus autem sinibus per breves ductus quos *vasa mucifera Vieussens Nevrol. cap. 16.* vocat, mucus secretus ad nares fluit. Non tamen hac ipsa crassiori forma, uti è naribus excernitur, è sanguine secernitur, sed liquidior est, postmodum tamen facilè ob moram spissitudinem aliquam acquirit. Et si autem sit excrementitius, duos  
tamen



tamen adhuc præstat usus, primò enim tunicam narium continuo emollit, ut eò commodius olfactui inservire possit: deindè verò, ut ab aëre continuo appellente non facilè lædatur.

§. 4. Multi crediderunt cum Veteribus omnem huncce mucum in cerebro secerni, & ad nares per *ossa cribrosa* ferri: undè etiam homines subtilioris ingenii homines *emunctæ naris* vocati fuere, quasi cerebrum ipsorum à mucocrassiore, subtiles cogitationes impediante, probè esset repurgatum. Sed falsum hoc esse exindè apparet, quod foramina singula occludantur filamentis nervorum olfactoriorum, per eadem foramina ad narium cavernulas transeuntibus cum ipsa dura matre, ossi cribrosæ applicata. Cui accedit quod glandulæ membranæ pituitariæ digitis pressæ mucum fundant. vid. *Verheyen Supplem Anat.* p. 117.

§. 6. In *meatu* quoque *auditorio* secernitur humor quidam spissior, quem, ob ceream quasi substantiam, *Cerumen aurium* vulgò vocant. Est autem Cerumen hocce pingue, unctuosum, flavum, saporis amaricantis, inflammabiles quoque secum vehens particulas, quod secernitur per glandulas in *meatu auditorio* sitas ovales & subluteas, ac est primò liquidum, postmodum autem sensim spissius redditur: imò interdum ita spissum levadit, ut totum meatum oppleat auditorium, ac hinc auditum maxime impediat. Usus ejus videtur esse, ut particulis suis unctuosus meatum auditorium ac

tympani membranam obliniat, ac sic impediat, ne aëre continuo ingrediente facilè lædatur. Alii dicunt visciditate sua impedire, ne animalcula meatum intrare, tympanumque lædere queant.

## PUNCTUM XIII.

De

### *Secretione & Excretionē*

*sanguinis menstrui.*

§. I.

**S**anguinem menstruum Medici vocant eum, quem quovis mense feminæ viro maturæ & adultæ per genitalia excernunt. Quare autem hic sanguis excernatur, diversæ Physicorum & Medicorum sunt sententiæ, dum alii lapsum primorum parentum, alii peculiarem fermentationem, alii alias allegant causas.

§. 2. Sed præ omnibus aliis magis probabilis mihi videtur, feminas ideò mensium pati fluxum, quod ad gerendum & alendum fœtum à Deo conditæ sint, & ideò etiam plus sanguinis obtinuerint: cum verò fœtum omnino tempore non alant, sanguis iste, ne corpori oneri fiat, è corpore excerni debet.

§. 3. Quare autem hæc excretio singulis mensibus contingat, variæ à Medicis allegantur causæ. Qui fermentorum doctrina imbuti sunt, dicunt, uterum perfectum singulis mensibus

bus fermentum ex Massa sanguinea colligere, idque ubi vires sufficientes acquisivit, fermentationem excitare in utero, & hinc sanguinem attenuatum per venas referatas in uteri cavitationem effluere & inde foras excerni. Sed cum fermenta in corpore non dari, superius jam probatum fuerit, meritò quoque hæc allegata fluxus mensium causa rejicitur. Majori cum probabilitate alii statuunt, lunam esse fluxus mensium causam, ideo quod phasēs lunæ ferè ordinariè sèquatur: ita quidem ut ab anno decimo quarto ad vigesimum usque menses circa novilunium, ab anno vigesimo ad trigessimum circa primam falcem, ad annum quadragessimum circa plenilunium, & tandem ad annum quadragessimum nonum circa ultimam falcem mensesfluant. Quæ causa etsi satis sit probabilis, probabilior tamen mihi videtur sententia Dn. D. Stahlij *Theor. Med. P. I p. 144.* quod scil. effluxus sanguinis menstrui rationem quandam Criticæ periodi fovere videatur. Ex Praxi enim notum est, in morbis acutis, ubi materia est admodum noxia, crisin aut commotiones criticas fieri septimo die: ubi verò nocendi vis non est adeò urgens, decimo quarto: in mitiori autem casu vigesimo aut vigesimo primo contingere. Cum itaque materia mensium excretioni destinata mitis sit, videtur quoque eandem periodi longioris criticam evacuationem sequi, ita ut demum tertia periodo sive septimana præterlapsa evacuetur. Quod autem



luna non absolutum in menses habeat imperium, exindè apparere potest, quod multæ feminarum non juxta phases lunæ, sed secundum menstruum dierum numerum mensium fluxum experiantur.

§. 4. *Locus* ex quo menses erumpunt, est *vagina Uteri*, quicquid etiam alii in contrarium proferant : nam ex observatione *Bohnii Circ. Anat. p. 244.* constat, cavitatem uteri in infanticida, mensium tempore capite privata & dissecta, nullo prorsus sanguine, sed solum vaginam conspurcatam fuisse. Simile quid observavit *Bergerus p. 252.* & exemplum parallelum ex *Pisone observ. & Consil. de Epilepsia p. 116.* recenset.

§. 5. *Tempus* quo hæcce sanguinis eruptio contingere solet, est annus ut plurimum decimus quartus; quamvis etiam dentur exempla quarundam, ubi decimo & duodecimo jam anno eruperunt : in nonnullis tardè admodum, in aliis prorsus non fluunt, quæ tamen plerumque steriles sunt. In quibusdam fluxus hic absque ulla molestia contingit : in aliis vero menses non sine magnis doloribus spasmodicis, in lumborum regione se exerentibus, fluunt.

§. 6. *Vasa* ex quibus sanguinis eruptio contingit, sunt *venæ cervicis* ab *hæmorrhoidali* vena ortæ : id quod probabile reddunt sequentia. I. quod largæ interdum in gravidis, præsertim plethoricis, fiant hæmorrhagiæ absque ullo fœtus detrimento, quod tamen, si sanguis hicce ex ipsius uteri vasis prodiret, minimè contin-  
gere

gere posset : cum enim hoc ipso fœtui nutrimentum subtraheretur , necessario in utero expirare deberet. 2. quod etiam femina non gravidæ sæpius magnam sanguinis copiam profundant , grumosque emittant , quos uterus contractus , & cavitate vix fabam excipiens , minimè capere posset. Quibus accedit 3. quod orificium uteri præsentibus hisce hæmorrhagiis nihilominus clausum deprehensum fuerit. 4. Fluxum sanguinis ex vasis hisce probat quoque præsentissimus consensus hypochondriorum cum utero & mensium negotio : quam primum enim menses supprimuntur , gravia statim hypochondriorum sequuntur symptomata : id quod à nulla alia causa , quam à regurgitatione sanguinis , exitum per hæmorrhoidalem venam , (quæ venæ portæ propago est) ad vaginam non inveniunt , dependent. 5. Ex conspiratione quoque hæmorrhoidum & mensium fluxum ex venis hisce fieri probabile redditur : nota enim mihi est femina , quæ anno ætatis trigesimo nono mensium suppressionem passa est , ab illo verò tempore hæmorrhoidum internarum fluxum ordinarium menstruum experta est. 6. Probari etiam potest ex venis prodire hunc sanguinem , quoniam non est splendidus , sed nigricans , nec etiam cum impetu , sed lentè admodum procedit : nisi fortiores spasticæ venarum constrictiones uberiores producant fluxum : tonus enim & contractio maximum ad mensium excretionem confert mo-

mentum, undè etiam dolores istos tenſivos multa ſentiunt.

§. 7. Sanguinem menſtrum venenatæ eſſe naturæ poſt *Plinium & Albertum* multi crediderunt, & non pauci adhuc ex ignara plebe ſunt, qui credunt. Ad hoc venenum forſan reſpexit *Arnoldus de Villa Nova Breviar. Lib. III.* quando mulieres animalia venenofa vocat: *In hoc meo libro, inquit, Deo auxiliante de ægitudinebus, quæ propriè mulieribus accidunt tractare intendo, & quia mulieres ut plurimum ſunt animalia venenofa, de morſu animalium venenoforum conſequenter tractabo.* Sed falſam eſſe hancce opinionem, apparet exindè, quod 1. ſanguis iſte, uti reliquus quoque ſanguis, à corde verſus partes moveatur & ejuſdem cum reliquo ſanguine ſit indolis; cum E. in reliquo hominis ſani ſanguine nihil venenati lateat, nemo etiam huic venenum ineſſe ſalva veritate affirmare poterit. 2. quod hic ſanguis alias nutritioni fœtus in utero deſtinatus ſit, neceſſario igitur laudabilis nulloque veneno inquinatus eſſe debet. Hinc meritò anilibus fabulis accenſeri merentur traditiones illæ, quod exhalationes menſtruarum feminarum ſpeculorum nitorem deſtruant, vina, aceta ac cereviſias corrumpant, plantas enecent & quæ ſunt alia.

§. 8. Uſus huius fluxus ſummus eſt in feminis; cum enim, niſi ſequeretur hæcce evacuationis, ſanguis in corpore hoc modo augeretur, & vim motuum ſuperare, (cum tamen in-

ter



ter motus & humores, sive uti alii loquuntur, inter solida & fluida continua debeat esse proportio) & sic multis malis ansam præbere posset, optimo consilio singulis mensibus excernitur. Durat E. hic fluxus ad septimum usque septenarium & singulis mensibus repetit, nisi à variis causis, imprægnatione, lactatione, morbis &c. impediatur. In nonnullis tamen, imprimis Plethoricis, ab initio imprægnationis nihilominus menses fluunt, quæ hinc bona admodum fruuntur valetudine: cum è contra reliquæ, quæ tale quid non experiuntur ab initio variis malis tamdiu durantibus affligantur, donec fœtus grandior redditus majorem nutrimenti copiam postulet & hoc ipso plethoram imminuat & varias stagnationes sanguinis impediat.

## ARTICULUS II.

De

### *Nutritione.*

§. I.

CUM supra dictum fuerit effectum motus humorum esse quoque *Nutritionem*, hoc ipso Articulo, quæ ad eam spectant, tractare animus est: id quod ut eò commodius fiat, agemus

1. De *Indicante* alimenti sive *Appetitu*.
2. De *Materia Nutritionis remota* sive *Alimentis*, aut uti vulgo loquuntur, de *Cibo & Potu*.
3. Trade-

mus

muscorum præparationem in ore, ventriculo, intestinis & vasis lacteis &c. ut scil. fieri queant alimenta materia nutritionis proxima. 4. Sermo nobis erit de modo Nutritionis.

## PUNCTUM I.

De

### *Appetitu.*

#### §. I.

**A**ppetitus describi potest, quod sit stimulus quidam naturalis, quo impellimur ad victum quærendum, sive ad resarciendum id, quod per varia colatoria secretum aut per varios labores deperditum fuit, quo corporis integritas conservetur: seu brevius juxta Dn.D. *Stahlium Theor. Med. Part. I. p. 280. appetitus est voluntas edendi atq; bibendi.*

§. 2. Veteres dividebant hunc appetitum in *naturalem* & *animalem*: ille erat exinanitio partium vasorumque in extremitatibus inchoata, & ad epar atque Ventriculum usque continuata, ubi per suctionem appetitum excitabat: hic verò erat sensatio ipso in Ventriculo, scil. fames & sitis, & erat productum prioris. Sed cum hujusmodi exinanitionem & suctionem principis medicis leviter tantum imbutus, falsam & circulationi refragari, facile comprehendere queat, non est cur prolixè eam refutemus: qui verò argumenta, contra hunc veterum appe-

appetitum naturalem directa, legere cupit, evol-  
at *Bohnij Circ. Anat. p. 125.*

§. 3. Recentiores plerique de causa appetitus quæsit, ferè unanimiter respondent, in Ventriculo contineri *lympham digesticem* alimentum assumpta resolventem & digerentem: cum vero Ventriculo vacuo non habeat, in quod agat, aggredi lympham illam interiorem Ventriculi tunicam nerveam, in orificio inprimis sinistro maximè sensibilem & hoc modo excitare appetitum.

§. 4. Verum enim verò quamvis lympham quandam, ad cibos digerendos necessariam in Ventriculi cavitate contineri non negem, vix tamen à me impetrare possum, ut credam, hanc mechanica prorsus ratione appetitum excitare vel posse vel solere. Nam 1. auditum solum grati ferculi nomine appetitus statim sive desiderium eo cibo potiendi oritur, immo saliva majori copia in os effunditur, ac si ferculum illud præsens esset, & in ore præparari deberet, unde Germanorum nata est loquendi formula, *das Maul wässert mir darnach/ Man hat mir das Maul ganz wässericht gemacht.* 2. Etiam si Ventriculus jam cibis repletus sit & fermentum habeat, in quod agere queat, nihilominus tamen, imposito mensæ ferculo grato, tanto sæpius cum appetitu illud assumimus, ac si prorsus nihil antea edissemus.

3. Appetitus non est promiscuus, sed fertur tantum in certa alimenta: undè Germani dicunt, *ich*



ich will dieses oder jenes essen/ ich hab appetit darzu/ & ob hanc rationem etiam insoliti cibi non nisi maximè urgente fame assumuntur. 4. Observamus plerosque homines assuetos esse certo cuidam tempori edendi, quo appropinquante appetitus excitatur; id videmus in iis qui durioribus laboribus assueti, ut eò commodius eos perficere queant, quater quotidie cibos assumere coguntur, & nihilominus tamen etiam si sint otiosi, consuetis temporibus appetitum consuetum experiuntur. 5. Si vero animus aliis rebus nimium intentus est, etiam si consueta hora adsit, appetitus tamen nullus excitatur. 6. Præsens maximus appetitus audito ingrati ferculi nomine, vel mentione alius rei nauseosæ facta, appetitus statim cessat, & ejus loco nausea maxima oritur. 7. Terror, tristitia, ira &c. præsentem appetitum momento citius tollunt. 8. Feminx prægnantes interdum anxie certos quosdam cibos desiderant, quibus si non potiuntur, sæpius navos exinde reportant infantes. Tali appetitu ferè etiam laborant delicatuli, qui adeò anxie expectant tempora illa, quibus anates, alaudæ aliaque venduntur, die mit schmerzlichem Verlangen auff die Entvögel/ Lerchen und Krammets-vögel Saison warten.

§. 5. Quæ omnia si quis æqua mente considerare vult, manifestè deprehendet, appetitum esse actum voluntatis & proficisci ab anima, corporis humani præside, quæ, consumpta quoad

quoad partem materia corporis nutritia, datum istud refarcire vult: unde etiam quod plus materia illa nutritia consumitur, quod in his, qui corpus duris exercent laboribus, contingit, major quoque est appetitus, & majori copia alimenta assumuntur. Simile quid etiam observatur post morbos, in quibus inultum materiae nutritiae consumptum fuit, maximus nim excitatur appetitus: ita quidem ut homines ferè singulis inomentis esuriant. Eadem quoque est ratio fortioris appetitus in junioribus, cum enim horum corpora adhuc augeri debeant, necessario quoque majori alimentorum copia & majori edendi voluntate sive appetitu opus est. Multum tamen quoque ad fortiores appetitum confert perversa consuetudo, ita quidem, ut quidam, etsi otiosi sint, ex sola consuetudine tantam alimentorum copiam accipiant, qui laboriosam agunt vitam, appetant. Quod autem adhuc magis animae concursus ad appetitum probat, est electio certorum ciborum præ aliis; cum enim ad electionem necessario intellectus, iudicium & voluntas concurrant, hæc autem animae propriae sint, quivis acilè perspicere poterit, animam h. l. excludi nec posse, nec debere. Eundem animae concursus ad excitandum appetitum confirmant etiam animi pathemata appetitum. suppressa; ut alia silentio præteream.

§. 6. Certissimum E. esse credo, animam humanam corporis conservationi omni tempore

pore maxima diligentia studentem, solam esse quæ appetitum, sive edendi atque bibendi voluntatem, in corpore humano instituere non tantum possit, sed etiam soleat atque debeat: Et proinde omnes istas speculationes, de mechanica fibrillarum Ventriculi titillatione aut vellicatione, vanas esse, & ad explicandum appetitus negotium parum vel nihil conferre.

## PUNCTUM II.

De

### *Materia Nutritionis*

sive

### *Alimentis.*

#### §. I.

CUM per varia corporis organa secretoria multum quotidie in corpore secernatur, & postmodum excernatur, ac continuo motu sanguis ipse atteratur & fatiscat, ita ut quotidie notatu digna laudabilium partium portio consumatur: necessario, si corpus in integritate sua conservari debet, in locum deperditarum aliarum laudabilium & nutritiarum appositio requiritur: id quod remote præstant *Cibus & Potus*, ut horum ope & solidæ & fluidæ partes conserventur, ita quidem ut non solum solidis nihil decedat, sed etiam iisdem tempore auctioris plus apponatur.



§. 2. *Cibos* quod concernit, ii potissimum ex *Vegetabili & Animali* desumuntur Regno: qui cum verò cibus, vegetabilis, an animalis, alter in nutritione præferendus sit, dubium videri posset; nam primos nostros parentes è vegetabili regno cibos suos desumpsisse, ferè nemo est qui negat; & hinc probabiliter concludi potest: hominem etiam solis vegetabilibus nutrirî posse: quod etiamsi non negem: nemo tamen prodienum est, qui non affirmet, cibos ad nutritionem hominis necessarios ex utroque Regno sumendos esse.

§. 3. Posset autem non immerito quis querere, quoniam *cibus* sit *optimus* & ad nutritionem corporis eligendus? Sed cum tot ciborum concurrant differentiæ & tot etiam inter homines diversa reperiantur temperamenta, ita ut hic cibus illi magis quam alius conveniat, specialis optimi nutrimenti determinatio, hic locum vix habet. In genere tamen responderi potest quod i. is optimus haberi debeat, qui materiali partium tam solidarum quam fluidarum constitutioni & conservationi magis convenit: ut scil. multum substantiæ mucilaginosæ atque pinguis (quæ supra ceu materia prima omnium partium constituta fuit) largitur. Qui bonæ est digestionis, non facîle corrumpitur, aut pravam qualitatem induit, ac pauca relinquât excrementa.

§. 4. Qui hacce gaudent qualitate cibi, vegetabili & animali reperiuntur regno,  
N quam-

quamvis alii alios bonitate superent. In *Vegetabili Regno* potissimum eminent *Fruges*, & inter hasce *Secale* atque *Triticum*, ad panem exindè parandum: panis enim ex *Hordeo* pistus, si aliquandiu asservari debet, nimis siccescit, & ad edendum minus hinc aptus est: *avenaceus* verò caput perturbat, & majori copia sumptus vertiginem & dolores capitis producit: & *leguminosus* ob flatulentiam minus sanus est: quare etiam panis ex *hordeo*, *avena* & *leguminibus* paratus non nisi hominibus durioribus laboribus assuetis convenit. Quare panis vel ex *secale* vel ex *tritico* vel ex hisce duobus mixtiss fiat, uti apud nostrates in usu est: cum enim nostrum *secale* sit admodum humidum, & bonitate *secale* aliarum regionum quam maximè cedat, ideò vel æqualis, vel dupla, vel etiam tripla *tritici* portio eidem communiter admisceatur.

§. 5. Quod verò panis eo facilius in Ventriculo digeri possit, sit *fermentatus*, *salsus*, bene *pistus* & *recens*, non tamen *calidus*: qui enim fermentationi antea subiectus non fuit, ponderosus, spissus ac mucidus est, & hinc magnum facessit in digestionem negotium: minus benè coctus instar astæ in Ventriculo hæret: siccus verò difficulter admodum digeritur: calidus tandem non solum digestionem refragatur, sed etiam in feminis facile menses perturbat aut supprimit. Panis igitur ante recensitis requisitis gaudens optimum præbet nutrimentum, & omnium qual

quasi ciborum basis est, dum carnibus, piscibus, oleribus &c. facile miscetur, eorumque digestionem adjuvat. Est quoque Ventriculo gratissimus: quamvis enim omnium ciborum, si frequentius eos comedimus, nausea corripiamur, à solo tamen pane, licet quotidie eo utamur, dum sani sumus, non facile abhorremus: ægrique omnium postremo panis appetentiam amittunt, & sanitati restituti primum recuperant. Unde etiam huc spectat ille Avicennæ locus insignis: *Omnis inappetentia mala, panis verò pessima*: qui tamen locus ab interpretibus corruptè ita traductus fuit: *Omnis oppletio mala, panis verò pessima*. vid. Dn. D. Stahl. l. a. p. 188.

§. 6. Reliquæ fruges, *hordeum, oryza, milium*, &c. cum jusculo carnis, lacte, aut etiam aqua sola coctæ, non contemnendum præbent nutrimentum, inprimis hordeum excorticatum & oryza, qua præ cæteris Orientales frequentius utuntur. Legumina tamen, lentes, pisa, fabæ: etsi quoque usui domestico inservire queant; reliquis tamen bonitate cedunt, dum non solum duriora & exsucca sunt sed etiam flatus generant: nostratum quidam, ut hæc vitia corrigant, pisces & lentibus addunt hordeum excorticatum & fortissimè coquunt, quod decoctum lingua vernacula ein Gampelmusß vocant.

§. 7. Quod verò olera varia, radices vegetabilium succulentas & varios fructus, *lactucam, brassicam, spinachiam, raphanos, rapas, cucurbitas*



*tas, melones, cerasa, poma, pyra &c.* concernit, partum sanè nutrimenti ipsis inest: multum enim aquositate ad fermentationem & acrimoniam contrahendam admodum pronæ, continent: undè etiam immoderato usu primam digestionem faciliè lædunt, & in intestinis fermentantia & acrimoniam contrahentia, diarrhœas & dysenterias non ratò excitant. Si verò quædam eorum prius fermentata fuerint, uti *brassica muriatica, Saurkraut* / aut aceto fortiore, pipere, sale, saccharo, prius probè condita fuerint, commodè assumi possunt: quatenus condimentorum horum additione fermentatio ista, ad quam adeò prona sunt, optime præcavetur: ita cucumeribus, ut benè digeri queant, præter acetum & oleum olivarum, multum piperis & salis aspergitur. melones cum saccharo & pipere assumuntur: acetaria varia oleo, aceto, pipere & sale condiuntur.

§. 8. Major nutriendi vis inest variis nucleis, cæteris tamen omnibus palmam faciliè præripiunt *amygdalæ dulces*: undè etiam tabidissimè optimè profunt, imprimis si exindè parantur *emulsiones* aut si *gelatinis* adduntur. Proximè hisce accedunt *nuclei pini*: reliqui verò nucum nuclei aliquam acrimoniam conjunctam habent, cujus respectu ad tussim faciliè disponunt.

§. 9. Ex animali regno qui proveniunt cibi, varii generis diversæque bonitatis sunt, dum alii à quadrupedibus, alii ab avibus, alii à piscibus desu-

desumuntur. Ad esum autem carniū animalium hominis Ventriculus naturā quasi comparatus videtur, quatenus cum carnivororum animalium ventriculis fere exactē convenit. Cui addi debet quod experientia quotidiana satis superque testetur, hominem omnis generis carnes, imò etiam ipsa ossa edere & digerere posse, si modo horum posteriorum duriora prius juxta methodum *Papini* cocta & emolita fuerint. Imo dantur etiam homines, qui crudam carnem & intestina animalium cruda edere solent, quod in primis *Tartari*, *Samojedæ* & accolæ Promontorii bonæ spei, *Hottentoti* dicti, exemplis suis proficiscentibus comprobaverunt.

§. 10. Inter carnes quadrupedum maxime usualis est *bubula*, quæ optimæ notæ præbet nutrimentum, si modo à junioribus tauris fuerit desumptum. Proxima huic est *vitulina*, quæ copiosam possidet gelatinam, faciliorisque est digestionis: undè etiam reconvalescentibus magis convenit, quam *bubula*. Caro *agnina* quoad bonitatem cum *vitulina* convenit, *vervecinam* verò superat. Optimè quoque & potentius adhuc reliquis nutrit caro *Suilla*, sed quoniam nutrimentum admodum crassum est, non nisi robustioribus & corpus labore exercentibus convenit. Caro autem *taurorum* gregiorum, *vaccina*, *ovilla*, *hircina* & *porcorum* maxime propter fœtorem insignem à paucis expetuntur.

§. 11. Huc spectant etiam carnes ferinæ, inter quas primum facile locum occupat *Capreoli caro*, quoniam saporis est grati & facilis digestionis cum è contra *cervina* difficilis sit digestionis & hinc non nisi robustiore ventriculo præditi conveniat. Nec melioris notæ est *caro ab apris adultioribus* desumpta : *juniorum* autem caro optima est, & domesticorum carnes bonitate superat. Omnium vero optima censetur *leporina*.

§. 12. Quod *avium* carnes attinet : sunt ex pariter vel domesticarum vel sylvestrium. Inter *domesticas* eminent potissimum carnes *Galorum* & *Gallarum* juniorum ut & *Caponum* temperatum enim præbent succum nutritium paucaque relinquunt excrementa unde non solum reconvalescentibus, sed & iis, qui corpus minimè exercent, commodum atque laudabile sunt nutrimentum. Huc spectant etiam *Galli* & *Gallinæ Indicæ* juniores. Hisce bonitate paulo inferiores censentur *columbæ*, quas sequuntur *anates* & *anseræ*, quarum carnes juxta *Diatæ* Scriptores sunt difficilioris digestionis. Inter *sylvestres* potissimum eminent *Perdix* & *Phasianus*, *anas*, *alauda* & *turdus*, quoniam verò duopriores caro admodum emuntur pretio, ideo posterioribus contenti esse coguntur, qui carnes quadrupedum animalium & avium domesticarum ad vitam & sanitatem tuendam non sufficere credunt.



§. 13. *Pisces* tandem quamvis in genere respectu carnium animalium non adeò laudabile, sed frigidius & humidius præbeant nutrimentum ac facilius quam aliæ carnes corrumpantur: inter illas tamen magna quoque reperitur differentia, & alii præ aliis ad sanitatem tuendam magis conferunt. Ii autem sunt optimi, qui carnem habent teneram, squamosi, parvi nec pingues nimis sunt, quique in aquis limpidis, per petrosa atque arenosa loca fluentibus, vivunt. Si E. juxta hæcce requisita pisces examinamus, reliquis palmam præripiunt *funduli*, *trutta*, *salmo*, *perca*, *lucius* & *cyprinus* inprimis juniores, ut & *halec* recens: quibus ex testaceorum numero *cancros* addere liceat. Reliqui autem quales sunt *barbus*, *anguilla*, *asellus* & con- similes, ob carnem glutinosam & duram non adeò laudabilis sunt digestionis.

§. 14. Cum verò animalium carnes crudè assumi nequeant, varia opus est præparatione, quo hujus beneficio ad digestionem & nutritionem magis aptæ reddantur: fit autem præparatio ista, partim *coquendo* & *assando*, partim *sale* variisque *aromatibus* *condiendo*, partim verò *sale* & *fumo* contra putredinem præservando.

§. 15. Simplicissima carnium præparatio fit per coctionem, dum carnes tantum simplici aqua coquuntur: sic enim caro non solum emollitur, sed etiam particulae carnis gelatinosæ aquæ communicantur, ut juscula exindè fieri queant. Jura carnium si diutius co-

quantur, tandem *Gelatinas* constituunt, evaporatis enim maximam partem partibus aquosis, gelatinosæ carnis particulæ remanent, & in loco frigido in gelatinam concresecunt. De Gelatinis hisce notandum quod non omnes animalium partes ad hasce parandas adeò aptæ sint, sed potissimum pedes & quorundam cornua requirantur, quæ vel per se coquantur, vel aliis adduntur, utiisdem gelatinæ consistentiam concilient: ita fieri possunt *gelatinæ ex carne bubula, gallinacea, pedibus vervecinis & vitulinis*, quibus quoque hordeum excorticatum addi potest, sic enim gelatina redditur optima. Si medicamentosam magis desideramus, rasura cornu cervi addi potest, ex qua etiam solâ gelatina paratur, cui pro circumstantiarum ratione interdum *Conf. alkerin.* interdum verò parum *succi citri* admiscetur. Omnium tamen optima gelatina fit, si v. g. *Raf. C. C. ℥iv in Aq. simpl q. s. vel ℔iij* ad gelatinæ consistentiam coquantur, ac liquor per filtrum trajectus calidè postmodum cum *amygd. dulc. excort. ℥iij vel iv.* contunditur ac denuò filtratur: sic enim in elegantissimi albi coloris, egegii saporis & optimarum virium gelatinam abit, quæ non solum in statu secundum naturam sed & præter naturam & inprimis *Hæctica*, magnum habet usum: nuclei enim oleosi dulces, animalium gelatinæ sociati, egregie vim suam exerunt, & hoc ipso illud, quod propter acrimoniam (si soli nuclei sumuntur) aliquas molestias creare potest, optimè:

mè corrigitur. Majorum adhuc est virium hæc gelatina, si loco aquæ simplicis *decoctum hordei*, cum *pedibus vitulinis* paratum, sumitur. Quid hujusmodi gelatinæ efficere possint in Hæctica, quilibet experiri poterit; Ego sanè salva veritate asserere possum, me in Praxi majorem efficaciam in iisdem, quam in multis aliis, quamvis maximè ab Authoribus laudatis, antihecticiis remediis deprehendisse.

§. 16. Cum caro solummodo elixa aut cocta sic parum habeat saporis, non solum sal, sed etiam aromata alia varia adduntur: in qua carnis præparatione præ aliis excellunt Galli, qui optimum saporem omnis generis carnibus, avibus & piscibus conciliare norunt. Et hoc modo præparatæ carnes melius nutriunt, quatenus per aromata magis activum redditur nutrimentum, & laudabilior quoque exindè generatur sanguis.

§. 17. Alia adhuc carniū præparatio fit *assando*, ad quam tamen non omnis caro, sed *succulenta* tantum apta est, uti *agnina*, *vitulina*, *vervecina*, ut & quædam *partes bovis*; reliquæ autem partes minus succulentæ, dum per ignem nimis exsiccantur, parum deindè nutrimenti præbent. Præprimis autem omnes *aves* tam *domesticæ*, quam *sylvestres*, ad hanc præparationem aptissimæ sunt. Quæritur hic an caro assata elixæ sit præferenda & utra magis nutriat? Sunt qui pro priore stant sententia, alii verò pro posteriori. Sed lis fore est de lana caprina, si enim

N 5

caro



caro ritè affata fuerit, ita ut per longiorem affationem particulis gelatinosis privata non fuerit, optimè nutrit.

§. 18. Cum carnes ad putredinem maximè sint proni, eamque facillimè concipiant, & nihilominus tamen ad aliquod tempus asservarii debeant, tres inventi sunt modi, quibus à putredine, præservantur: *primus* modus fit per *additionem salis communis*, quo copiosè asperguntur & in cellam vel alium locum frigidiorē reponuntur: hic condiendi modus maximè usualis est in *Inferiori Saxonia*: vocant carnem h. m. conditam, *Böckelfleisch*. Alter modus est, quando præter *sal*, *acetum fortius*, *piper*, *baccæ juniperi*, *folia lauri*, *caryophylli aromatici* aliaque carnibus adduntur: qui condiendi modus tam in ferarum quam domesticorum animalium carnibus condiendis usualis est. Tertius modus est, quando carnes *salsæ* vel *aëri* tantum; vel *fumo* exponuntur, ut sic sensim exsiccentur & diutius asservari queant.

§. 19. Ex animalium carnibus, & inprimis ex *suilla* varia quoque fiunt *farcimina*, & parantur vel ex ipsa carne, uti *Botuli* vel ex *pulmonibus*, *corde*, *hepate* &c. uti *tomacula*: vel ex *sanguine* & *lardo*. uti *apexabones*. Hæc ipsa autem saporis & asservationis gratia, *sale* & *aromatibus*, *pipere*, *zingibere*, *caryophyllis*, ut & *majorana*, *salvia*, *cherefolio*, *sem. coriandri* &c. largissimè condiuntur, ac interdum etiam fumo exposita aliquo modo exsiccantur.

§. 20. Ex animali regno tandem etiam huc spectat *Lac* quod etsi nutritionis gratia potissimum factum sit, solum tamen ad nutritionem non sufficit: nam quamvis primis partum diebus non contemnendum præbeat infantibus nutrimentum, statim tamen ipsi alii cibi, spissioris aliquo modo consistentiæ, & majori nutriendi vi pollentes, jungendi sunt: solum enim lac carnem mollem minusque firmam reddit, quæ cito iterum perit, id quod quotidiana docet experientia: undè vulgo dicunt, das Kind hat ein weiches Fleisch, welches bald abfallen wird. Deinde etiam solum lac ad nutritionem minimè sufficere exinde apparere potest, quod infantibus elapsis aliquot mensibus dentes erumpant, manifesto indicio solidioribus cibis, masticatione indigentibus, ad nutriendos infantes opus esse: cum enim corpus continuo augeri & ut injuriis externis resistere queat, firmitus reddi debeat, necessario quoque cibi solidiores requiruntur. Nec obstant hoc loco exempla quorundam Helvetiorum, qui lacte ferè solo vivere dicuntur: quamvis enim lac copiosius bibant, caseo tamen magna in copia, ut & carnibus aliisque cibis ex vegetabili regno desumptis simul utuntur.

§. 21. Ex hætenus dictis apparere potest, chylum ex Vegetabilibus & Animalibus paratum nutritioni quidem corporis inservire posse, non immerito tamen quæritur, quis alteri sit præferendus? si juxta rationem tota res exami-

aminatur, posset quis probabiliter concludere chylum ex vegetabilibus moderatæ acefcentiæ capacem, alteri præferendum esse ob sequentes rationes 1. quod primi parentes solis frugibus victitaverint. 2. quod infantes multi, matribus, ad lactandum ineptis aut mortuis, pultibus ex aqua & farina paratis nutriantur, & loco lactis materni aqua ipsis detur. 3. quod omnis caro & exinde paratus chylus, (licet copiosior ex carnibus, quam ex Vegetabilibus ejusdem sit proventus) ad putredinem semper sit pronus. 4. quod in morbis appetitus carniū statim pereat, & tardissimè redeat, ac præterea carnes assumptæ magnas creent molestias. 5. quod è contra ægroti cibos è vegetabilibus paratos, ut & succos acidulos in morbis non solum appetant, sed etiam facilius ferant. Ast cum à multis sæculis mos invaluerit, ut homines quoque animalium carnibus utantur, ac præterea carnes moderatè sumptæ laudabilem præbeant chylum, non malè agere mihi videntur, qui & vegetabilibus & animalibus vescuntur, ita tamen ut panis reliquaque vegetabilia carnis quantitatem superent, sic enim non solum acefcentia ad quam vegetabilia prona sunt, sed etiam carniū ad putredinem proclivitas corrigitur & chylus laudabilis nutritioni optimè inserviens generatur. Hinc etiam mos invaluit ut *brassica capitata, crissa, muriatica, rapæ radices petrosolini, pastinacæ, pisa, bordenum oryza*, &c. cum carne aut jure carniū coquantur, aut saltem *butyro* vel *lardo* impinguentur.



§. 22. Cum verò ad sanguinis laudabilis constitutionem aquosæ quoque requirantur particulæ, ac præterea cibi ab humoribus affluentibus sufficienter dilui nequeant, *Potui* opus est, quo hæjus ope alimenta ad chylicationem aptiora reddantur. *Potulenta* autem quibus homines ordinariè utuntur, sunt *varia* & quidem vel *ordinaria* vel *extraordinaria*. *Ordinaria* sunt, quæ promiscuè & semper ad sitim restinguendam & ad cibos diluendos assumuntur: inter quæ ipsa tamen notabilis intercedit differentia: *alia* enim à *Natura* proferuntur. uti *aqua* & *vinum*, *alia* verò sunt *artis producta*, uti *cerevisiæ varia*, *aqua mulsa* &c. quamvis etiam ad vinum arte opus sit. *Extraordinaria* sunt, quibus homines vel ex *consuetudine* vel *sanitatis tuendæ*, vel *voluptatis* gratia utuntur, quales sunt *spiritus vini* varii generis, & vulgo sic dicti Gallorum *Liquores*, *Liqueurs*, *Potus Coffee*, *Thee*, *Chocolada*.

§. 23. Inter *ordinaria* *Aqua* simplicissimus non solum omnium animalium, sed etiam multorum hominum potus est: quæ etsi hominibus sufficere posset, exemplo multorum hominum, aquæ potum summa cum euphoria ferentium, commodius tamen visum fuit, aquæ alios potus paulo spissiores & particulis nutritiis imbutos substituere, aut eidem jungere: & quidem ob rationes sequentes 1. quod aqua ob summam suam fluxilitatem nimis citò per viscera secretoria transeat & excernatur. 2. quod ad constitutionem humorum corporis potus ali-

aliquam spissitudinem iisdem concilians requiritur.

§. 24. Inter aquam autem ratione bonitatis magna est differentia, & hinc etiam non omnis aqua ad sanitatem indifferenter confert. Illa autem *optima* est, quæ & visu & gustu & olfactu pura & sincera esse deprehenditur: quæ nempe visui apparet limpida & pellucida & nullius rei saporem aut odorem gustui aut olfactui offert. Et sic aqua fontana præ cæteris est eligenda, *fluvialis* enim, & imprimis ea quæ per civitatem fluit, plerumque *impura* est, & ex variis diversæ naturæ aquis composita: *putealis* verò *crassa* & *gravis* est: *pluvialis* quamvis *tenuis* sit nihilominus tamen ob varias admixtas particulass non adeò *pura* est: *stagnans* autem & *palustris* *crassa*, *cruda* & *putrida* est & multis morbis ansam præbet: *glacialis* tandem ob *frigiditytem* *Ventriculum* lædit, *colicæ*, *morbis articulorum* & *scrophulis* generandis apta est, *Acidulæ* etiam commodè loco potus ordinarii assumuntur, quoniam admodum *penetrantes* sunt, omnem *sanguinis visciditatem* tollunt, *macumq;* & *cruditates* primarum viarum resolvunt & abstergunt, & sic ad longævitatē maximè conferunt.

§. 25. Quamvis autem sitim aqua optimè extinguunt, non æque tamen ad sanitatem confert ac *vinum bonæ notæ*, quod scil. saporem habet medium inter dulcem & austerum, gratum est & fragrans, clarum & nonnihil fulvum, neque crassum, neque tenue nimis, ad tenuita-

tem

tem tamen nonnihil accedens : neque potens nimis, neque nimis debile, ætatis mediæ: aut uti vulgo dicunt vinum COS, quod scil. *colore, odore & sapore* se commendat. Horum E. requisitorum intuitu patet, nec *mustum* ceu nimis dulce & crassum, *fermentationi* maximè obnoxium, nec etiam *vina alia dulcia*, uti sunt *Hispanicum, Canariense* aliaque partim propter *spissitudinem*, partim propter vehementiam ad sanitatem conducere. Vinum autem *Rhenanum* imprimis *Rhingaviense*, ut & *Mosellanum* omnium optima sunt, quoniam superius allegatis requisitis instructa sunt & diuresin optimè promonent. Malè verò audiunt & hinc rectè culpan-  
tur *vina Alsatix superioris*, quæ crassioris sunt consistentiæ & nullo modo urinam movent, sed in sanguine permanentia graves capitis dolores, & insignem membrorum torporem excitant.

§. 26. Cum verò vinum non in omnibus locis crescat, & aqua nimis fluxilis sit, citoque per colatoria corporis transeat & excernatur, variis modis aquam præparare & particulis nutritiis imbuere conati sunt homines, undè varii nati sunt *Potus artificiales*, inter quos primum locum occupat *Cerevisia*. Hujus tamen diversæ, quoad *ingredientia colorem & locum coctionis* differentes, dantur species. Quoad *ingredientia* quidem alia ex *hordeo*, alia ex *tritico*, alia ex *avena* coquitur : è quibus tamen *optima hordeacea* censetur : *triticea* enim nimis *spissa* est;  
avena-



*avenacea* verò *stupore* insigni caput afficit, ac præterea insignem sitim excitat: idem etiam cerevisia cum lupulo copiosiori & crudiori cocta præstat. Deinde etiam respectu ipsius aquæ cerevisia non parum differt: exempli loco esse potest cerevisia *Naumburgensis*, quæ reliquas cerevisiæ species vi diuretica, refrigeratoria & amaritie longè superat ob aquam nitrosam ex qua coquitur. Respectu *coloris* alia est ex albo *flavescentis*, alia *obscurè rubicundi*: illam communiter vocant *Bräuhahn*/ quæ in multis superioris & inferioris Saxonix locis admodum usualis est: cum hacce aliquo modo convenit alia species, quam, ad imitationem hujus coctam, *WeißBier* vocant. Respectu loci coctionis tot diversæ cerevisiæ species, quot loca diversæ dantur, quæ nihilominus ratione saporis admodum differunt: sapor enim quarundam est dulcis, aliarum vero dulcis quidem, sed cum aliquali grata acrimonia, aciditate aut amaritie conjunctus. Omnes autem cerevisiæ probè debent esse fermentatæ, alias non leves turbas in corpore excitant. Huc spectat etiam *Hydromell* ex aqua & melle paratum, quod debito modo fermentatum, non solum saporem vinosum, sed etiam inebriandi vim acquirit: potus ejus maximè usualis est in *Lithuania*. *Bergmann & J. a. Franzky Kabbelay.*

§. 27. Qui verò ex vino parantur *Spiritus*, & additis nonnunquam variis radicibus, herbis & aromatibus aliisque exaltantur, ad sanitatem quidem optimè conducunt, iis scil. qui

Phleg-

Phlegmatici aut debilioris ventriculi sunt, quando scil. post prandium vel cœnam sumpti particulis suis spirituosiss, oleosis, balsamicis chy-  
lificationem promovent, chylique vappescen-  
tiam impediunt: iis vero qui robustiore Ven-  
triculo, sanguineque calidiori præditi sunt, non  
adeò profunt, nisi forsan post prandium aut  
cœnam, quando cibi difficilis digestionis in  
magna copia assumpti fuerunt.

§. 28. *Potum* denique *calidum* quod con-  
cernit, is hodiernis temporibus admodum usu-  
alis, & à populis orientalibus ad nos transla-  
tus est: ejus species magis usuales sunt *Potus*  
*Coffèe, Thèe & Chocoladæ.* *Coffèe* paratur ex fabis  
coffee tostis pulverisatis in aquam bullientem  
conjectis & leniter coctis; sic enim aqua nigro  
tingitur colore & saporem acquirit amarum,  
cujus ratione *viscidos humores* optimè incidit &  
*resolvit,* & hinc optimè convenit *Phlegmaticis* &  
iis qui debilioris Ventriculi sunt. Cholericis  
autem parum prodest, & facilè in iisdem pal-  
pitationes cordis ac artuum tremorem produ-  
cit, inprimis si tempore matutino & vacuo ad-  
huc ventriculo assumitur: possem hocce con-  
firmare multis exemplis eorum, quos familia-  
riter novi: id quod observavit etiam *Baglivi*  
*Oper. p. 76. duos vidi,* inquit, *ex nimio caphe abusu*  
*incidisse in tremorem brachij & debilitatem, statim-*  
*que convaluisse, ejusdem potione prætermissa, nec nisi*  
*moderatione adhibita.* Quare etiam ad in-  
commoda hæc præcavenda plerique jam po-  
tum

tum caffèe non nisi post prandium aut cœnam bibunt. Eodem observante *Baglivi* potus capheæ est secretum infallibile ad tollendum capitis dolorem postmeridianum, qui vitio stomachi malè digerentis nonnullas post prandium horas venit: *id, ait, in innumeris observavi ægrotantibus Romæ.* Id in me ipso quotidie observo: mihi enim ob assiduas cogitationes, nimiosq; praxeos labores in ægriis visitandis, & eorum omnium patientissimè describenda natura, ad amplificandam praxin maxime necessaria; cum stomachus debilis valdè sit, tribus post prandium horis, dolore capitis, gravitate, mœrore, vexari incipio, quæ quoniam à stomacho malè digerente fiunt, duos vel tres caphe cyathos haurio, & momento temporis, ac ferè ad miraculum, à malis prædictis me statim libero.

§. 29. Potus Thee paratur ex foliis fruticis cujusdam Chinensis & Japonensis: inter quæ tamen respectu magnitudinis magna occurrit differentia: Sinensia enim longè minora sunt Japonensibus, nec etiam adeo efficacia, unde quoque minoris sunt pretii. Deindè etiam ratione coloris datur inter folia Thee differentia: alia enim sunt obscurè viridia, alia vero obscurè rubicunda, quæ ab Anglis *The Bou* vocantur. Virtus eorum consistit potissimum in mucilagine quadam leniter adstringente, non autem in quod perperam hætenus creditum fuit, in sale volatili oleoso. Vim autem adstrictoriam præstant 1. sapor austerus & 2. destillatio in spiritu sum subacidulum: quibus accedit 3. quod fuit



mus foliorum Thee per fistulam haustus austeritate sua gulam constringere soleat : ac 4. decoctum paululum inspissatum, solutione vitrioli affusa in verum degeneret atramentum, ac si gallarum infusio sumpta fuisset : & tandem 5. quod infusum Thee alvum constipet. Huic à multis substituitur *Veronica*, eique majores vires quam ipsi Thee adscribuntur. vid. *Joh. Franci Veronica Theezans*, it. *die preiszwürdige Veronica*, ut & *Hoffmanni Dissert. de Infusi Veronicæ efficacia præferenda Herbae Thee*. Nonnulli nostratum utuntur infuso *Herbarum incidentium, pectoralium & traumaticarum*, quod vulgo den *Schweitzer-Thee* vocant.

§. 30. *Chocolada* denique est pulvis fructus *Cacao*, cui varia aromata & succi sunt admixti; descriptiones tamen admodum variant, ita quidem, ut aliæ in hisce, aliæ in aliis regionibus usuales sint, in Gallia Dn. de *Blegny Tract. de Chocalad.* p. 238. formulam sequentem maximè usualement esse tradit : R. *Cacao præpar.* ℥iv. *Sacch.* ℥iij. *Vanillas* No. XII. *Cinnam.* j. *Caryophyllos* No. vj. *Piper. Indic.* gr. viij. *Ambr.* r. vj. *Mosch.* gr. iij. M. F. l. a. *Massa.* *Massa hæc* postmodum redigitur in *Tabulas*, quarum pulvis lacti ferventi infunditur & continuo agitur ut probe spumescat: sunt quoque qui memoris nutritionis, saporis & odoris gratia ovæ liquot & *Aquam Rosarum* fragrantem addunt. Potus hic teste *Baglivo l. a.* ad roborandam massam sanguineam ejusq. vim, tonum & succum ejusdem nutritivum

*tritium deperditum restituendum, prostratos à coitu spiritus restaurandos maxime juvat, eodem tamen tempore stomachum mirè confortat, adeò ut Ambrosiæ nomen mereatur. Calidioribus tamen minimè prodest.*

### PUNCTUM III.

De

## *Alimentorum Preparatione in* *Ore, Ventriculo, Intestinis & Vasis* *lacteis.*

### §. I.

**I**psa autem modo recensita alimenta, cocta licet aliisque modis præparata, nondum tamen apta sunt ad nutriendum, sed varia adhuc præparatione opus habent, antequam in succum verè nutritium convertantur. Fiunt autem istar præparationes in *Masticatione & Chylificatione*, quando nimirum cibi in ore masticantur, & in canali alimentorum varii liquores ipsis, ut eò melius solvi queant, admiscuntur.

§. 2. *Masticatio E.* est illa actio, qua mediante cibi solidiores in ore inciduntur, comminuuntur & in subtilem pollinem ope dentium rediguntur: incidunt scil. eos dentes *incisores* lati & acuti, quorum quatuor utrique maxillæ infixi sunt; duriores cibos infringunt & comminuunt quatuor *canini*, rotundi & acuti: in pollinem autem subtiliorem eosdem redigunt.

digunt, adjuvante continuo motu maxillæ inferioris, dentes *molares* dicti.

§. 3. Cum verò dentes ad masticationem necessario requirantur, hoc ipso autem sensim sensimque aliquo modo atterantur, singularis ipsis concessa est substantia: *osseam* quippe interiorum exterius ambit corticalis quædam substantia *albissima*, quam ob singularem duritiem *saxeam* vulgo & *lapideam* vocant. Sed cum, non obstante hac duritie, dentibus semper aliquid ob continuam contritionem decedat, continuo quoque crescunt, id quod exinde potissimum apparet, quod dente v. g. in superiore maxilla elapso, alter in inferiore huic ex adverso positus brevi reliquos longitudine superet dentes.

§. 4. Non autem tantum ob singularem duritiem & continuam accretionem, sed etiam aliis modis à reliquis differunt ossibus, in extiore enim parte periosteo carent, quo tamen omnia alia ossa cinguntur. Sed id non sine summa factum est ratione: cum enim dentes aëri externo ferè semper sint expositi, continuo dolore, si periostio cincti essent, afficerentur: hinc lapidea ipsis concessa est substantia, quæ aëris injurias minus sentit. Inferior autem dentium pars, quæ gingivis tegitur, periosteo munita est, quæ tamen observante *Havero Osteol.* p. 100. non à periosteo maxillarum, sed à membrana totam oris cavitatem cingente oritur: alveoli tamen dentium communi maxillæ periosteo gaudent.



§. 5. Dum vero dentes maxillis, superiori immobili, inferiori verò mobili, infixi, cibos varii generis comminuunt, ad meliorem eorum solutionem saliva continuo, & inprimis tempore masticationis, affluit: quam quidem uberio-rem in masticatione affluxum à solo motu maxillarum, glandulas comprimentium salivamque h. m. exprimentium, communiter mechanicae Medicinæ Patroni deducere volunt, uti supra de *Salivæ Secretione* dictum fuit, sed tria sunt, quæ mechanicam hancce tationem refellunt 1. quod mentione solum cibi grati facta, magna copia salivæ in oris cavitatem effluat, undè etiam Germanorum nata est formula, *man hat mir das Maul wässericht gemacht.* 2. quod cibus ingratis ore assumptis, etiamsi diu masti-centur, salivæ affluxus sensim cesset, ita ut minus commodè deglutiri queant, & nausea excitetur. undè Germani dicunt, *man werffe dem Bissen im Mund herum / man könne ihn nicht hinunter bringen.* 3. quod etiamsi maxillæ extra masticationis tempus pro lubitu satis diu moveantur, saliva tamen tanta copia, ac in masticatione ipsa, in oris cavitatem non effunditur. Quare potius concludendum est, Naturam, semper cum intentione & ob certum finem agentem, tempore masticationis ideò majorem salivæ copiam mittere, ut cibi eò melius dilui & solvi queant. vid. supra de *Salivæ Secretione* p. 156.

§. 6. Quo verò saliva eò melius cibos solvere & diluere queat, copiosis instructa est partibus *aquosis*, quibus *salinæ acres* & *gelatinosæ* moderata quantitate admixtæ sunt. *Aquosæ* ergò partes, dum inter masticandum continuo ex diversis fontibus affluit saliva, cibos optimè diluunt, hisce verò immixtæ salinæ incidunt & penetrant cibos, ut partes laudabiles eò facilius postmodum à compedibus excrementitiarum liberari queant. Hæc ipsa autem salivæ affusio & ciborum comminutio similis est illi operationi Pharmaceuticæ, quando *corallia*, *lapides cancorum*, *conchæ* &c. per trituram in subtilissimum pulverem redigi, aut uti vulgò dicunt, præparari debent: quemadmodum enim ibi inter terendum, aqua affunditur, ita & hic inter masticandum saliva affluit: eum in finem, ut in utraque operatione materia præparanda eò subtilior reddatur. Ipsa quoque potulenta, quæ diluendis cibis potissimum inserviunt, etsi absque masticatione deglutiantur, nihilominus tamen in ore insigniter à saliva alterantur.

§. 7. Lingua quoque inservit ciborum præparationi in ore, quatenus cibos distribuit eosque in uno latere comminutos excipit, ac alterius lateris dentibus ulterius comminuen-  
los offert: sicque lingua molitoris, fruges distribuentis officio, maxillæ verò cum dentibus apudum molarium, quorum alter itidem immobilis, alter verò mobilis est, vice funguntur.

*Vid. supra Cap. II. p. 16.* Labia quoque ad hanc ciborum præparationem aliquid conferunt, dum non solum cibos assument, sed etiam os claudunt, ita ut inter masticandum nihil excidere queat.

§. 8. Hæc ciborum præparatio, etsi operatio parvi momenti videatur, revera tamen magni est momenti, qualis enim est masticatio, talis quoque est chylicatio, & unus bolus minus masticatus plus negotii facessit in chylicatione, quam decem benè masticati: undè etiam *homines* maximè voraces, die *Heißhungerigen*/ quoniam cibos vix masticant, sed instar ciconiarum integros deglutiunt, plerumque sunt *macilenti*: quoniam in iisdem digestio & nutritio laudabilis nullo modo contingere potest. Recte hinc dixerunt Arabes, *vitam suam odisse, qui masticationem negligit.* Cum enim vera digestio & chylicatio in intima ciborum resolutione consistat, per se liquet, salivam in cibos non benè comminutos minimè penetrare, & hinc eosdem intimè resolvere non posse.

§. 9. Cibi h. m. in ore masticati deglutiuntur, ut in Ventriculo & intestinis ulteriùs resolvantur & in chylum mutantur. Concurrit autem ad deglutitionem potissimum *Lingua*, quæ plana reddita cibos masticatos excipit: hinc apex ejus attollitur & palato applicatur, & tandem totum linguæ corpus, apice ejus excepto, ope musculorum versus fauces retrahitur, & sic cibi simul



simul versus fauces protruduntur. Postea verò œsophagus dilatatus excipit cibos, quos tamen musculus *œsophagiæus* sive *sphincter* gulam stringendo statim protrudit, donec tandem coagentibus fibris œsophagi ad Ventriculum usque propellantur: sicque falsum est, *cibos propria gravitate descendere ad Ventriculum*. Circa hunc deglutitionis actum adhuc notandum est, cibos gratos absque ulla difficultate degluti, ingratos verò magnum in deglutiendo facessere negotium, undè Germani dicunt, *der Bissen bleibe einem im Hals stecken / man könne ihn nicht hinunter schlucken: das Essen wiederstehe einem / es wolle durchaus nicht hinunter*. Hic sine dubio mechanicæ Medicinæ Patroni, nescio quas particulas figuratas spiritibus infensas allegabunt: sed sanæ rationi magis consonum videtur, Naturam corporis præsidem, uti grata corporique proficua faciliè admittit, ita adversis ope fibrarum resistere & motum œsophagi invertere & hoc modo ingressum ingratorum in Ventriculum impedire: quare etiam si nihilominus talia ingrata magna adhibita vi deglutiuntur, Natura, inverso motu ventriculi & œsophagi, per vomitum ea rejicit. Sed regerent forsân, particulas ciborum aggredi Ventriculi fibras atque easdem irritando efficere, ut vomitus necessario sequi debeat. Sed precariam esse hanc objectionem exindè apparere potest, quod mentione saltem hujusmodi ingrati cibi facta, nausea & vomitus excite-

tur: ubi E. hoc in casu sunt particulæ istæ ad-  
versæ fibras irritantes & nauseam ac vomitum  
excitantes ?

§. 10 Cibi E. h. m. in ore præparati ope  
deglutitionis perveniunt ad *Ventriculum*, viscus in-  
fimi ventris capacissimum, in quo colliguntur,  
asservantur ac ulterius resolvuntur. Ciborum  
autem resolutioni maximè inservit vulgò sic di-  
ctum *fermentum Ventriculi* sive *lympha gastrica* :  
quænam autem hujus sit *origo* & *natura* nom-  
convenit inter Medicos. *Helmontius* & qui eum  
sequuntur, existimant fermentum hocce pro-  
venire ex *liene* & per *vas breve* aut potius *vasa*  
*brevia*, infundi in *Ventriculum*: sed hanc sen-  
tentiam non pauca sunt quæ dubiam reddere,  
imò falsitatis convincere possunt, & quidem 1.  
quod ipsum venarum officium eidem repugnet,  
venarum enim est sanguinem à partibus reve-  
here, quare etiam vasa brevia potius sanguinem  
à ventriculo revehunt, quam eidem aliquid in-  
fundunt. 2. quod ex observationibus Anato-  
micorum constet, extirpato liene, fermenti, jux-  
ta *Helmontium*, fonte, canes nihilominus pri-  
stinam voracitatem retinuisse & cibos optimè  
digerere potuisse. 3. Repugnat etiam ipsa lie-  
nis structura, in qua, præter lympham per glan-  
dulas secretam & per lymphatica vasa ad rece-  
ptaculum chyli revehendam, nihil amplius se-  
cerni ipsa structura docet. Alii per *glandulas*  
*Ventriculi* fermentum hocce secerni volunt,  
sed cum ad tantam alimentorum massam revol-  
vendam

vendam glandularum Ventriculi fermentum, non adeò copiosum, minimè sufficere posse, ipsa sana ratio dicitur: rectius ii agunt, qui hujus fermenti præcipuam originem in glandulis salivalibus quærunt, cum enim toto masticationis tempore saliva magna copia, & quidem, omnibus consentientibus eum in finem affluat, ut cibi ejus ope solvantur, ac ideò etiam cum cibis deglutitur, ut id quod in ore inceptum est, eò melius in Ventriculo perficere queat: quænam necessitas efflagitat, alios minus cognitos & minus sufficientes vias quærere. Sed respondebunt forsitan quidam, lympham Ventriculi esse admodum penerantem & activam, ac proinde in parva quantitate magnos effectus edere posse: sed hujus sententiæ Patroni mihi permittent, ut tamdiu de lymphæ hujus majori efficacia dubitem, donec sufficientibus argumentis eam comprobaverint. Et quod hancce sententiam eò magis infringit, est, quod chylicatio tota in Ventriculo non absolvatur, sed ulterius in intestinis perficiatur per varios humores affluentes. Nemo tamen exinde concludat precor, me omnem lymphæ glandularum gastricarum concursum negare, eam enim aliquo modo ad chylicationem conferre lubentissime largior.

§. II. Quod naturam hujus fermenti concernit, idem *Helmontius* & qui ejusdem placita secuti sunt, aciditatem menstruo Ventriculi tribuerunt, quorum argumenta videri possunt apud *Etmüll. T.I. p.m. 92.* ut & *Bohnius Circ. Anat.*



*Anat. p. 143.* Præcipua autem horum sunt I. Quod passerum guttur acidum spiret. 2. Quod aves arenulas ad temperandum acidum deglutiant & arenulæ ab acido corrodantur. 3. Assumpta in Ventriculo statim acefcant. 4. Lac jejuno Ventriculo assumptum & vomitu rejectum acidum spiret & in grumos caseosos conversum sit. 5. Quod acida appetitum excitent & 6. in apepsiis, lienteriiis & dysenteriiis ructus acidus superveniens fermenti acidi restaurationem indicet. 7. Quod martialia assumpta ructus nidorosos sulphureos excitent, & 8. Ventriculus animalium paulò post pastum dissectus spiritus acidulos penetrantes eructet: ut alia silentio præteream.

§. 12. Verum enim verò cum post multa instituta experimenta potiores Anatomici, lympham à saliva non differre sed iisdem principiis gaudere deprehenderint, non video cur absque ulla necessitate acorem menstruo Ventriculi affingere debeamus. Nec etiam tantum robur ante allegatis argumentis inest ut quendam, ad admittendam menstrui Ventriculi aciditatem cogere queant: cum enim passerum à pueris caseo recenti & pane fermentato nutriantur, quid mirum, si eorum guttur acidum spirat. Nec quoque aves ad temperandam menstrui aciditatem arenulas devorant, sed potius ut grana frumenti assumpta, eò magis atterantur: quando autem corrosæ apparent arenulæ, id quidem præcisè ab acido non derivandum est, quatenus

ex Chimia notum est, falia quoque alcalina corrodendi vim obtinere. Multo minus experientia comprobari potest omnia statim assumpta in Ventriculo acescere & si tale quid contingit, id potius acori peculiari à cibis acidis in Ventriculo relicto, aut cibis actu acidis aut ad acorem pronis, quam ipsi Ventriculi menstruo adscribendum est. Ipsum quoque lac eandem ob causam coagulatum rejicitur, si forsan aliquid acoris in Ventriculo relictum fuerit: ac præterea mulieribus rusticis notum est, lac non adedò recens in loco calido absque ullo addito acido in grumos caseosos abire. Nec etiam acida appetitum semper excitant, sed in iis tantum qui biliosi sunt: & ubi Ventriculi fibræ aliquo modo relaxatæ sunt, quas leniter stringendo, Ventriculi tonum restituunt, & sic ad digerendum habiliorem reddunt. Parum quoque probat *Hippocr. 6. aph. 1.* ructum acidum diuturnis lævitatibus supervenientem bonum esse signum: quamvis enim Hippocratis Autoritas summa sit, non tamen in omnibus infallibilis est, quod ex non paucis probari posset: probationis loco sit *aphor. 41. Sect. V.* ut alia taceam. Nec etiam ructus nidosi post assumpta martialia omnibus subjectis, sed tantum hypochondriacis familiaria sunt: imo martis limatura aquâ affusâ simplici talem nidorem spirat. Nec tandem dissectio Ventriculi post pastum aliquid probat, quamvis enim spiritus penetrantes ex Ventriculo prodeant, minimè ta-

men

men acidi sunt. Quibus ultimo loco addi posset, quod malè consultum esset hominibus si acidum chylicaret, quantam enim potentiam habeant acida in lac, chyli analogon, omnibus notum est: chylus enim à menstruo hocce acido summo cum periculo coagularetur. Satiùs E. est, uti superius jam monitum fuit, asserere, lympham Ventriculi eandem cum saliva habere naturam, quoniam id quod menstruum Ventriculi vocamus maximam partem saliva est.

§. 13. Fit autem ciborum resolutio per modum quendam *fermentationis*: quam primum enim cibi in Ventriculum deglutiti fuere, singularem statim odorem, qualis in rebus fermentantibus observatur, spirant: id quod animalium post pastum sectio probat. Hæc tamen fermentatio satis est peculiaris, ita quidem ut etiam rebus, ad fermentationem tantum putredinosam aptis, alium statim characterem imprimat, & hoc modo præoccupet, quominus putredinem concipere queant: imò si etiam alia ingesta ad fermentationem aliam prona sunt, uti sunt vegetabilia, ea in ventriculo citò absolvitur, & nihilominus tamen fermentescentia acida, ad quam vegetabilia prona sunt, itidem præcavetur; quare ex hisce fermentationem hancce animale, præ aliis prorsus peculiare quid obtinere apparet.

§. 14. Fermentationem hancce animale maximè in homine promovet *calor*: quam-



vis enim dentur animalia, quæ ad tactum frigida sunt, uti pisces, serpentes &c. & nihilominus tamen cibos ingestos digerunt: in homine tamen calor absolute necessarius est, quamprimum enim hic perit, digestio maximè læditur, & variæ cruditates generantur. Quod verò animalia ista frigida concernit, tarde admodum digerunt, pisces enim per longum satis tempus absque ullo nutrimento in sola aqua limpida conservari possunt: & viperæ in vitro asservatæ diu absque cibo vivunt, ita ut quidam ex hisce concludere voluerint, dari quoddam occultum vitæ pabulum in aëre. Hic autem calor non homini tantum, sed & aliis animalibus calidis maximè ad digestionem est necessarius, undè quo calidiora sunt animalia, eò potentius digerunt & contra. Nulla tamen hic absoluta fit coctio uti in culinis, qualem veteres sibi sunt imaginati, qui Ventriculum lebeti, viscera verò circumjacentia prunis compararunt, & hinc ciborum digestionem solius caloris opus esse crediderunt: quam tamen sententiam jam ante *Helmontium Petrus Castellus* Scholæ *Messinensis* Medicus, in *Epist. ad Severinum* scripta impugnavit: *Non solius, inquit, caloris opus cibi coctionem dicimus, alioquin & in olla talis fieri posset, sed fermentatione opus est, qua cibi in Ventriculo sublevantur, bullescant & permeabiles, spongice instar, reddantur, ut sic melius à calore vincantur, disponantur & permisceantur.*

§. 15. Ciborum autem resolutio in Ventriculo successivè fit: cum enim cibi non unius ejusdemque sint naturæ, hinc etiam alii tardius, alii citius digeruntur: quod verò digestum est, non tamdiu in Ventriculo moratur, donec omnes eandem digestionem experti sint, sed per orificium inferius ad intestina transit. Normis tamen hæc diuturnior alimentorum mora fit, eam ob rationem ac si duriora majorem postulent digestionem sive fermentationem: experientia enim docet, fluida interdum diutius morari in Ventriculo quam duriora, undè normis raro, duabus vel tribus horis post cœnam, quando largior potus assumptus fuerit, aperta fluctuatio in Ventriculo percipitur, manifesto indicio potulenta adhuc in Ventriculo hæreret. Quare etiam rectè asseri potest, fermentationem tamdiu durare, donec omnia assumpta sive solida sive fluida optimè resoluta sint, ita tamen, ut quæ citò resolvuntur, citius quoque è Ventriculo exeant.

§. 16. Egressum digestorum alimentorum à Ventriculo ad intestina admodum promovet *tunica ventriculi fibrosa sive musculosa*, quæ ex variis fibris longitudinalibus & transversalibus composita undiquaque Ventriculum cibis repletum constringit, sicque illud quod digestum est, cuique valvula pylori transitum concedit, expellit. Hæc ipsa quoque tunica ultra modum extendi potest, id quod contingit inprimis in hominibus admodum voraci-

buss

bus, qui ingentem sæpius ciborum copiam absque ulla molestia ingerunt: cum è contra alii Ventriculi dolorem exindè experiantur, qui potissimum à nimia extensione tunicæ nervosæ dependere videtur: hæc enim Ventriculo vacuo admodum rugosa est, quo magis verò Ventriculus dilatatur, eo magis etiam rugæ istæ pereunt.

§. 17. Cibi hoc modo in Ventriculo aliquo modo fermentati ad *intestina* propelluntur. ut in iisdem fermentatio resolutoria absolvatur. Hunc in finem sub finem duodeni vel principium jejuni, duo affunduntur liquores, alter quosus magis, alter verò sulphureus salinus crispus, *succus* scil. *pancreaticus* atque *Bilis*. Duos hosce liquores contrariæ esse naturæ docuit *Sylvius*: *Succum* scil. *pancreaticum* esse *acidum*, *bilem* verò *alcalinam* & concurrentibus hisce duobus erit levem in intestinis effervescentiam, cujusope chylus mutetur in sal quasi tertium, sive *sal fæcibus volatile*, & feces chylo adhuc immixtæ præcipitentur. Sed hodie perpauci sunt, qui hisce figmentis fidem habent, præsertim cum succi pancreatici aciditas à nemine hæctenus probari potuerit. Nihilominus tamen hi liquores fermentationem in intestinis optimè promovent. Succus nimirum pancreaticus ejusdem est cum saliva naturæ, & prouti illa in ore fermentationem incipiebat, ita hic eandem continuat & hoc ipso chylum etiam fluidiorem reddit. Nec minus ad hanc fermentationem concurrat *Bilis*: quam prona autem sit

P

bilis



bilis ad fermentationem, eamque in corpore excitare queat, experientia ipsa docet: intemperantius enim effusa & cum rebus ad fermentationem aptis, concurrens, acerrimam fermentationem excitat, cujus effectus est causticæ acrimoniæ aciditas, uti cholera morbus testatur, viddi *Stablij Theor. Med. P. I. p. 229.* Præter duos hosce liquores, ad perficiendam magis fermentationem resolutoriam & facilitandum introitum in vasa lactea, tertius adhuc in intestinorum cavitatem infunditur, liquor scilicet glandularum intestinalium, qui ejusdem cum saliva & succo pancreatico naturæ esse videtur.

§. 18. Hæc autem ciborum intima resolutio summè est necessaria ob duas rationes & quidem primò, ut eò melius ex alimentis resolutis particule laudabiles extrahi & deindè ut eò commodius vasa lactea ingredi possint. An verò omnis chylus vasa ingrediatur lactea, diu disputatum fuit. Veteres credebant omnem chylum à vasis mesaraicis absorbere & ad hepar sanguinis officinam ferri: quæ tamen sententia à variis Authoribus & imprimis Bartholino multis scriptis refutata fuit, quam primum enim vasa lactea à *Casparo Asellio* Anno 1622 detegebantur, omnes serè Veterum castris relictis statuebant chylum tantum moveri per vasa lactea.

§. 19. De hujus tamen sententiæ certitudine non pauci dubitare ceperunt, & adhuc sunt qui dubitant, probabilius existimantes portico

portionem quoque chyli ferri per vasa mesaraica ad hepar. Rationes eorum sunt sequentes 1. quod animalia pennata omnia vasis careant lacteis & 2. flatus in horum intestina immixtus in vasa mesaraica penetret, vid. *Bohnij Circ. Anat. Physiol. p. 167.* 3. quod maxima vasorum mesaraicorum in intestinis copia, & quidem longè major, quam quæ privato intestinorum usui inservire queat, reperiatur: inprimis verò 4. venæ mesaraicæ copiosiores sint arteriis, ac earum frequentia & amplitudini arteriæ minus proportionatae sint, teste *Bohnio l. c.* 5. quod observatum fuerit continuum chyli stillicidium è vulneribus thoracis: manifesto indicio ductum thoracicum læsum fuisse: & homines nihilominus tamen per plures annos vixerint: memorabile hujus rei exemplum habet *Frid. Hoffm. Dissert. de Continuo Succo nutritij stillicidio è Thorace.* Similis ferè observatio occurrit in *M. N. C. Dec. II. Ann. VI. obs. 209. p. 417. de chylo per thoracis vulnus effluente.* Mulier scilicet quædam cultro in sinistro pectoris latere transfossa fuit, ubi per vulnus istud interdum effluxit chylus, & quando ægra cibis solidioribus usa est, spissior quoque fuit, si verò dilutiora alimenta assumsit, tenuis quoque & fluidus apparuit iste liquor albidus. Et *l. a. Anno VIII.* mentio fit abscessus thoracis per apertionem feliciter curati, postea verò successivè collecta fuit materia quædam albicans lacti simillima, quæ etiam diu evacuata est per foramen apertum citra

citrâ fœtorem. 6. Quod sanguis venarum mesaraicarum paulò post pastum chylo tinctus appareat: quibus 7. addunt, quod malè actum esset de genere humano, si vita à tam parvo filo, quale est ductus thoracicus, penderet.

§. 20. Quæ sane rationes, si æquo iudicio considerantur, manifestè probare videntur; non per vasa tantum lactea ductumque thoracicum, sed etiam per vasa mesaraica chyli portionem ferri. Si enim in pennatis omnis chylus à vasis recipitur mesaraicis, cur non concedamus in homine etiam à vasis mesaraicis copiosissimis portionem ejus recipi: & quem im finem adessent tot vasa, nisi usum publicum haberent? sed regerunt communiter, utique tam propter usum publicum, quam etiam privatum adesse copiosa ista vasa: publicum esse depurationem sanguinis per intestina, privatum verò intestinorum nutritionem: venas verò revahere sanguinem superfluum ad hepar, ut bilis ibidem secernatur. Sed hæc responsio locum haberet, si arteriarum & venarum numerus esset æqualis: cum verò venæ numero & amplitudine in super arterias longè superent, maximè probabile est, venas aliquid recipere, sive alii adhuc usui, quam revehendo solum sanguini, dicatas esse. Undè porro esset color sanguinis cinereus in venis mesaraicis post pastum, nisi chylus ipsi misceretur? Et cur homines non statim moriuntur, si ductus thoracicus latus est? quod tamen necessariò contingere deberet;



beret, si à parvo hoc filo vita nostra penderet. Cum verò hoc laeso nihilominus homines per plures annos superstites maneant, quod ex observationibus antea allegatis constat, non video quare, chyli portionem quandam in ipsas quoque venas mesaraicas recipi, adeò prætactæ negari debeat. Quamvis enim chylus in venis mesaraicis in homine non adeo manifeste ac in venis lacteis demonstrari possit, considerare tamen deberent contrariæ sententiæ Patroni, corpus humanum vivum undiquaque esse porosum & non solum per vias manifestas, sed etiam, ut ita loquar, cæcas humoribus transitum præbere: manifesta hujus rei exempla habemus, quod I. statim post pactum, imò in ipso statim pactus principio, quando cibo laudabilis nutrimenti assumimus, insigniter statim refocillemur & etiam si antea fuerimus maximè lassī & debiles, nihilominus tamen insignè virium augmentum sentiamus: quod sane minimè contingere posset, si ciborum horum pars laudabilior prius per Ventriculum & intestina vasa lactea, ductum thoracicum, venam subclaviam cordi infundi & per arterias ad universas corporis partes distribui deberet: probabilius enim longè est, per poros ventriculi portionem laudabiliorem statim ipsa vasa ingredi & hanc refocillationis subitanæ esse causam. Manifestè quoque talis refocillatio deprehenditur in statu morbofo, ubi homines maximè debiles, exhibito uno vel altero tantum Potiun-

culæ confortantis cochleari, statim alacriores redduntur. Novi hominem qui febre laborans adeò debilis erat, ut non nisi à duobus hominibus erigi posset, nil cernebat, non nisi confuse audiebat, & ob summum languorem linguam vix movere poterat, qui tamen dato vitro vini generosioris cum pane biscocto, elapsa dimidia hora non solum plenarium sensuum usum recuperabat, sed etiam solus è lecto surgebat. 2. Deindè etiam humorum transitum per vias minus manifestas maximè probat, continuus viscerum mador, qui sanè minimè deprehendi posset, nisi humores per vias hujusmodi occultas in cavitates, quibus viscera continentur, deponeretur. 3. Omnium autem maximè tales cacos meatus, evacuatio feri extravasati Asciticorum per purgantia fortiora probat; hæc enim tantam sæpè ejusdem copiam per alvum evacuant, ac si primitus in intestinis ipsis contenta fuerit. Generalis sanè & superficiaria corporis inspectio ad detegendas omnes vias & meatus minimè sufficit. Undè rectè Sydenham de Hydrope p. 620. inquit: *Licet enim diligenti in secandis cadaveribus inquisitione ac scrutinio maiora organa, quibus Natura imperagendis operationibus suis utitur, in conspectum veniant, vasaq; itidem nonnulla, per quæ succi ab his ad illos corporis partes transmittantur; quæ tamen hujus motus sit origo & causa primaria, oculi docere nequeunt. Neq; microscopium quodvis vel exquisitissimè elaboratum exiles istos meatus, per quos chy-*

lus

lus, e. g. ex intestinis in vasa chyli fer a transcoletur, vel per quos ductus sanguis per arterias derivatus in venarum oscula reducendus transmittatur, potest detegere. Quinimò sunt & alij ferè innumeri, iique magis adhuc affabre concinnati, meatus ac pori in hac miranda hominis compage, quos nemo hominum per somnium quidem vidit. Si E. per poros etiam si minutissimos & visum latentes, nihilominus humorum fit transcolatio, cur non etiam chylo introitum per poros in venas mesaraicas concederemus.

§. 21. Chylum aut potius alimentorum massam, cui chylus immerfus est, per intestinorum canalem promovet atque urget *motus peristalticus*, de quo supra jam dictum fuit, qui etiam hac ipsa sui contractione id efficit, ut alimenta eò melius cum affusis humoribus misceri & fermentatio absolvi possit: eidem fini etiam inserviunt *valvulae Kerkringij conniventes*, quæ chyli celeriores motum aliquo modo retardant, ejusque intimiores cum humoribus mixtionem promovent.

§. 22. Dum autem hæc massa alimentorum ita per intestinorum canalem longissimum promovetur, chyli portio per poros intestinorum exilia vasorum lacteorum ostiola, portio vero probabiliter ipsa quoque vasa mesaraica intrat & sanguini venoso miscetur. Dicta autem vasa lactea intestinis tantum tenuioribus, Duodeno, Jejuno & Ileo, minimè verò crassioribus, Cæco, Colo & Recto concessa sunt: quamvis



inter tenuia quoque ea reperiatur differentia, quod in duodeno non adeo copiosa sint, ac ileo: in jejunio autem copiosissima sunt, & citissime chylum recipiunt, & hinc etiam intestinum hocce, ideò quod respectu aliorum magis vacuum deprehendatur, *jejuni* nomen accepit: quæ verò in colo observata fuerunt vasa, lymphatica potius, quam vera lactea esse testatur *Verheyen Anat. Tract. 2. Cap. 13.*

§. 23. Ipsa autem vasa lactea sunt vascula tenuissima pellucida, uti reliqua vasa lymphatica, in mesenterio sita: ne verò facile lædantur, intra hujus duplicaturam continentur. Hæc chyli magnam portionem tempore chylicationis recipiunt, intermedio verò tempore lympham vehunt. Ne tamen contentus liquor ad intestina regurgitare queat, provida natura exiguis hisce vasculis valvulas copiosas, sub nodulorum figura apparentes, concessit.

§. 24. Dividuntur hæc vasa in lactea *primi* & *secundi generis*: illa sunt, quæ lympham & chylum ad glandulas, hæc verò quæ eundem à glandulis ad receptaculum vehunt. Glandulae scil. quamplurimæ majores & minores in mesenterio humano & brutorum reperiuntur, ad quas omnis chylus fertur, nullum alium ob finem, quam ut motus ejus & fluiditas conservetur, uti superius de *Lymphæ secretionē & motu* monitum jam fuit. Glandularum horum usus summus est, chylum enim non tantum, uti modo dictum est, movent atque promovent, sed

sed ejusdem quoque fluxilitatem conservant & spissitudinem ejus, ad quam maximè pronus est, præcavent. Undè quando tonus harum glandularum perit, chylus in vasis lacteis spissior redditus subsistit & stagnat, quam stagnationem non solum glandularum & abdominis intumescencia, sed & reliquarum marcor, verbo *Atrophia*, affectus infantibus maximè familiaris, presso pede sequitur. Quo verò eò magis glandularum tonus conservetur, nervi majori copia ad eas tendunt, quam quidem earundem magnitudo poscere videtur: in mesenterio enim plexus nerveos adesse numero septem, quinque scil. magnos superiores & duos minores inferius sitos, testis est *Willisius Neurolog. Cap. 25. & Vieussens Neurograph. Lib. 3. Cap. 5.*

§. 25. Chylus E. in glandulis hisce conquassatus & fluidior redditus per vasa lactea secundi generis ad *receptaculum chyli*, à loco *lumbare* dictum tendit, in quo fluidus admodum redditur: omnis enim lymphæ à partibus inferioribus reflua in receptaculum effunditur, & cum eodem miscetur: ex cisterna tandem tendit chylus per ductum thoracicum ad venam subclaviam, in quo itinere denuo lympham è thorace refluam recipit. Cum verò in ipso receptaculo nullæ reperiantur fibræ motrices, externo motore opus est. Præstant motum huncce & ascensum chyli promovent, pulsus arteriæ aortæ, motus diaphragmatis ac chylus à tergo affluens: ne verò è ductu thoracico in rece-

ptaculum relabi possit, hinc inde valvulæ, ascensum quidem chyli permittentes, descensum verò prohibentes posita sunt. Et sic chylus tandem in venam subclaviam infunditur, lymphamque gelatinosis particulis aliquo modo privatam novis iterum imbuunt, quæ hinc ad partes motu cordis propulsa veram atque proximam nutritionis materiam constituit.

## PUNCTUM IV.

De

*Modo Nutritionis.*

sive

*Materie Nutritivæ**appositione.*

S. I.

VETERUM monumenta si evolvimus, deprehendimus eos variis modis considerasse materiam nutrimenti proximam: quando enim ex vasis excidere volebat, ipsis *futurum alimentum* audiebat; insinuatam jam in poros & agglutinatum, *quasi alimentum* vocabatur: quando verò in ipsam jam partis substantiam abibat, *alimentum simpliciter* appellabatur. Hisce Arabes rem paulo aliter explicantes 1. *humorem innominatum*, 2. *rorem* 3. *gluten* & 4. *cambium* substituebant vid. *Wed. Physiol. Med.* p. 101. Sed cum entia præter necessitatem multiplicare non sit opus, rectius à Recentio-



CAP. IV. MEMBR. IV. ART. II. PUNCT. IV. 235  
rioribus hisce variis humoribus lymphæ nutri-  
tia, variis partibus, pro diversitate partium, in-  
structa substituitur.

§. 2. Hæc autem materia nutritia pulsu  
cordis propellitur cum reliqua humorum mas-  
sa ad omnes corporis partes, impellitur in po-  
ros partium, & in substantiam earundem con-  
vertitur: ita ut hoc modo neque attractrice, ne-  
que retentrice Veterum facultate opus sit. Ubi  
tamen notandum est 1. quod cuilibet parti pro-  
portionata aut conveniens apponatur materia,  
ossibus scil. sicciores sive terrestres, mollibus  
verò partibus humidiores. 2. quod iuxta pro-  
portionem & numero, quantum scil. unicuique  
parti necesse est, appositio fiat, ut scil. exinde  
iuxta partis conformatio resultet, vid. Dn. D.  
*Stablij Theor. Med. P. 1. p. 237.*

§. 3. Quo verò materiæ nutritiæ apposi-  
tio eò melius fieri queat, opus est ut partes  
nutriendæ, imprimis molles, iusto gaudeant to-  
no, id est, ut legitimè sint extensæ & ut pori sint  
patuli: si enim tonicus partium motus perit,  
sanguis vel impetu in partes ruit, ita ut sic quam  
maximè inflentur & nutritio nihilominus ces-  
set: vel partes prorsus contabescant, uti in ari-  
dura partium id contingit.

§. 4. Cum verò sæpius plus nutrimenti  
ad partes feratur, quam ad simplicem nutritio-  
nem requiritur, partes indè augentur & pingue-  
do generatur. *Augmentatio* autem ista sub se com-  
prehendit 1. illam quæ secundum longitudi-  
nem

nem contingit, donec homo justam acquisiverit staturam 2. eam, ubi partes iusta longitudine gaudentes, quoad crassitiem augentur. Illa potissimum dependet ab ossibus, quamdiu enim hæc augentur, homines quoque crescunt, ubi verò eorum auctio cessat, homines quoque non amplius crescunt. Durat hæc auctio plerumque ad annum usque vigesimum primum, in quibusdam vero ad vigesimum quartum usque. Quare verò hoc tempore auctio quoad longitudinem desinat, nulla ratio physica demonstrativa reddi potest, nisi forsan quis dicere vellet, homines ideò non semper crescere, ne deformitas à nimis procera statura oriatur: aut ossa tum temporis magis arida reddi, & cum homines tum temporis ad generationem apti fiant, illud quod corporis nutritioni inservire potuisset, in proli generationem impendi. Sed quamvis hæc causa allegari possit, fragilis tamen est, & nullius momenti, quæ hanc rem minimè exhaurit. Potius E. dicendum est, veram hujus rei causam esse meram voluntatem divinam, juxta quam unicuique animantium speciei certa corporis magnitudo assignata est. Quod si verò cuidam hæc ratio non arridet is meliorem tradat, me enim aliam nescire, ingenuè fateor. *Neg, verò (ut Sydenhamii Opusc. p. 95. de causa statorum paroxysmorum loquentis verbis utar) quisquam alius, quod sciam, in hac causa tam præclare se gessit, ut arcanum hoc opus naturæ satis enarrasse videatur. Ego Philosophi no-*  
*men*

*men non ambio, & qui titulum illum se mereri existimant, atq; me fortassis hoc nomine culpandum putabunt, quod in hac penetralia non irrumperere conatus sim: moneo illos, ut in aliis Naturæ operibus, quæ ubique nobis observantur, vires suas experiri velint, antequam aliis dicam scribant.*

§. 5. Circa auctionem quoad longitudinem adhuc notandum est 1. quod magna quoad longitudinem inter homines detur differentia, alii enim admodum proceræ, alii mediæ, alii minoris sunt staturæ. 2. quod homines, juniores imprimis, interdum paucorum mensium spatio admodum crescant, quamvis antea auctio fuerit non admodum sensibilis, undè nostrates dicunt, *der Knopff seye ihm gebrochen/ er schiesse auf wie ein Rohr.* Hoc sæpius contingit post morbos & imprimis febres, undè nata est vulgaris loquendi formula, *die Krancckheit habe ihn zimlicher massen gestreckt.*

§. 6. Auctio quæ secundum crassitiem partium contingit, potissimum à pinguedine, hinc indè in partes & interstitia musculorum se insinuante dependet: hæc autem pinguedo nil nisi maximè oleosa cum salibus permixta sanguinis portio est. Quomodo verò è Massa sanguinea secernatur, conceptu difficile est: *Malpighius* tamen detexit, eam ex propagaginibus arteriarum in *vesiculas tennes*, sive *sacculos ovaes* ipsis adhærentes, per *poros*, aut juxta *Haverum* per *glandulas adiposas* secerni ac tandem in spissiore substantiam concrecere. Quamvis au-  
tem



tem hanc spiffiorem acquisiverit consistentiam, facile tamen calore & motu denuo resolvitur, & per poros in venas & vasa lymphatica recipitur.

§. 7. Magna ejus quantitas exterius sub cute latet & totum ferè corporis habitum investit : hinc indè quoque non parva copia in interstitiis musculorum cernitur : renes totos investit, intestinis & mesenterio adhæret & omentum, intestina quoad maximam partem tegens, totum quantum adiposum est.

§. 8. Non tamen omnia subjecta ad copiosæ pinguedinis generationem apta sunt, dantur enim non pauci, qui etsi satis sint voraces nihilominus tamen semper macilentissimi manent : de hisce valet illud vulgi, wann man sie schon in das Fett eindunckte/ blieben sie doch immerfort mager. Causa hujus rei plerumque est calor respectu aliorum major & pulsus cordis auctior, undè particulæ pingues nimis resolvuntur & inprimis per transpirationem insensibilem avolant. Cui addi potest altera, quando nimirum vasa sunt ampliora & pori minores, ita ut parum materiæ pinguis in eos deponi possit.

§. 9. Usus pinguedinis varius est, principalis tamen est, ut tempore inediæ nutrimento sit corpori; liquefcit scil. denuò & per poros in vasa receptum partibus nutriendis apponitur : hinc etiam ratio petenda est, quare, qui morbis affliguntur, inediam diutius ferre que-

ant :

ant: pinguedo enim si non omnis, maximam tamen partem in Massam sanguineam redit & corpus interim nutrit. Simile quid contingit quoque in iis, qui in ediam diuturniorem pati coguntur: unde etiam in cadaveribus, morbis aut fame mortuorum, dissectis, nulla ferè pinguedo reperitur. Præterea quoque partes musculosas unctuosas suis particulis lubricas reddit & emollit, ut eò melius motui inservire queant: ac tandem interstitia musculorum replet, & æqualia reddit, sicque ad corporis venustatem non parum confert.

§. 10. Pari modo etiam in cavitationem ossium secernitur succus oleosus pinguis, pinguedine adhuc tenerior, qui itidem in parvis cellulis colligitur. Quis hujus sit usus diu disceptatum fuit, nec adhuc hodiè adeò liquet: probabile tamen videtur, eum per poros capitum ossium ad articulos exprimi, ut ibidem mucilagini, per *glandulas Haveri mucilaginosas* secretæ, mixtus oblinat ossa, ne continua attritione & motu frangantur & ad motum inhabilia reddantur, sed è contra facilius moveri queant. Hæc tamen ossium medulla majorem corpori præstare videtur usum quam pinguedo: hæc enim carere possumus, medulla autem ad motum ossium absolute necessaria est.

## ARTICULUS III.

De

*Vita & Sanitate.*

## §. I.

**E**X hæcenus dictis satis superque apparere potest, corpus nostrum ratione naturalis constitutionis non solum ad putredinem & promptam dissolutionem maximè pronum esse, sed & talibus nutriri, quæ ejusdem sunt naturæ sive eadem ferè facilitate putrescunt. Cum verò corpus diu absque actuali putredine subsistat & sanguis laxè tantum coherens & ad putredinem pronissimus, nihilominus in statu laudabili conservetur, necessario supponendum ab hocce conservatorio actu & Vitam & Sanitatem dependere.

§. 2. Quoniam E. in confesso est, corpus putredini maximè esse obnoxium & in eo plures heterogeneous contineri partes, quæ humores vitales inquinare non solum possint, sed etiam soleant, summa necessitas requirit, ut illæ promptè fecernantur & è corpore excernantur.

§. 3. Quem finem ut Principium corporis movens, sive Natura, eo facilius assequi possit, pulsû cordis (ceu causa motus humorum instrumentali) universam humorum massam quaquaversum per arterias ad omnes corporis partes propellit, & dum hoc ipso Humores

per:



per porosam partium substantiam trajiciuntur, non solum omnes partes heterogeneous, & actu jam corruptas, solidis partibus noxam minitantes, ab iisdem abstergunt, sed & ipsi fluiditatem & calorem acquirunt majorem, ita ut eò commodius per minimos poros transire queant.

§. 4. Quamvis autem labes partibus solidis imminens per hunc continuum motum præcaveatur, nihilominus tamen ipsæ humorum partes constituentes maximè alterantur, & plures hoc ipso motu ita atteruntur, ut postmodum prorsus inutiles evadant: aqua in vaporem resolvitur, terra in sal mutatur, hoc cum pinguedine in Sal volatile acre abit &c. cum verò hæc omnia corpori conservando minus apta sint, Natura eadem in variis colatoriis separat & è corpore expellit.

§. 5. Serum E. nimis halituosum cui partes sulphureæ & salinæ maximè subtiles & acres immixtæ sunt, ad peripheriam corporis pulsus cordis promotum, per poros cutis excernitur: quod verò huic quoad subtilitatem aliquo modo cedit, in renibus secernitur & per ureteres ad vesicam latum ibique collectum, tandem per urethram ejicitur. Partes autem sulphureæ crassiores & salinæ in massa sanguinea nihil utilitatis præstantes, in hepate sub forma bilis secretæ, partim ad intestina, partim ad vesiculam felleam fluunt, ut postea cum reliquis impuris partibus ad intestina, ceu communem cloacam depositis, è corpore excernantur. Cum verò

Q

par-

partes terreo salinæ cum paucis pinguibus & aquosis interdum concreſcant, & concretum magis vel minus mucosum, ſed inutile & excrementitium, conſtituant: hoc quoque concretum promptè è corpore excernendum eſt, ne & ſecretiones alias turbet & humores reliquos nimis ſpiſſos reddat. Hujus ſecretio poſtiſſimum in naribus in Ventriculo & inteſtinis, ut & in veſica contingit. Craſſiores inteſtinorum feces, ex alimentorum partibus recrementitiis, bile aliisque partim ſeroſis, partim verò mucosus ad inteſtina depositis partibus conſtantibus quotidie excernuntur. In feminis autem, cum foetui gerendo & nutriendo deſtinatæ ſint, & ideò etiam plus ſanguinis acceperint, ſanguis ſingulis menſibus per genitalia excernitur, ne dum nec utero gerunt, nec infantem lactant, in corpore reſtitans gravibus incommodis anſam præbeat.

§. 6. Humores E. vitales cum hoc modo continuo à partibus excrementitiis liberentur & puriores reddantur, conſervando & nutriendo corpori apti evadunt, ac in variis colationibus laudabiles humores conſervando corpori, infanti nutriendo & generationi inſervientes largiuntur. In cerebro nimirum fluidum quoddam ſubtiliſſimum ſecretum per nervos in univerſum corpus diſtribuitur, quod cum nervos non ſolum irriget, ſed eoſdem turgidos reddat & continuo aliquo modo tenſos ſervet, hoc ipſo efficit, ut omnes partes, ad quas nervi tendunt

dunt, in perpetua quadam extensione serventur, ita quidem, ut per eorundem patulos poros humores commodè transire queant, & partes ad sensum & motum semper apti sint. In ore verò & partibus ipsi vicinis continuò secernitur liquor salivalis, masticationis tempore majori copia affluens & ciborum resolutioni & fermentationi maximè inserviens; quocumque etiam convenit liquor è pancreate ad intestina fluens. In mammis post partum chylus, laxius cum reliquis humoribus cohærens, per glandulas mammarias secernitur, quem sub lactis nomine infans è mammis ope suctionis extrahit. Tandem verò in testibus laudabilis maximè lymphæ portio, generationi dicata, secernitur & per vasa deferentia ad vesiculas seminales lata ad coitus usque tempus asservatur.

§. 7. Massæ autem humorum universali semper inhæret portio laudabilis nutritia, quam lympham Medici appellant, quæ pulsu cordis fortissimo cum humoribus ad partes propulsa, earundem poros ingreditur, & id quod per labores & motum è corpore absumptum erat, reparat. Ut itaque ex hisce appareat, vitam quidem consistere in continuo motu, sed hunc tandem instrumentaliter se habere & ope hujus fieri remotionem inutilium & appositionem utilium, ac hoc ipso destructionem corporis impediri. Quare horum respectu vita describitur potest: *quod sit corporis ad putredinem maximè propterea per motum sanguinis circulatorii ut & secretion-*

Q 2 nes



*nes ac excretiones, laudabiliumq; & nutritiarum partium appositionem, in integritatis statu conservatio.* Mors vero est destructio & resolutio corporis à defectu motus sanguinis ac secretionum & excretionum cessatione pendens

§. 8 Quando E. omnes corporis partes rite sunt constitutæ, motus sanguinis circulatarius ad omnes partes æqualis & motus partium mollium tonicus in omnibus partibus est proportionatus, & Secretiones ac Excretiones legitimo modo procedunt, verbo, omnes actiones tam animales, sensus ac motus, quam vitales, pulsus & respiratio debito vigore, decentique ordine fiunt, corpus non solum vivum, sed & sanum dicitur: quando verò actiones corporis justum hunc ordinem deferunt, ad statum p.n. fit inclinatio, & quo major à naturali statu fit recessus, eò majus postmodum periculum œconomix animali imminet, eoque propius corpus actuali destructioni est.

§. 9. Quibus ritè ponderatis facile apparet, quam fragilis imò falsa sit definitio vulgaris sanitatis, *quod scil. sit potentia exercendi actiones*: quamvis enim hæc definitio quoad actiones animales & voluntarias, quas pro lubitu exercere vel omittere possumus certa atque vera sit: intuitu tamen actionum vitalium falsa est: quippe quæ non solum animalibus priores sunt, sed & indefinenter absque ulla intermissione non solum fiunt, sed etiam fieri debent. Quare rectius meo quidem iudicio sentiunt,

qu.

qui sanitatem in ipsarum partium integritate & actionum omnium conveniente administratione consistere dicunt. vid. Dn. D. Stablij Theor. Med. P.I. p. 13. de Vita. qui prolixius legere cupit, evolvet elegantissimam modo citati Dn. Stablij Dissertationem de Vita.

§. 10. Ultimo loco adhuc notandum esse consultum duco, me non satis mirari posse, cur plerique Recentiorum de Vita & Sanitate vel prorsus non vel superficialiter aut obiter tantum, tanquam de re non adeò necessaria, agant: cum tamen *Medicinæ subjectum sit corpus vivum & sanabile* & hinc summa necessitas exactiorem harum rerum tractationem & inquisitionem postulet? quomodo enim quæso Medicus Naturæ commodè succurrere potest, si nescit quid proprie sit vita & sanitas? si ignorat instrumenta quibus Natura ad conservandam vitam & sanitatem utitur? si nescit modum conservationis hujus? in quibus tamen vera Medica Theoria & Praxin maximè necessaria unicè consistit. Sed hujus rei nullam aliam causam esse existimo, quam perversum illum novitatum, in moderna Medicina occurrentium, amorem, quo, plerique ducti, res minus necessarias, imò inutiles, summo studio tractant, maximè vero necessarias, summeque utiles, tanquam ad Medicinam minus necessarias, aspernantur: undè etiam ipsi Tyrones, meliora non intelligentes, reducti, & in istis alienis oleum & operam perfruentes, dum hic Physicam, ille Botanicam, alius

Anatomiam, alius Chimiā (quæ quidem in Medicina debito modo applicata fructu suo non carent) nimis quam par est, tractat, summe necessaria plerumque negligunt: ita ut salva veritate asseri possit, nos in tanta Medicorum copia multos quidem præstantissimos Physicos, Mathematicos, Physiologos, Botánicos, Anatomicos & Chymicos, sed paucissimos Medicos habere. Deploranda sanè hæc res, & omnium in Medicina occurrentium malorum causa est: nec etiam ferè ulla speranda medela est, cum meliora monentes & proponentes nil nisi odium reportent. Sed dabit forsā Deus meliora tempora, ac Medicos cordatos sufficientibus instruet donis, ut, quam in salutem generis humani concessit saluberrimam artem Medicinam, sensim sensimque ab alienis liberare queant.

## CAPUT V.

De

### Differentia Corporis & Actionum, secundum Ætates, Sexum & Temperamenta.

**I**Nter corpora humana magnam esse differentiam, actionesque etiam diverso modo procedere experientia quotidiana satis superque docet. Talis autem differentia potissimum in Ætatibus, Sexu & Temperamentis apparet, quare de hisce



hisce singulis, cum in Medicina magni sint usus, tribus distinctis membris agemus.

## MEMBRUM I.

De

*Ætate.*

## §. I.

**Æ**Tatum quidem varie hinc indè in scriptis Medicorum occurrunt divisiones, quarum tamen optima est, si ætates juxta septenarium dividuntur numerum: quæ verò Germanicis rythmis continetur ætatum divisio, ubi qualibet classis decem complectitur annos, v. g. Zehen Jahr ein Kind / zwanzig Jahr ein Jüngling / dreissig Jahr ein Mann &c. non adeo accurata est, nec hinc etiam à Medicis attenditur.

§. 2. Sunt E. præcipuæ ætates: *Infantia, Pueritia, Adolescentia, Juventus, Ætas Virilis, Consistens, Senectus viridis, Media & Decrepita*. *Infantia* primo absolvitur septenario: *Pueritia* secundo: *Adolescentia* tertio, aut tertio cum dimidio, anno circiter vigesimo quinto: *Juventus* quinto: *Ætas virilis* sexto: *Consistens* septimo: *Senectus viridis* octavo: *Media* nono: *Decrepita* verò reliquo vitæ tempore. Omnes tamen hi ætatum gradus commodè in tres dividi classes possunt: *Incrementum* scil. *Consistentiam* & *Decrementum*: ita ut *Incrementum, Infantiam, Pueritiam & Adolescentiam*

ad annum circiter vigesimum quintum: *Consistentia, Juventutem, Ætatem virilem & Consistentem*, ad annum circiter quinquagesimum: *Decrementum* verò *Senectutem Viridem, Mediam & Decrepitam* sub se comprehendat.

§. 3. In omnibus autem hisce ætatibus gradibus diversæ sunt corporis actiones & præterea insignes corporis & actionum fiunt mutationes. In *infantia* nimirum sive primo septenario completo dentes primores excidunt, quos secundo septenario reliqui sequuntur, novique subnascuntur. Corpora in hisce ætatibus sunt admodum humida, fibræque flexiles & sensibiles. Absoluto secundo septenario insignis in sexu masculino fit mutatio, non vocis tantum acutæ in graviolem, sed & reliqui totius corporis, fibræ scil. corporis redduntur firmiores, pili in pube erumpunt, testes cum scroto, prioribus septenariis admodum contracto, magis se manifestant: membrum antea flaccidum jam successive crescit & rigidum quoque redditur: motus humorum fit major, & corpus magis incalescit: tonus partium mollium firmior est: semen elaborari incipit & adolescentes ad venerem prout redduntur ac barbæ quoque primordia apparent. In sexu verò feminino præter pilos in pube apparentes, menses è genitalibus profluunt, aut saltem molimina adsunt: mammæ quoque sensibilibus crescunt, in quibusdam quidem cum titillatione, in aliis verò cum aliquali dolore. Et sic

sic homines utriusque sexus hocce tertio septenario ad generationem apti redduntur, partesque ei inservientes firmanentur. Imo ipse quoque animus mutatur, qui enim puerilia superioribus septenariis tractaverant, iisdem relictis ad seria jam se convertunt.

§. 4. Durat hic status usque ad finem *Adolescentiæ* sive *Incrementi*, ubi notabilis illa contingit mutatio, quod homo qui hætenus sensim sensimque, quoad longitudinem auctus fuerat, jam crescere desinat: ipsa tamen ossa atque reliquæ partes majorem acquirunt soliditatem majusque robur, ac quoad crassitiem mollium partium major jam sit auctio. Hoc ipso quoque tempore homo, qui hætenus sibi soli quasi vixerat, aliis quoque jam vivere incipit, dum sociam nactus prolem generat & aliis quoque in rebus civilibus inservit. Durat hic corporis & animi vigor per totam Juventutem & Ætatem virilem & in quibusdam quoque per ætatem consistentem, in multis tamen etiam ante hanc jam fatiscere incipit. Ideò autem hoc robur hominibus per notabile tempus concessum est, ut scil. prolis generationi eò melius vacare possint. Ultimo *ætatis consistentis* septenario in quam plurimis jam notabilis virium observatur imminutio: & quidem inprimis in iis qui lautiore victu usi sunt, corpusque laboribus minus exercuerunt, alacritas & promptitudo actionum corporis perit, generationis opus tardius procedit, semen

Q s

immi-



imminuitur, membrum virile flaccescit & scrotum fit pendulum. In feminis mensium, qui per quinque ferè septenarios fluxerant, contingit cessatio, & quidem plerumque circa medium septimi septenarii vel ad summum circa ejus finem, eoque ipso ad conceptionem non amplius sunt aptæ. Hoc ipso quoque ultimo septenario in plerisque augmentum structuræ corporis desinit, quod exinde potissimum apparere potest, quod si quid in structura resarciendum est, id longè tardius procedat, quam in Adolescentia & principio Consistentiæ: undè vulnera partium mollium & fracturæ ossium quæcunque in senibus longè tardius, quam in junioribus curantur. Cum E. hoc ipso tempore Principium vitale sive Natura, sensim sensimque à sui corporis ulteriori auctione desistat, quid mirandum est, si in feminis mensium fluxus cessat: feminæ enim hætenus conceptioni & nutritioni foetus destinatæ erant, & hunc in finem sanguis ad uterum dirigebatur ac hic ad illum recipiendum respectu vasorum admodum dispositus erat. Cum vero hoc ipso tempore Principium corporis vitale à sui ipsius corporis ulteriori structura abstineat & simplici tantum nutritione contentum sit, non est mirandum si etiam ab alieni corporis, foetus scilicet structura, & à directione quoque sanguinis ad uterum, quæ alias ad nutriendum foetum requirebatur, abstinet. Quamvis autem hoc ipso tempore corpus sensim fatiscat, judicium ta-

men

men adhuc satis promptum est, præsertim in  
 iis, qui id diu variis rebus exercuerunt, me-  
 moria autem, quæ in *Adolescentia* & *Juventutis*  
 principio optima erat, labilis jam est. Si verò  
 judicium, quod *Ætati* Consistenti ferè proprium  
 est, præmaturè in junioribus observatur, bre-  
 vioris vitæ indicium est: cum enim vita no-  
 stra certis periodis, quarum qualibet suas pro-  
 prias habet mutationes, absolvatur, rationi sa-  
 ne obvium est, quod, quo breviori tempore  
 illæ periodi absolvantur, eò brevior quoque  
 universæ vitæ sit ambitus: unde certissimum  
 quoque illud vulgi est, *das Kind seye zu ver-  
 ständig / es werde nicht lange leben*: quod si  
 non contingit, tales præmature judicio præditi,  
 reliquo vitæ tempore, quo judicium vigere  
 debet, præ cæteris magis sunt stupidi & ad ju-  
 dicandum inepti.

§. 5. Appetente *Senectute* notabilior actio-  
 num corporis observatur languor, partes mol-  
 les sensim marcescunt, rigidiores & ad motum  
 voluntarium magis ineptæ redduntur: sensuum  
 vigor perit, pulsus observatur languidior, secre-  
 tiones & excretiones tardius procedunt, undè  
 remanentibus in *Massa sanguinea* partibus se-  
 rosis multum muci in corpore generatur, ap-  
 petitus plerumque imminuitur, somnus est bre-  
 vis & à re levissima interrumpitur. Quibus  
 addendum est, quod tempore senectutis dentes  
 vel excidant vel nimio usu ita atterantur, ita  
 ut homines reddantur edentuli: pilorum quo-  
 que

que casus in multis & calvities sequitur. Immo ipse quoque animi vigor perit, memoria immittitur & iudicium, ita ut in decrepita senectute pueris ferè, quoad iudicium, similes reddantur: unde etiam proverbium, *senes bis sunt pueri*, originem traxit. Hæ alterationes tam diu durant, donec vel affectibus soporosis vel Marasmo febili moriantur.

§. 6. Quando autem hætenus aliquoties alterationum quoque vigoris animi mentio facta fuit, nemo existimet animam rationalem ipsam mutari, hæc enim quamdiu corpori inest, immutabilis est. Sed hæ alterationes potissimum conjunctionem animæ & corporis, & ex hac unione resultantem vitam naturalem & cum hac conjunctas actiones respiciunt. Ad has autem actiones absque omni dubio, Intellectus Iudicium, Memoria aliaque spectant: quod si verò quis de hujus asserti veritate dubitare, hæcque omnia soli animæ rationali tribuere voluerit, is rationem reddat, curebrii nullum de rebus propositis firmum iudicium ferre queant? cum tamen anima ipsa immaterialis ebrietatis minimè capax sit; item, cur instrumentis animalibus actionibus inservientibus læsis, stupor vel deliria sequantur? & cogitationes ipsæ pervertantur? quod tamen minimè fieri deberet, si hæc omnia, soli animæ rationali competere. Cum E. omnia hæc ab animæ & corporis conjunctione dependere ipsa sana ratio dicat & experientia quoque confirmet, sanæ rationi quoque obvium erit, ad actiones



nes rationales benè peragendas corpus quoque  
 ceu instrumentum animæ legitimè dispositum  
 esse debere: quoniam autem hocce variis alte-  
 rationibus, in Incremento, Consistentia & De-  
 cremento obnoxium est, necessario quoque o-  
 perationes illæ rationales variis modis in diver-  
 sis ætatum gradibus mutari debent.

§. 7. Hujusmodi ætatum variationes, jux-  
 ta septenarium annorum numerum contingen-  
 tes, à Veteribus jam observatæ, & anni hi se-  
 ptenarii *climacterici*, ἀπὸ τῆς κλίμακῃς, scala vel  
 gradu vocati fuerunt: ideò quod homines gra-  
 datim & per scalas quasi ad suam scandant per-  
 fectionem & eodem modo iterum descendant.  
 Ex hisce annis climactericis periculosi admo-  
 dum æstimati fuere octavus, nonus & decimus  
 & inprimis ultimus cujus initium est finis anni  
 sexagesimi tertii, quem ideò etiam annum *Cli-  
 mactericum magnum* & *Heroicum* vocarunt, quo-  
 niam ad mutationes instar strenui herois effi-  
 ciendas aptus est. Quare autem hic ultimus  
 majus portendat periculum, nulla alia videtur  
 ratio, quam quod ætas ultima sive decrepita  
 jam præsto sit & ultimus quasi vitæ terminus;  
 vita enim, teste S. Scriptura, ultra septuagesimum  
 vel octugesimum vix extenditur annum: imò  
 paucissimi sunt, qui hunc terminum attingunt,  
 & plerique ante eum moriuntur. Cui addi pot-  
 est, quod metus & tristitia, dum plurimi hunc  
 annum metuunt, aliquid ad vitæ periculum  
 conferre possit. Hi autem anni climacterici  
 pro

pro subjectorum diversitate maximè variant : ita qui cito adoleſcunt, cito quoque ætatem conſiſtentem abſolvunt, ſicque etiam citius reliquorum annorum climactericorum mutationes experiuntur.

§. 8. Quamvis autem ex hætenus dictis appareat, & experientia quoque quotidiana ſatis ſuperque demonſtret, hominem ſenſim ſenſimque marceſcere & tandem mori, nulla tamen ſufficiens Phyſica cauſa, *cur homo naturaliter moriatur* allegari poteſt : quæ enim de marcore, flacciditate, organorum enervatione ac ad motum inhabilitate vulgo proferuntur, tanti ſanè momenti non ſunt, ut hanc quæſtionem ſolvere queant. Nam cum corpus diu ſatis ad ſexageſimum & centeſimum quoque annum optimè conſervetur, primi quoque homines mille ſerè annos vixerint, ac præterea ipſa membra per labores magis firmentur & ita ad reſiſtendum & diuturniorem durationem aptiora reddantur, facile apparet marcorem & enervationem membrorum fruſtra allegari. Cui accedit, quod corpus à ſtatu minus perfectò tendat ad perfectiorem, inque eo aliquandiu ſubſiſtat, cur E. non ſemper ad maiorem tendit perfectionem aut eandem perfectionem continuo conſervat, cum tamen alimenta, quæ alias corpus nutrire & in integritatis ſtatu conſervare ſolent, nihilominus ſemper præſto ſint : cur E. tendit potius ad deſtructionem & vigorem ſenſim ſenſimque perdit ? Si itaque marcor & ener-

enervatio membrorum in causa sunt, cur juniores moriuntur, in quibus nullus talis marcor observatur, cur alii morbis moriuntur, quos aliquoties feliciter superarunt? & cur denique senes, etsi membra habeant satis marcida atque rugosa, vitam non statim amittunt, sed non obstantibus rugis & marcure ad centesimum sæpius annum vivunt, & tandem non marcure, sed aliis morbis intereunt? sine dubio E. non in ipso corpore ejusque partibus causa mortis, sed potius in alia quadam re quaerenda est.

§. 9. Cum itaque ex hætenus in Physiologia traditis, corporis conservationem à principio quodam interno, quodcunque demum illud sit, institui, materiam verò ad motus, in corpore humano ordinario fieri solitos, instituentis minus aptam esse, & vitam insuper ipsam ab illo principio unice dependere, satis superque constare existimem, sana quoque ratio distitit, ab eodem principio, motus ad vitam conservandam necessarios instituentem, & juxta leges præscriptas agente, mortis causam derivandam esse. Sed nova hic statim oritur difficultas, *cur nimirum principium illud agens corpus, quo ceu instrumento utitur, non semper in integritate sua conservet*, cum tamen antea diu illud conservaverit? cur, cum alimentis necessariis non destituatur, corpus non semper nutriat ejusdemque vigorem conservet, sed certo tempore ab illa agendi potentia aliquo modo remittat ac tandem prorsus desistat? Ratio sanè *physica*



physica nulla allegari potest, quæcunque demum illa sit. Sola E. voluntas divina, quam homines ob lapsum mori iussit, unica mortis causa est: cum enim principium illud corporis unice juxta leges præscriptas agat ac vires agendi à solo quoque Deo accipiat, facile apparet, hominem, si Deus vires principio agenti (quocunque demum ætatis cursu id contingat) subtrahit, necessario mori debere: & hinc etiam causa præmaturæ, vel in ultima tandem senectute accidentis mortis unice à voluntate divina petenda. Quare hætenus traditis ritè consideratis certissimum est & manet, *nullam solidam rationem reddi posse, cur homo naturaliter moriatur?* Qui prolixius de hâc relegere cupit, evolvat elegantissimam & doctissimam Dn. D. Stablij *Dissertationem de Mortis Theoria Medica*. Conf. *ejusdem Theor. Med. P. I. p. 73. & P. II. p. 20. & seq.*

## PUNCTUM II.

De

*Sexu.*

§. I.

Quamvis utrumque corpus masculinum scilicet & femininum iisdem constet principiis materialibus, *aqua, pinguedine & terra* plus vel minus *salina*, insignis tamen nihilominus in mixtione istarum particularum & partibus indè resultantibus, deprehenditur differentia: cum  
enim

enim fibræ ceu prima partium stamina in viris ordinariè sint firmiores, robustiores & respectivè duriores : eædem in feminis molliores sunt & teneriores, manifesto indicio, aquam reliquas partes constituentes in feminis superare : undè etiam reliquæ partes corporis ex fibris compositæ flaccidiores ad tactum sunt & debiliores : cum è contra virorum partes inprimis musculosæ firmæ & compactæ sint, majorique hinc robore polleant.

§. 2. Ob hanc ipsam fibrarum debilitatem neque pulsus cordis adeò est vegetus neque motus tonicus reliquarum partium tanto robore gaudet, uti in viris : undè etiam major in porosam partium substantiam humorum copia admittitur, quæ cum à motu tonico repelli nequeat, carnem flaccidam reddit : cum è contra habitus corporis in viris ob majorem fibrarum tensionem longe densior & ad tactum durior sit.

§. 3. Non obstante tamen hac fibrarum mollitie, feminæ admodum sensibiles sunt, & ac ipsa viros maximè superant : undè etiam ad fortiores commotiones & graviores morbos sunt pronissimæ, quod exindè potissimum apparet, quod feminæ hypochondriacas spasmodicas commotiones, ad excutienda incommoda debiti progressus sanguinis tendentes longè magis sentiant, quam viri. Imò in ipso quoque nimio tantus ac in viris non sentitur vigor : viri enim constantes magis sunt, animoque

alacriori præditi, nec facile quibusvis rebus moventur: cum è contra feminæ animi affectibus maximè obnoxia sint, & in iis facile excedant: ad iram enim levi causa commoventur: in gaudio & amore mediocritatem raro servant: metu facillimè percelluntur, ac in tristitia modum servare nequeunt: unde etiam respectu virorum longè major copia feminarum melancholicis tentatur deliriis. Animos pariter sunt admodum inconstanti, undè ab uno extremo ferè semper pergunt ad alterum. Ab hac ipsa animi imbecillitate dependet etiam arrogantia & superbia, feminis plerumque magis quam viris familiaris. Præterea etiam accotium atque venerem magis pronæ sunt & nonnunquam quædam proscripta omni verecundia, quæ tamen feminis ob animi meticulositatem magis quam viris propria est, ipsos viros ad sui compressionem invitant: quædam verò de siderium hocce ardens ob verecundiam suppressum mentes furore corripiuntur uterino.

§. 4. Nemo tamen putet me falso hæc de mulieribus tribuere, dicta enim experientia quotidiana comprobatur: non tamen ideò culpanda sunt feminæ ac si ad vitia præ viris proniores sint: naturalis enim causa hic subesse videtur, generationis scil. negotium: cum enim femina fœtum in utero gerere & nutrire debeant, necessario quoque ad amorem & res jucundas magis pronæ esse debent, quoniam generationis fundamentum est amor. Meticulositas



sæ autem sunt, quoniam non sibi ipsis tantum,  
 sed etiam foetui, tanquam thesauro pretiosissi-  
 mo, quem in utero gerunt vel gerent, prospice-  
 re debent, & quoniam facile causæ externæ læ-  
 sionem foetui inferre possent, ideò non sine ra-  
 tione meticulosæ sunt. Ad iram maximè pro-  
 næ sunt, inprimis tempore graviditatis & qui-  
 dem non sine ratione : uti enim qui rebus ar-  
 duis intentus est, à quovis impediante & tur-  
 bante ad iram facilè commoveri potest, ita  
 quoque non est mirandum, si feminæ quorum  
 natura in nutriendo foetu tanquam re magni  
 momenti, occupata est, facilè ad iram commo-  
 ventur. Otium amant, ne ob fortio rem mo-  
 tum damnum inferatur foetui. Quamvis au-  
 tem hæc animi pathemata inprimis graviditatis  
 tempore observentur, nihilominus tamen  
 etiam extra graviditatis tempus ab iis immunes  
 non sunt, sed semper ad eadem inclinant, quo-  
 niam à Natura ad nutritionem foetus destinatæ  
 sunt. Manifestat se hac destinatio in parvis  
 adhuc puellis, quæ statim nil nisi pupulas suas  
 tractant, puerperia instituunt & quæ sunt alia;  
 cum è contra pueri equos, aut saltem horum  
 simulacra, canes, libros, arma &c. magis ament,  
 & hoc ipso manifestent, se ad talia natos esse. Si  
 verò cuidam allegatæ rationes non placent, is  
 meliores ex particularum, variis modis *titillan-*  
*tium, irritantium, vellicantium, lancinantium, pun-*  
*gentium, rodentium, stimulantium, &c. doctrina*  
 roferat.

§. 5. Ad Plethoram præ viris pronæ sunt feminae cum enim non tantum respectu foetus nutriendi plus sanguinis obtinuerint, sed etiam mollioris sint habitus ac vitam insuper ament otiosam sive sedentariam, faciliè sanguinis copia in corpore augetur.

§. 6. De differentia utriusque sexus respectu partium genitalium, de lacte, de mensibus, de semine masculino, de ovulis non opus est, ut h. l. verba faciam, cum partim superioribus capitibus de iis actum fuerit, partim inferius de Generatione adhuc agetur.

## MEMBRUM II.

De

### *Temperamentis.*

§. I.

**L**atissimus hic de *Temperamentis* differendi seclis aperit campus, quæ etsi à quamplurimis Recentiorum parvi pendantur, revera tamen usum in Praxi habent insignem : quod Veteres jam agnoverunt, undè quamplurima de *Temperamentis* in eorum reperiuntur scriptis. Optandum tamen fuisset, ut affectæ eorum nimiarum prolixitatem vitassent, & multa, *Temperamentorum* doctrinæ obscuritatem affundentia, omisissent: propter abusum tamen verus usus non est negligendus : si enim ab Astrologorum nugis *Temperamentorum* doctrina repurgata fuerit, non sine insigni usu lectorem dimittet.

§. II.

§. 2. Veteres, cum quatuor *primis qualitatibus*, calido, frigido, humido & sicco universam Medicinam superstruerent, hasce quoque ceu fundamentum Temperamentorum supponebant: hinc si qualitates hæ juxta *proportionem arithmetica* miscebantur, temperamentum *ad pondus*; si verò juxta *Geometricam*, temperamentum *ad justitiam* oriebatur. Ex harum porro qualitatum mixtura duplex, temperamentum scil. *mixti & viventis* oriebatur: illud definiebant *qualitatem ex mutua actione & passione primarum qualitatum ortam*: hoc vero *qualitatem corporis humani viventis à sanguine & spiritibus actu calidis dependentem*. Respectu harum primarum qualitatum postmodum temperamentum dividebant, in calidum, humidum, frigidum & siccum: ex hisce composita oriebantur, *calidum* scil. & *humidum* sive *sanguineum*: *calidum & siccum* sive *Cholericum*: *frigidum & humidum* sive *Phlegmaticum* & *frigidum & siccum* sive *Melancholicum*.

§. 3. Hæc autem temperamenta erant universalia sive toti corpori communia, præter quæ singularem adhuc singulis partibus tribuebant temperiem, *cor* scil. erat *calidum & humidum*, *cerebrum* *frigidum & humidum*, *ossa* *frigida & siccum* &c. ex qua temperie viscerum diversa nascebatur postea decantata admodum in Veterum Scholis *viscerum antipraxis*, hepatis scil. *calidus*, ventriculi *frigus* &c. à qua morborum variorum petebant originem.



§. 4. Cum verò alii, *Astrologorum* castra sequentes, ab hisce qualitatibus primis non omnia temperamentorum phænomena derivari posse, existimarent, ab astris auxilia petebant, & horum influxui temperamentorum varietatem adscribebant, undè temperamenta *Jovialia*, *Saturnina*, *Martialia*, *Solaria*, *Venerea* &c. oriuntur.

§. 5. Verum enim verò cum sola partium mixtio ad Temperamentorum explicationem minimè sufficiat, nec etiam viventis temperamenti juxta veteres consideratio rem exhaustiat, potius cum *Dn. D. Stablio Dissert. de Temperamentis* temperamentum definiendum esse existimo: quod scilicet sit legitima partium corporis solidarum & fluidarum inter se mutua proportio, quarumque debitus motus, depuratio atque conservatio per secretionem & excretionem in fluidis & debita flexibilitas in solidis conservatur.

§. 6. Requiritur autem ad temperamentum mutuum fluidarum atque solidarum partium concursus, exindè apparere potest, quod etiam si humores legitime sint constituti, facile tamen alterationem subeant, & aliam quasi naturam induant, si læso partium mollium tono sanguini per quosvis earundem poros non conceditur transitus: secretionem & excretionem, ad vitam conservationem admodum necessariam, exindè impediuntur, ita ut necessario alia humorum crasis sequi debeat.

§. 7. Cum itaque adhuc hodie non in sanguine tantum, sed & in partibus solidis manifestam deprehendamus differentiam & hinc dependentem temperamentorum diversitatem, dum alia corpora sunt succulenta & calida, alia exsucca quasi & frigida, alia humida & frigida, alia verò macra aliquo modo & calida. Veterum divisionem in *Temperamentum Sanguineum*, *Cholericum*, *Phlegmaticum* & *Melancholicum* retinebimus, atque de singulis seorsim agemus, ut exindè appareat, quænam in singulis sit corporis & actionum differentia. Cum verò temperamenta quoque in alia convertantur & mixta quoque reperiantur, de eorundem *conversione* & *mixtione* ultimo loco nobis quoque sermo erit.

## ARTICULUS I.

De

### *Temperamento Sanguineo.*

§. I.

**T**emperamento Sanguineo meritò primum tribuimus locum, quippe quod præ ceteris magis temperatum & homini quoque magis naturale est. Corpus nostrum ex aqua, pinguedine & terra mixtum esse, ex *Cap. I. de Elementis* patere potest, quare etiam ex harum diversa mixtione temperamentorum diversitatem aliquomodo dependere sanæ rationi congruum est. Quo verò appareat quænam partium fluidarum

darum & solidarum in sanguineo temperamento sit proportio, ejusdem historiam præmittimus ac postea ætiologiam subjungemus.

§. 2. Sanguinei, quoad externum habitum corporis & structuram partium mollium considerati, *structuram* non solum habent *laxam* & *porosam*, sed & *turgidam* partium consistentiam, aliquo modo *floridam*, *calidam* & *mollem*: per quam *vasa* transeunt *exigua*: *sanguis* est admodum *floridus* & *fluxilis* ex multa aqua & pinguedine, pauca verò terra constans, & per hujusmodi vasa & poros facilem transitum inveniens: pulsus est moderatus & æqualis: & ideò etiam *Secretiones* & *Excretiones* in iisdem promptissimè succedunt. Appetitus optimè constat & cibos etiam facile digerunt. Quoad animi mores, sanguinei animi sunt liberi, hilares, alacres, misericordes, fideles, liberales, securi, voluptatibus dediti, nimis curis non facilentantur, otium magis quam labores nimios amant, in periculis veris timidi, anxii & consilii inopes, superatis verò iisdem gloriosi: ad calliditatem minus proni, sed potius aperti & arcanorum propalatores.

§. 3. In quorum phænomenorum causas si inquiremus, facile apparet, habitum corporis ob motum tonicum aliquo modo laxiorem, & partes admodum porosas majorem humorum copiam recipere posse & hinc necessario mollem turgescentem & ob sanguinem floridum apparere rubicundum, iis inprimis in

par-



partibus, in quibus & cutis est tenuior & major sanguinis copia admitti potest. Vasa exigua sunt, quoniam in substantia partium multum sanguinis continetur. Secretiones quoque & excretiones optime procedunt, quatenus sanguis est fluxilis & viæ sunt patulæ, ac ita ob, æqualem & constantem cordis pulsum sanguis æqualiter ad omnia viscera & partes secretioni inservientes propelli potest. Nec etiam opus est in hisce ut pulsus sit fortior, quoniam enim viæ & pori sunt patuli absque magna vi per hasce vias sanguis distribuitur.

§. 4. Cur verò animi mores temperamentum quoque sequantur & cum actionibus vitalibus conveniant, res explicatu difficilis est. Cum enim animæ natura & essentia non adeò sit cognita, atque ipsa intima corporis structura in sensus non nisi crasso modo incurrat, facile apparere potest, in explicanda hac re non nisi conjecturis locum esse. Posset tamen forsitan sequenti modo explicari. Ad quamvis operationem aut actionem requiritur non solum intentio principii agentis ad certum finem, sed etiam respectus instrumentorum, sive organorum, principio agenti inservientium & ad finem assequendum necessariorum. Cum E. principii agentis in corpore nostro unica intentio sit conservatio corporis & præservatio à putredine, ad quam respectu mixtionis adeò pronum est, necessario quoque cum sollicitudine quadam, ut hunc suum propositum finem

obtineat, agere debet. Quoniam autem in temperamento sanguineo sanguis non tantum est floridus & fluxilis, sed etiam viæ sunt patulæ, ac ideo, quoniam eidem per hæc vias facilis conceditur transitus & sanguis stagnationi & corruptioni facile non sit obnoxius, tanta, rebus probè succedentibus, in Principio agente non requiritur sollicitudo, ac quidem requireretur, si aliqua obstacula, tam humores, quam solidas partes concernentia, eidem objicerentur. Quare etiam hoc in rerum statu mala non facile metuens Natura tranquilla & secura, & cum omnia probè succedant, hilaris alacris & curis parum obnoxia est: ob hanc ipsam verò securitatem postmodum in periculis veris consilii inops est, iisque superatis ob consuetam securitatem facile tranquillum statum recuperat. Rem hancce declarant exempla quotidiana, rebus enim siue negotiis quibuscunque bene succedentibus, homines plerumque redduntur hilares, alacres, & in magna rerum fortuna, multos labores non facile amant, undè otium, quod securitas excipit, sequitur: securitas voluptatem ob prosperum rerum successum, hæc verò gaudium & liberalitatem parit: quam primum verò in tanta securitate magnum & præsentaneum occurrit periculum, homines hujusmodi securi, consilii inopes sunt, ita ut quo se vertant nesciant: quam primum verò periculum evanuit & superatum est, facile ad pristinam, cui assueti erant, redeunt securitatem & tranquillitatem.

tem. Quæ si quis cum præcedentibus comparare vult, facile deprehendet cur animi mores in sanguineis sequantur temperamentum.

## ARTICULUS II.

De

*Temperamento Choleric.*

## §. I.

**I**N Choleric temperamento et si sanguis quoque sit floridus, plus tamen sulphuris continet, quam sanguineorum sanguis & ad incalcescentiam majorem hinc etiam aptior est. Solidarum autem partium structura strictior est, & pori sunt minores, unde etiam habitus corporis minus est turgidus, minusque spongiosus, sed ad tactum durior, & calidior: & quamvis aliquo modo sit floridus, tanta tamen albedo in eo non reperitur ac in habitu corporis sanguineo. Pulsus cordis in hoc temperamento est fortis atque vegetus: Vasa autem sunt capaciora & ampliora quam in sanguineis. Secretiones quoque & Excretiones optimè succedunt. Quod animi mores concernit, Cholericus sunt quidem liberi, vigiles, alacres & prompti, sed simul impatientes, inconstantes loquaces, ad iram maximè proni, ubi ausu und nirend an/ vindictæ cupidi, immisericordes, seditiosi, arrogantes & superiorem non facile ferentes: in periculis intrepidi, audaces & temerarii: in plerisque actionibus suis gloriosi & ad aliorum contemptum proni, ad labores tamen semper prompti sunt.



§. 2. Cum itaque pori partium solidarum sint strictiores, vasa verò ampliora, magna copia sanguinis in partium substantiam infunditur nequit, undè etiam habitus corporis non adeò est turgidus: sed ad tactum durior: cum verò sanguis eorum sit summe fluxilis, habitus corporis aliquam floriditatem servat: albedo tamen cutis tanta non est ac in sanguineis, quoniam tanta pinguedinis copia, à qua cutis albedo maximam partem dependet, in hisce non uti in aliis reperitur. Quia vero pori partium sunt minores, majori quoque cordis impetu & pulsu opus est, ut sanguis eò facilius per exiles poros trajici possit, quo ipso contingit, ut sanguis fluxilior & propter fortiolem ad fibras partium appulsum calidior evadat.

§. 3. Cum itaque sanguis choleriarum ob sulphuris sive bilis copiam, ad fermentativam acrem corruptionem, quando in vasis subsistit, admodum pronus sit, necessario requiritur, ut *Principium agens* sive *Natura* continuo vigilet, & pulsu fortiori & constanti hanc corruptionem avertat; & cum actio hæc promptè fieri debeat, in reliquis quoque suis actionibus, vigiles, alacres & prompti sunt. Cum porro minima occasio sanguini remoram ponens fermentativam talem corruptionem producere possit, cum impetu statim omnia impedimenta removet & quo plus resistentiæ deprehendit, eò potentius quoque in impedimenta ista agit: quoniam autem rebus arduis intenti, si multa impe-

impedimenta iisdem objiciuntur, facile ad iram commoventur, ita quoque Natura, rei magni momenti, præcavendæ scil. corruptioni intenta, si majora obstacula offendit, facile in furorem quasi agitur : undè etiam hanc animi indolem postmodum violentia & impetus in actionibus moralibus, impatientia, ira, vindictæ cupido, & in periculis magnis, ad repellendam rem adversam, audacia & temeritas aliaque sequuntur.

## ARTICULUS III.

De

*Temperamento Phlegmatico.*

§. I.

**H**Actenus consideravimus duo Temperamenta calida *Sanguineum* scil. & *Cholericum*, restat E. ut dicamus quoque de duobus frigidis, *Phlegmatico* & *Melancholico*. In *Phlegmatico Temperamento* sanguis fluidus quidem est, sed tenuis minus floridus & ad fermentationes minus quoque pronus, & extra motum constitutus admodum aquosus. Habitus corporis ad tactum est admodum mollis, turgidus simul, nec floridus, nec calidus, sed potius pallidus : reliquarum partium substantia est admodum porosa, vasa verò sanguifera admodum exilia sunt : pulsus est languidior & rarior : Secretiones & Excretiones tardè procedunt. Quoad animi mores *Phlegmatici*

gmatici sunt admodum segnes & torpidi, rerum omnium facile pertæsi, & etiam si, gaudio afficiantur non tamen diu illud durat & aliquo modo coactum est, uti Germani loquuntur, *es prompt halb gezwungen herauß*. Ad otium & somnum admodum sunt proni, laboribus facile fatigantur & revera laesi evadunt. Curis non adeo tentantur & facile eorum, quæ curas excitare valent, obliviscuntur. Præterea sunt stupidi, meticulosi, anxii, inconstantes sordidi &c.

§. 2. Cum Ergo corpora Phlegmaticorum sint admodum porosa, facile magnam humorum copiam imbibunt, & hinc semper succulenta atque turgida apparent: quoniam autem sanguis nimium est dilutus & minus sulphureus, neque floriditas, neque calor habitus corporis oriri potest. Hoc ipso autem, dum partes magnam humorum copiam imbibunt, fibræ partium solidarum turgidiores, sive quædam leni aufß/ pori autem, sive fibrarum interstitia, minores redduntur, & ipsa quoque vasa sanguifera comprimuntur, ita ut hinc angustiora appareant; unde non nisi tenuiori & aquosiori sanguinis parti per poros partium frictiores conceditur transitus. Et cum in tanta fibrarum mollitie sanguis vegete à corde propulsus, in interstitiis fibrarum subsistere & corrumpi posset, pulsus languidior ad propellendum per poros minores partium sanguinem sufficit: ob hunc ipsum debiliorem pulsum & quia fibræ molli-



molliores ad fortiozem illum attritum, qui caloris augmentum inducit, ineptæ sunt, sanguis & corpus eorundem minus quoque calet. Imò ipsæ etiam Secretiones & Excretiones ob languidiorem cordis pulsum & debiliorem vilcerum tonum necessario tardius procedere debent.

§. 3. Quoniam itaque sanguis Phlegmaticorum, aquosus & lentescens ad præcipitem corruptionem acrem, uti sanguis Cholericozum, non adeò aptus, sed potius ad salinam colliquationem & tardiozem corruptionem pronus est, ac sanguis fluidior facile per porosam partium substantiam transit, tanta quoque vigilantia & impulsu cordis fortiori opus non est: hunc E. corporis statum sequitur etiam animi indoles, segnities scil. & torpor. Cum porro fibræ molles labores perferre nequeant, & corpus indè maximè fatigetur, natura etiam somnum atque otium amat, ut fibrarum robur post labores restitui & in somno atque otio conservari possit. Hunc ipsum animi torporem sequitur postmodum stupor, incuria & quæ sunt alia.

## ARTICULUS IV.

De

### *Temperamento Melancholico.*

§. 1.

**V**Ltimum Temperamentorum, quod respectu reliquorum frigidum & siccum appellari mere-

meretur, est *Melancholicum* : in quo sanguis est *spissior*, minus dilutus, & hinc etiam minus *fluxilis*, parum *sulphuris*, multum verò *terræ* continens. Hanc sanguinis constitutionem reliqua corporis textura imitatur : *habitus corporis* est admodum *constrictus*, *densus* & *siccus* ac in fibris notabilis atque *rigida* semper sentitur *tensio*, ita ut universus *habitus corporis* manifestam exhibeat *macilentiam* : *color corporis* est *pallidus* & ex *livido* *subnigricans* : *calor exiguus* tactu in partibus deprehenditur. *Vasa* sunt *ampliora* & *pori minores*, *pulsus* vero etsi *tardus*, *fortis* tamen est. *Secretiones* & *Excretiones* tardè procedunt & *appetitus* est moderatus. Quoad *animi mores* *Melancholici* tranquilli quidem, semper tamen diffidentes *dubii* & *suspiciosi* sunt, & *pejora* semper metuunt : hinc etiam in actionibus suis *cauti*, *assidui*, *circumspecti*, *vigiles*, *indefessi* & *propositi tenaces*, sed *tardi* nihilominus sunt. Præterea tamen *taciturni*, ad *iram* proni (quam autem optimè celare norunt) *vindictæ* *cupidi* & ad *reconciliationem* minus proni sunt. *Avaritia* ipsis quasi propria est, & in rebus secundis in *gaudio*, in *adversis* verò in *tristitia* maximè excedunt.

§. 2. Sanguis melancholicorum cum admodum *spissus* sit, *pori* verò valdè *constricti*, ita ut in partium substantiam non adeò commode intrare possit, *habitus corporis* necessario & *colore* & *calore* insigni carere debet; *color* enim & *calor* *habitus corporis* à largiori sanguinis *flo-*  
ridi.

ridi infusione dependet: undè etiam ob hanc ipsam rationem habitus corporis est siccior & ad tactum durior. Ne verò ob hanc pororum stricturam & sanguinis spissitudinem stases sequantur, sanguis pulsu, etsi tardo, fortiori tamen ad partes urgetur, & ut motus sanguinis per vasa eò melius procedere queat, necessario ampliora esse debent. quoniam autem nihilominus sanguinis motus est tardior, Secretiones quoque & Excretiones tardius procedunt.

§. 3. Hanc corporis & sanguinis constitutionem sequuntur etiam animi mores. Cum enim eorum sanguis admodum sit spissus, partium verò partium minores, & hinc ob difficultatem transitum (concurrentibus imprimis causis aliis stagnationem promoventibus) stases & corruptiones sanguinis metuendæ sint, perpetua requiritur vigilantia & assiduitas, ut hujusmodi corruptiones præcaveantur. Cum verò nihilominus præsentem hujusmodi humorum & partium constitutionem semper metuenda sit aliqua agnatio, metus quoque perpetuus & continua circumscriptio remanet, ne corruptio illa sanguinis metuenda in actum deducatur, undè etiam Natura in continuo tali metu versans, hujusmodi quoque in reliquis actionibus moribus admodum circumspecta est & suspicax, non facile fidit, sed semper pejora metuit. Et præterea Natura uni huic rei, præservatio- scil. metuendæ corruptionis, semper intenta & summa cum constantia, imò ferè pertinacia,



ciâ, ad finem obtinendum omnia dirigat, facile apparere potest, cur melancholici in reliquis suis actionibus adeò tenaces sint, & non facile proposito desistant, donec finem propositum affecuti sint: & ob hanc eandem causam melancholici in rebus abstrusis detegendis, præ reliquis longè feliciores sunt,

## ARTICULUS V.

De

### *Mutatione & Mixtione*

*Temperamentorum.*

§. I.

**EX** hætenus dictis satis apparere posse putamus, quibus humorum & solidarum partium in diversis temperamentis sit status, & quomodo actiones vitales & morales inter se cohæreant & indissolubilem nexum habeant. Hæc ipsa tamen temperamenta non semper in tali statu permanent, sed vel in alia transeunt, vel alia junguntur & temperamenta mixta constituuntur: quare etiam de hisce quædam monere consuevit. tum duco.

§. 2. Tales autem temperamentorum mutationes dari, ipsa experientia quotidiana satis superque testatur: non tamen quodvis temperamentum in aliud mutari facile potest, sed scilicet lennissima mutatio est, ut humidiora in sicciora mutantur, v. g. *Sanguineum* in *Cholericum*, *Phlegmaticum* vero in *Melancholicum*: sicciorum autem

autem in humidiora mutatio non adeò frequens est, & si talis contingit, prius temperamentum ferè semper præ altero adscititio prædominium obtinet, ita quidem, ut si *Cholericum* vel *Melancholicum* in *Sanguineum* mutantur, *Cholericum* aut *Melancholicum* semper prædominetur & *Cholerico-Sanguineum*, ac *Melancholico-Sanguineum* indè prognascatur.

§. 3. Solenniſſimam mutationis Temperamentorum causam eſſe *diverſitatem ætatum*, quotidiana teſtatur experientia, qua conſtat *ſucculentum infantum temperamentum* in *pæritia*, *adoleſcentia* & *juventute* in *ficcus* mutari. Promoveat autem hanc temperamenti mutationem  
 1. *repentinum corporis incrementum*; dum enim fibræ ſubito nimis quoad longitudinem extenduntur, pori anguſtiores redduntur & humores in iſdem hærentes expelluntur: unde habitus corporis, quoniam parum ſanguinis in fibrarum interſtitiis hæret, neceſſario magis conſtrictus apparet: vaſa autem, quia ſanguis in fibrarum interſtitia effundi nequit, magis turgida & ampla redduntur. 2. Concurrit etiam ad converſionem temperamentorum *motus corporis* & *labor fortior*: quatenus in hocce muſculoſæ partes fortiffimè conſtringuntur, & ſanguis in iſdem hærens cum impetu in vaſa venoſa imbellitur, undè hæc ob majorem ſanguinis copiam in iſdem contentam, ampliora redduntur atque capaciora: cui accedit quod in oneum geſtationibus & gravioribus laboribus Spi-  
 S 2 ritus

ritus retineatur : quare cum ob pulmonum nimiam expansionem sanguinis venosi refluxum aliquo modo impediatur, necessario venæ magis expandi debent. 3. Promoveant quoque temperamenti mutationem *diurnæ febriles commotiones* : cum enim in hisce habitus corporis constringatur & sanguis per vasa venosa fortius reprimatur, cordis vero motus triplo ferè fortior quam in statu sano sit, ac præterea in vasis nimium ebulliat, necessario vasa ampliora pori vero habitus corporis strictiores redduntur, ita ut hinc facile apparere possit, cur habitus corporis strictior evadat, & homines post hujusmodi febres magis macilenti appareant. Et quamvis interdum homines pristinum turgidum corporis habitum recuperent, multi tamen sicciorem habitum retinent, quoniam sanguis in vasis amplioribus satis spatii invenit, ita ut non opus sit, ut ejus multum in porosis partium substantiam infundatur. Causa hisce etiam 4. addi potest *insufficiens partium nutritio*, sive *alimentorum* necessariorum defectus : cum enim, si sufficiens nutrimenti copia partibus apponitur, hæ turgidæ reddantur, necessario quoque ob defectum sufficientis appositionis, partium marcor sequi debet : qui tamen defectus facile sufficienti materiæ nutritiæ copia resarciri potest : & hinc etiam hæ causa tantam, ac priores, ad invertendum temperamentum potestatem non habet.



§. 4. Dictum fuit antea ætatem mutare temperamentum, quod etiam, teste experientia quotidiana, certissimum est: *Sanguineum* enim *temperamentum*, quo ut plurimum *infantis* & *puerilis* ætas gaudet, in *adolescencia* & *Juventute* in *Cholericum* transit: hoc verò in fine *Virilis* vel *Consistentis* ætatis ut & in *Senectute* in *Phlegmatico* - *Melancholicum temperamentum* communiter mutatur: undè etiam facile liquere potest, cur senes catarrhis adeò obnoxii & ad profundas speculationes magis apti sint quam juniores.

§. 5. Quod *mixtionem temperamentorum* five *compositionem* concernit, præcipuæ eorumdem species sunt, *Sanguineo* - *Phlegmaticum* & *Phlegmatico* - *Sanguineum*: *Sanguineo* - *Cholericum* & *Cholerico* - *Sanguineum*: *Phlegmatico* - *Melancholicum*: *Sanguineo* - *Melancholicum*: & *Cholerico* - *Melancholicum*: æqualis tamen horum temperamentorum mixtio ferè rarior est, & illud quod primo loco prædominatur, præ altero ferè semper prædominium obtinet, v. g. quando dicitur *Sanguineo* - *Cholericum temperamentum*, *Sanguineum* præ *Cholerico* magis eminet & vice versa.

§. 6. Causæ mixtionis hujus plerumque sunt adventitiæ. *Temperamentum* v. g. *Sanguineum* propter excessum in somno defectum motus & habitationem in loco humidiori & frigidiori diuturniorem, in *Sanguineo* - *Phlegmaticum*: *Phlegmaticum* verò propter vini, liquorum spirituosorum, & aromatum probè conditorum usum, ut propter labores continuatos in *Phlegmatico* -

*Sanguineum* abit. Porro *Sanguineum* propter eorundem *liquorum spirituosorum & aromatum*, ab usum, in primis quando *labores fortiores & ira* accedunt, in *Sanguineo-Cholericum* mutatur. *Cholericum* autem, si *ira, vinum & aromata* vitantur, potius verò & *cibi temperantes* usurpantur, in *Cholerico-Sanguineum* convertitur. Præterea etiam *Sanguineum & Cholericum* ob *calidorum abusum, fortiores laborem & inprimis propter continuas curas & sollicitudines* in *Sanguineo* vel *Cholerico-Melancholicum* transit. Propter *anxias* hujusmodi *sollicitudines* *Phlegmaticum* non rarò in *Phlegmatico-Melancholicum* transit. Non pauci tamen dantur qui à *prima statim nativitate* hujusmodi *temperamenta mixta*, absque *causarum adventitiarum* concursu obtinent. Huc referri etiam meretur *Consuetudo*, quæ ad *mutationem & mixtionem* temperamentorum non parum confert. Plura qui de *Temperamentis* scire cupit, evolvaat doctissimam *Dn. D. Stablii Dissert. de Temperamentis, Theor. Med. P.I. p.57. & seq. ut & Dissert. de Fundamento Moralitatis personalis in sanguine.*

## CAPUT VI.

De

# Animi Pathematum in actiones Vitales, harumque in animæ Operationes Potentia.

## §. I.

**H**ominem ex duabus partibus essentialibus admodum diversis, anima immateriali scilicet & corpore materiali, intimè unitis & arctissimam communionem inter se habentibus, compositam esse, nemini, qui sanæ rationis ductum sequi cupit, ignotum esse potest. Ex hac autem arctissima unione quasi tertium quid *Vitam* nimirum *Naturalis* resultat, quam talia accidentia, quæ neque animæ, neque corpori propriè competunt, comitantur. Ob hanc ipsam tamen unionem neque animæ neque corporis essentialia cessat, sed anima atque corpus requisita sua essentialia retinent, ita quidem, ut anima maneat, immaterialis, corpus verò materiale & corruptioni obnoxium, quæ tamen stante hac unione semper præcavetur: cessante verò eandem statim invalescit & corpus putredine committitur.

§. 2. Unionem hancce animæ & corporis inde resultans tertium, sive vitam naturalem citè admodum explicat Dn. D. Richter in der  
S 4 höchst



höchst nöthigen Erkenntnuß des Menschen p. 81.  
*exemplo cinnabaris.* Quemadmodum enim hæc  
 ex duabus diversis partibus, *Mercurio* scil. &  
*Sulphure* per sublimationem paratur, & quoad  
 colorem & vires neque cum *Mercurio* neque  
 cum *Sulphure* convenit, nec etiam in hoc con-  
 creto *Mercurius* & *Sulphur* ita immutantur, ut  
 id, quod antea erant, esse cessent, sed arte chi-  
 mica iterum separari possint: ita etiam anima  
 & corpus etsi diversæ sint naturæ, & unita, vi-  
 tam naturalem producant, nihilominus suam  
 essentiam retinent.

§. 3. Quamvis autem unio hæcce artificis-  
 sima certissima sit, paucissimi tamen hodiè re-  
 periuntur, qui in effectus ab hac unione depen-  
 dentes, paulò altius inquirere cupiunt, cum ta-  
 men hujus unionis contemplatio in Theoria  
*Medica* sit maximè necessaria, præsertim cum  
 potentiam animi pathematum in corpus, & al-  
 terationes operationum animæ ab actionibus vi-  
 talibus originem trahentes, quotidie videamus.  
 Plerique enim non animam tantum, sed & cor-  
 pus in abstracto considerant, ac si nullum ha-  
 rum partium inter se esset commercium. Qua-  
 re, ut *Tyronibus Medicinæ* pateat, quomodo  
 anima corpus & hoc iterum animam afficiat,  
 duobus distinctis membris. 1. de Potentia animæ  
 pathematum in actiones vitales & 2. de actio-  
 num vitalium in animæ operationes potestate  
 agemus.

## MEMBRUM I.

De

*Anima pathematum in Actiones**Vitales Potentia.*

§. I.

**Q**UAMVIS *Animæ pathematum* potentiam in actiones vitales quotidiana experientia satis superque comprobet, pauci tamen reperiuntur, qui mutationes hæc & alterationes actionum animæ adscribere volunt, sed potius nescio quos *spiritus, archeos* aut mechanicas necessitates in scenam producant: qui tamen error maximus est, & exindè suam potissimum originem nactus est, quod plerique, uti antea jam monitum fuit, & animam & corpus in abstracto considerent, cum tamen hæc duo adeò arctè connexa sint atque unita, ut ad vitæ naturalis & actionum indè dependentium phænomena debito modo explicanda, absque absurditate separari nequeant.

§. 2. Illud equidem certum est, actiones vitales ab actionibus & operationibus animæ non parum differre, quatenus illæ nobis etiam insciis peraguntur (chylicatio, v. g. bilis & urinæ secretio, pulsus cordis nobis insciis fiunt, & in somno quoque cessantibus actionibus animalibus feliciter procedunt) hæc verò impressionem in intellectu relinquunt, & nobis scientibus & volentibus peraguntur: non tamen ita distinctæ  
 S s sunt,

sunt, ut à prorsus diversis principiis dirigantur. Cum enim nonnisi unum principium corporis dirigens esse supra Cap. 3. probatum fuerit, non video qualis necessitas tertium adhuc quid postulare possit.

§. 3. Si enim alius esset præses vitalium alius verò animalium actionum, quilibet eorum certos habere deberet limites imperii sui. Sed ubinam quæso sunt isti limites? omnes partes corporis ita cohærent, ut in homine vivo minimè à se invicem separari possint. Arteriarum carotidum ramuli distribuuntur per totam cerebri substantiam, ramificationes earundem minutissimæ in exiles penetrant glandulas: hisce adhærent fibrillæ medullaris substantiæ, in quas, vel in earundem interstitia, fluit continuo & absque ulla intermissione fluidum subtilissimum nerveum, quod per nervos, ex fibrillis medullaris cerebri substantiæ compositos, ad universi corporis partes distribuitur, iisque sensum & motum, tam tonicum quam voluntarium, quibus scil. hic necessarius est largitur. Arctissima E. actionum harum connexio est, ita ut minimè à se invicem separari queant. Et cum animæ operationes in sensus incurrentes potissimum per sensum & motum se exerant, facile quoque apparere potest, quam arcta inter vitales actiones, & animæ rationalis operationes detur connexio. Sed ne nimis prolixus sim in hisce, de quibus superius Cap. 3. sufficienter jam actum fuit, luculentis exemplis animi



animi pathematum potentiam in actiones vitales probabo.

§. 4. Sit primus locus *Ira*, affectuum tyranno. Huic præ cæteris obnoxii sunt Cholerici, in quibus etiam effectus iræ magis semanifestant. Audita ingrata re iram commovente, statim insignes turbæ in toto corpore contingunt, pulsus augetur, sanguinis motus progressivus & intestinus redditur major, vasa turgida fiunt, color faciei plerumque est intense rubicundus, oculi fulgent, spuma ante os apparet, omnibus partibus insigne robur accedit, bilis effunditur & vomitum in quibusdam, in aliis diarrhœam excitat, ut alia taceam. Ex quibus sanè apparet iram & Principium à quo ira dependet, magnam in cordis pulsum, in Massam Sanguineam & in motum tonicum partium habere potentiam.

§. 5. In *Terrore* quoque actiones vitales & animales quam maximè alterantur, facies fit pallida, in habitu corporis color & calor immittitur, vasa detumescunt, pulsus fit frequens, in nonnullis inprimis debilioribus, parvus & debilis: horror in nonnullis observatur, undè dicunt, *ich bin erschrocken/ daß mir die Haut schaudert.* In feminis terror excitat abortum, menses interdum provocat, interdum verò fluentes suppressit, ut plures morbos à terrore subitaneo oriundos silentio præteream.

§. 6. Quid *Tristitia* in mutandis actionibus vitalibus valeat, nemini ignotum esse potest.

Motus

Motus in corpore trepidè & inæqualiter peraguntur, sanguis circa viscera interiora coacervatur, stagnat, & spiffescit, appetitus perit, nulla fit nutritio, corpus marcescit, in lactantibus feminis lac sensim consumitur, infantes verò surgentes brevi contabescunt, menses supprimuntur in feminis, in viris verò hæmorrhoides, melancholia sequitur hypochondriaca, ac tandem mors, omnium malorum finis, agmen claudit. Eosdem quoque effectus producit continuus *Metus*.

§. 7. *Amor* omnium affectuum generalissimus & iræ è diametro oppositus, si est moderatus, non solum actiones vitales in vigore conservat, sed easdem etiam promovet, undè sequitur faciei rubor, habitus corporis aliquo modo inflatur, vasa redduntur turgidiora, pulsus cordis augetur, & notabile partibus accedit robur. Immoderatus verò interdum in furorem conjicit homines, alii indè contabescunt, alii melancholici, alii maniacy redduntur: in puellis menses obstruuntur, chlorosis sequitur &c.

§. 8. *Gaudium* quoque variorum notabilium effectuum in corpore humano causa est; multa occurrunt exempla ægrotantium, qui audito lato nuntio statim convaluerunt: cum è contra quoque exempla occurrant eorum, qui præ nimio gaudio mortui sunt.

§. 9. Quid *Fiducia* efficere queat, Medicis potissimum notum est, & in quotidiana observatur

vatur Praxi: indè quotidie audias, ich hab mein Vertrauen zu diesem oder jenem Medico, ich weiß er wird mir helffen. Cum fiducia enim semper aliquale gaudium conjunctum est, vi cujus postmodum alterationes laudabiles in œconomia animali contingunt. Cum è contra, ubi talis fiducia erga Medicum deest, continuus & clandestinus metus in ægrotis observatur, ita ut propter hunc metum remedia etiamsi polychresta interdum prorsus nullum edant effectum.

§. 10. Quod adhuc magis animæ potentiam in actiones vitales probat, est quod Phantasia fortior easdem quam maximè alteret: quo magis enim homines meditationibus continuis incumbunt, eo minori vigore actiones vitales procedunt: undè etiam literati non ob vitam sedentariam tantum, sed & continuas meditationes morbis variis obnoxii sunt, parum appetunt, malè digerunt, contabescunt, alvi obstructions sæpius patiuntur & quæ sunt alia. Imò reperiās homines, quos sola imaginatio ægros reddit, qui quoque quamdiu tali perversa imaginatione laborant, tamdiu à morbis non liberantur. Notæ mihi sunt non paucæ feminae, quæ ob perversam hujusmodi imaginationem ferè semper valetudinariæ sunt: cum enim huic phantasie tristitia atque metus mortis semper jungantur, facile apparere potest, quantæ actionum vitalium perturbationes in hujusmodi ægrotis contingere queant. Quid Phan-



Phantasia ingrauidis valeat, supra Cap. 3. p. 700.  
dictum fuit.

## MEMBRUM II.

De

### *Potentia actionum Vitalium*

*in Operationes Animæ.*

#### §. I.

**Q**uemadmodum ex iis, quæ *Membro* præcedente dicta sunt, satis apparere potest, quanta sit animæ ejusque pathematum in actiones vitales potentia, ita hocce membro demonstrare allaborabo actiones vitales, lege unionis arctissimæ, animæ quoque operationes alterare & turbare posse & solere.

§. 2. Non omnia, sed certa tantum quædam diei tempora ad meditationes apta esse, literatis, quorum labores meditationibus & studiis potissimum absolvuntur, notissimum est. Tempus ad meditationes maximè ineptum post prandium atque cœnam est, quando nimirum cibus ventriculus repletus est: unde etiam tritissimum illud: *Plenus venter, non studet libenter*, ortum traxit. Commodissimum autem est tempus matutinum & vespertinum, quando Venter cibus vacuus & digestio peracta est.

§. 3. Cur autem hisce temporibus Natura magis ad meditationes sit apta, conceptu non adeò difficile est: cum enim Naturæ, corporis præ-

sidi

fidi quam maximè interfit, ut corpus, quo cœu instrumento utitur, diu sartum tectumque serve-  
tur, necessario quoque illud nutrire, atque se-  
cretiones corporis conservationi unicè inservi-  
entes, instituere debet. Quoniam autem nutri-  
tio fieri nequit, nisi prius alimenta digerantur  
& in materiam nutritionis proximam conver-  
tantur, summa necessitas postulat, ut digestio in  
Ventriculo & intestinis benè peragatur. Cum  
itaque Natura post pastum huic digestionì & in  
chylum conversioni unicè intenta sit, & ideo  
etiam aliqualem cessationem actionum anima-  
lium postulet, quod ex torpore & proclivitate  
ad somnum apparere potest: facilè liquet Natu-  
ram tum temporis ad meditandum minus aptam  
esse: quod si verò nihilominus ingenium ven-  
triculo vacuo nimium exercetur, non solum  
meditationes, ut ita loquar, sunt crudiores, sed  
& digestio minus benè procedit: *Pluribus enim  
intento minor est ad singula virtus.* Quamprimum  
verò digestio peracta est, major longè Naturæ  
ad reliquas actiones & inprimis ad meditationes  
promptitudo observatur: quoniam tum tem-  
poris labores in œconomia vitali peracti sunt, &  
insigne quoque robur partibus, animæ opera-  
tionibus inservientibus, accessit, ut ita anima  
iisdem longè felicius quam digestionis tempore  
uti possit.

§. 4. Potentiam actionum vitalium in  
operationes animæ quam maximè quoque pro-  
bat status corporis humani p. n. v. g. præsentis  
pletho-

plethora, quando quantitas fluidarum partium vim motuum superat, sentitur insignis torpor omnium partium & lassitudo membrorum, quæ etiam ipse animus afficitur, homines enim ad meditationes tum temporis maximè inepti sunt: imò dantur etiam, inprimis feminæ, quæ summam sentiunt tristitiam & quidem tantam, ut etiam lacrymas profundant, quæ tamen tristitia, cujus causam pleræque ignorant, imminuta per V. Sectionem plethora, statim cessat, & animus pristinam alacritatem recuperat. Quid sanguis spissior in hypochondriis stagnans in animum possit, ii potissimum experiuntur, qui indè Melancholia hypochondriaca corripuntur. Imo si in hypochondriacis saltem alvus obstruitur, non torpor tantum corporis sequitur, sed vigor etiam animi perit, & locum ejus tristitia & insignis animi torpor occupat, qui tamen cessante obstructione alvi facile cessat.

§. 5. Quanta sanguinis in animam sit potentia in morbis acutis videmus, ubi nimiam ebullitionem deliria sæpius admodum furiosa sequuntur. In statu naturali simile habemus exemplum, si enim à vino generoso nimia excitatur sanguinis ebullitio, anima ita perturbatur, ut homines delirantibus & furiosis similes reddantur, qui tamen furor sublata ebullitione à vino producta brevi cessat.

§. 6. Quam quæso pertæsi & ad iram proni sunt homines, quibus viscera vitalia labe aliqua affecta sunt? levissima causa sæpissimè iram



iram excitat; quod sanè fieri nequiret, si actionum vitalium in animæ operationes nulla esset potentia.

§. 7. Si E. hætenus tradita æqua mente perpendimus, non possumus non concludere, inter actiones vitales & animales perpetuum & indivulsum esse commercium: quare etiam ii quam maximè errant, qui animæ concursum ad actiones vitales prorsus excludunt, & cæco ac bruto cuidam mechanismo actionum istarum directionem adscribunt: quæ enim de voluntate, ad roborandam suam opinionem proferunt, quod scil. nullam habeat potentiam in actiones vitales, & pulsus cordis, ut & varias secretionem vel retardare vel promovere nequeat, parvi sanè momenti, nec adeo urgentia sunt, ut duplicem rectorem actionum postulare queant: quemadmodum enim intellectus & voluntas sibi sæpissimè contrariantur, ita ut homines etiam fateantur, sie wissen wol daß ihn dieses oder jenes nicht gut sey / sie können aber nicht lassen / nemo tamen diversis principis, sed animæ & intellectum & voluntatem adscribit, ita & in actionibus vitalibus & animalibus operationibus diversa non requiruntur agentia, sed sola anima sufficit. Plura vid. supra Cap. 3. de Principio Motus.

T

CAPUT

## CAPUT VII.

De

Excubitoribus animæ

*sive*

Sensibus externis.

§. I.

**Q**Uamvis Principium corporis humani internum corpus quoad mixtionem à putredine continuo, quantum quidem possibile, conservet, ita ut diu in hoc mundo subsistere queat: cum tamen nihilominus homo inter varias res versari debeat, quæ magnum, & in primis structuræ corporis damnum inferre possunt, necessariò quoque principium internum damna exterius imminuentia cognoscere & evitare, proficua verò eligere debet. Ad cognitionem B. & bonorum & malorum ipsi concessi sunt *sensus*, qui in partibus exterioribus locati excubias quasi in toto corpore agunt: oculi v. g. in eminentiori & anteriori capitis parte positi, hinc inde vertuntur & eminus occurrentia mala detegunt: aures itidem utrinque in capite locatæ ad omnem strepitum sonosque attendunt. Cognitionem hancce per sensum statim sequitur postmodum motus voluntarius corpus vel à malo removens, vel ad bonum eligendum promovens.

§. 22

§. 2. Quo verò Principium illud internum eò melius objecta externa cognoscere queat, nervos sensuum instrumenta in continua & moderata servat tensione: undè quo magis sunt tensi nervi & reliquæ etiam partes fibris nerveis instructæ, eò major quoque est sensibilitas, id quod manifeste videmus in cholericis, qui ob majorem fibrarum tensionem, præ reliquis magis sensibiles sunt. Manifestius adhuc hanc fibrarum, à tensione earundem pendentem, sensibilitatem, membra eorum, qui equuleo torquentur, probant, si enim filo tantum crassiori, culmo aut alia re minoris momenti attinguntur, sensibilis statim sentitur dolor, manifesto indicio tensionem istam nimiam nimix sensibilitatis esse causam.

§. 3. Sed sine dubio mechanicis Philosophico-Medicis nauseam moveo, dum assero, *animam humanam sentire in corpore nostro & nervos extensos servare*: cum enim juxta hos corpus humanum mechanicè moveatur, & ex necessitate mechanica omnia & sensus quoque in corpore fiant, talia quæ animam sapiunt, prorsus non arrident: Sed ne gratis me hæcce asserere existiment, argumentis, uti puto, firmis assertum meum probabo.

§. 4. Possent autem mechanicos hosce Doctores statim convellere Veteres, juxta quos *mens videt, mens audit, cæca, surda sunt omnia*: posset eos convincere sapientissimus & eloquentissimus Cicero, qui *animum & videre & au-*



dire, non eas partes, quæ quasi fenestræ sunt animæ affirmavit, uti superius de fluidi nervorum secretionem p. 141. jam dictum fuit: sed cum sanctæ hæc Veterum simplicitas mechanicis non arrideat, nec etiam fastidium particularum, ut quidam putant, attingat, malunt principio mechanico, spiritibus animalibus aut animæ sensitivæ sensum adscribere, ita tamen ut anima quidem sentiat in corpore, sed tantum tanquam forma assistens, quæ saltem aspiciat varios motus à spiritibus in primo sensorio excitatos, & respectu motuum istorum varias cudat ideas, sive judicium de istis ferat; als wie die Kinder die in den schönen Karitäten = und schönen Spielwerck = Kasten gucken / und sich entweder erfreuen oder betrüben / nach dem der weisse Mann etwas trauriges oder lustigeres präsentirt. Nec etiam animam esse causam motuum variorum, qui hujusmodi perceptiones sequuntur, sed eos à nescio quo alio principio proficisci.

§. 5. Verumenimverò quamvis hæc Mechanicis Medicis maximè arrideant, à me tamen nunquam impetrare potui, nec adhuc possum, ut eorum opinioni subscribam, sed potius firmiter persuasus sum, animam rationalem solam esse, quæ in corpore ope sensuum externorum sentire queat & soleat. Argumenta hancce sententiam confirmantia sunt sequentia. I. quod anima quam maximè intersit, ut corpus suum conservetur in integritate: cum verò multa corpora

circa

circumstent, quæ structuram ejus lædere queant, necessario anima causas illas læsiones minitantes per sensus agnoscere, & corpus ab iisdem præservare debet. 2. Quod anima hunc in finem sensationem intendat, ut, quæ vult, eò melius percipere queat: id quod manifeste deprehendimus in visu & auditu: visu quidem, quando rem attentius aspicimus: adeò quidem, ut etiam actionem aliorum objectorum in reliqua organa ob hanc summam attentionem non percipiamus: auditu vero, quando ferè totum caput versus locum quendam convertimus, ut eò facilius sonum, quem expetimus, percipere queamus: undè *Latinorum* phrasēs, *arrigere aures*, *arrige aures Pamphile* & *Germanorum* *Die Ohren spitzen* / natæ sunt. 3. Eò magis autem intensiorem auditus probat, quando in pleno Musicorum concentu, unius tantum modulamini & voci, qua reliquos gratia superat, attenti sumus, ita ut etiam reliquum concentum etsi graviorem atque fortiolem neque attendamus neque percipiamus. 4. Quod mens sensationem quoque intendat, undè præsentē metu inprimis in loco obscuro aut alio metum incutiente, oculi quaquaversum, ad præcavendum rei noxiæ insultum, diriguntur: ac in tali metu trunci arborum, sæpius immanes & feras beluas aut hostes armatos oculis repræsentant: auditus verò leviori etiam repitu percellitur, undè Germani de huiusmodi hominibus meticulosi dicunt, *ein*

rauschendes Blat erschrecke sie. Sensum tactus etiam in dolore auget quam maximè phantasia, in pueris præcipuè virgas aut plagas metuentibus. Ejusdem sensationis intensiorem in tactu probat etiam *titillatio*, quando non solum in corpore leviter tantum tacto, sed etiam ob solum metum, gestibus hanc vexationem intendentibus, titillatio excitatur, cum è contra alii licet digitis titillentur, prorsus nullum talem fremebundum aut titillatorium motum experiantur. §. Quod interdum, remittente hac sensationis intensiōe, organa sensoria ab objectis non afficiantur, id quod exinde liquet, quod (1) anima aliis rebus intentam nihil sentiamus, & oculis atque auribus apertissimè neque videamus neque audiamus. (2) quod præsentibus maximis clamoribus & turbis nihilominus somnus superveniat, nec faciliè ab hujusmodi fortioribus objectis turbetur, quod imprimis molitores in molendinis & milites in obfidionibus experiuntur. Quibus (3) addi potest, quod quidam animum ita obfirment, ut etiam integra membra absque insigni sensatione sibi amputari patiantur: imò alii sine magnis clamoribus & sensu majoris doloris omnes tormentæ gradus sustineant. vid. *Dn. Stablij Theor. Med. P. I. p. 283. Conf. Richteri Erfäntnuß des Menschen p. 224.*

§. 6. Quæ omnia, si quis juxta sanam rationem examinare cupit, faciliè deprehendet, animam rationalem solam esse quæ in corpore sentit,



entit, eamque pro circumstantiarum ratione sensum modo intendere, modo eundem relaxare : quare etiam nulla necessitas requirit, ut aliam quandam animam, archeum aut spiritum sensitivum supponamus.

§. 7. In omni autem sensu concurrunt anima scil. humana, organa sensoria, atque objecta sensibilia : illa organa sensoria debito modo extendit, ut ab objectis externis affici queant : undè cessante hacce extensione, quale quid in somno contingit, anima quoque nil percipit : extensis vero debito modo organis sensoriis, objecta sensibilia hisce motum imprimunt, qui in anima sensum excitat. Respectu itaque perceptionis, & actionis objectorum in organa sensoria, hæc & anima passive se habent & sensus est *passivus* : respectu vero extensionis organorum sensoriorum, quam anima præstat & ad sensum se applicat, sensus est *actio*.

§. 8. Cum vero objecta diversa sint, diversa quoque hinc organa atque diversi emergunt sensus ; qui communi comprehenduntur versiculo : *Gustus & Olfactus, Auditus, Visio, Tactus*. de quibus ordine agemus.

## MEMBRUM I.

De

*Visu.*

## §. I.

**R**eliquis sensibus externis merito præmittitur *Visum*, quia hoc (ut verbis Bergeri *Physiol.* p. 399. utar) *lucem hanc cæli suavissimam & astrorum obitus & cursus omnemq; mundi ornatum & pulchritudinem perspicimus & ipsius tantorum operum factoris atq; artificis & Creatoris nostri digitum ubivis deprehendimus.*

§. 2. *Organum Visus* quod concernit, im-  
sublimi positum est loco, ut imminentiæ mala  
eminus aspicere & vitare, proficua verò eligere  
queamus. Ne tamen nobilissima hæc fabrica  
lædatur, interius orbita ossea, exterius verò pal-  
pebra cum ciliis & superciliis eam ambiunt,  
atque illapsum festucarum & pulverum in oculo-  
los impediunt: de reliqua oculi structura supra  
*Cap. 1. p. 17. & seq. jam actum fuit.*

§. 3. Tota autem oculorum fabrica adeo  
artificiose constructa est, ut objecta externa sive  
species sensibiles in iis colligi, concentrari, ex-  
altari & denuo erigi possint: hunc enim in fi-  
nem ex tot tunicis & humoribus constat, ut ra-  
diorum ab objectis, juxta Physicos, prodeun-  
tium variæ in iisdem reflexiones & refractiones  
contingere queant.

## §. 4.

§. 4. Quo verò objecta quæqua versum disposita eò melius dignosci queant, oculi in varias plagas ope musculorum, sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum & oblique deorsum moventur. Manifesto indicio inesse corpori principium quoddam quod ex proposito aut consilio oculos ita dirigit, ut eorundem ope quid proficuum aut quod corpori noxium est cognoscat.

§. 5. Ut autem species visibiles aut harum radii eò facilius in oculum penetrare queant, antè in oculo posita est tunica cornea pellucida, cujus pelluciditatem conservat motus palpebrarum, quatenus per hunc humores, qui tunicæ poros aliquo modo obstruere luminis-que ingressum aliquo modo impedire possent, continuo absterguntur: imò dum sapissimè quoque oculum claudunt, oculi robur conservant; si enim luminis radiis continuo expositi essent oculi, facilè nimis debiles redderentur & habilitatem ad videndum amitterent.

§. 6. Ad meliorem visionem notabiliter quoque concurrunt *pupilla*, quæ ciliarium processuum beneficio constringi & dilatari potest: dilatatio manifeste conspici potest in locis aliquo modo obscuris: contractio verò in locis lucidis, aut quando corpus admodum lucidum aspiciamus: quo ipso tempore etiam palpebræ connivent & obiter oculum claudunt, ne scilicet lumen majori vi irruens oculum lædat.



§. 7. Per pupillam penetrantes radii in humoribus *Aqueo, Crystallino & Vitreo* variis modis refringuntur ac tandem in tunicam retinam & nervo optico contextam incidunt, inque ea leviter extensa motum excitant, per quem animæ res visibiles percipit. Non autem parvæ quantitatis icunculæ per oculos penetrant, & in mollem cerebri substantiam inscribuntur, inibique stabiles postea permanent: nam hinc opinio refragatur quantitas cerebri, quæ tot icunculis recipiendis minimè proportionata est: perpenderit enim quis immensum objectorum visibilium numerum, quorum imagines si omnes cerebro imprimi deberent, cerebrum quoque stupendæ magnitudinis requireretur: omnium enim animalium & horum diversarum specierum, mulorum, asinorum, canum, quoad colores, magnitudinem aliaque accidentia differentium, ut & omnium mineralium & vegetabilium icunculas recipere deberet.

## MEMBRUM II.

De

### *Auditu.*

§. I.

**N**ON minoris est præstantiæ *Auditus*, quippe ejus ope varias ex Præceptorum ore addiscimus scientias: imo ex auditu discimus, quomodo aliorum sensuum objecta definire debe-

beamus; v. g. an animal sit *Simia*, *Leo*, *Ursus* &c. ex auditu scimus: linguas quoque varias. communia populorum vincula, huic sensui acceptas ferimus.

§. 2. Hujus pariter sensus *Organon* artificiosissimum est, sive aurem externam, sive internam consideres. Externæ auris figura ovalis est & variis eminentiis cartilagineis atque sulcis sive cavitatibus, sub *alæ* sive *pinnae*, *helicis*, *anthelicis*, *conchæ*, *tragi*, *antitragi*, nominibus venientibus, exornata. *Cavitates* auris externæ tortuoso ductu ad *meatum auditorium* feruntur: in cujus fine tympanum cernitur, quod reliquæ partes auris internæ supra Cap. 2. p. 22. descriptæ, sequuntur.

§. 3. *Objectum* Auditus est *Sonus*, quem in *primum* & *secundum* Physici dividunt: *primum* vocant *motum* illum *tremulum* in corpore sonoro excitatum: *secundum* verò *motus* istius *tremuli* in aure *perceptionem*. Hujus motus tremuli sive soni vehiculum dicunt esse aërem atmosphæricum, quo ipso aërem subtiliorem & crassum nimis ob defectum vis elasticæ excludunt.

§. 4. Corpora E. sonora pulsata motum suum tremulum, juxta Physicos aëri ambientî communicant, undè particulæ aëris elasticæ aliæ alias pellunt usque ad aurem externam: ubi, ne subito aurem irruat & sonum confusum excitet, varie in eminentiis & cavitatibus alteratur, atque tandem *meatum* ingreditur *auditorium*,

rium, ubi tympani membranam ipsi occurrentem, valideque tensam pulsat; quæ vibrata æerem auris internæ simili modo movet: & cum ipsi per fenestras pateat via, labyrinthum ejusque partes ingreditur, atque in membrana ex nervo auditorio texta motum & auditum exci-  
tat.

### MEMBRUM III.

De

*Tactu.*

§. I.

**T** *Actus* etsi reliquis sensibus ignobilior haberi possit, ideò quod ejus organum adeò artificiosum, uti reliquorum sensuum haud sit, dignitatem tamen ei non infimam vindicat, quod  
1. organum ejus totum corpus ambiat, reliqui verò sensus certæ tantum parti alligati sint: cui accedit 2. quod nullum animal, licet aliis careat sensibus, tactu destituatur: ut & 3. quod omnes reliqui sensus sine tactu, juxta quosdam, peragi nequeant, hic verò nullius ministerio indigeat.

§. 2. *Organum Tactus*, uti reliquorum sensuum, sunt *nervi* & horum extremitates, quas *papillulas nerveas* communiter vocant: hæ ex nervorum propaginibus, in corpore reticulari occurrentibus, sub cuticula emergentes & succo intus nitente turgidæ, immediatum tactus sunt organum, id quod exindè probari potest,



potest, quod iis in locis, ubi copiosiores tales reperiuntur papillulæ nerveæ, sensus tactus longe sit exquisitior, hinc etiam vola manus & apices digitorum sensibilitate reliquas partes superant.

§. 3. *Objecta Tactus* quamplurima sunt, & horum respectu ferè alios sensus superat, explorat enim *solidum & fluidum, durum & molle, asperum & læve, densum & tenue, frigidum & calidum, humidum & siccum* & quæ sunt alia, de quibus Physici consulantur. Uti autem in aliis sensibus medio quodam opus est & vehiculo, ita & hoc respectu peculiare quid obtinet tactus, nulum enim hic requiritur medium, sed objecta immediate attingunt & afficiunt papillulas nerveas in cute constitutas, undè à diversa earum affectione diversus quoque excitatur sensus.

## MEMBRUM IV.

De

*Gustu.*

§. I.

**G**ustui inservit Lingua & imprimis hujus papillulæ nerveæ, hinc indè per ejus superficiem magna copia disseminatæ, quæ triplicis juxta *Tauvry* sunt generis: *quædam* enim sunt *pyramidales, quædam capitata, quædam* vero in *tenues ditcissæ fibrillas*, ut scil. eò melius res sapidæ, cujuscunque demum sint generis, dignosci queant.

ant. Concurrit suo modo palatum & facit ad bene esse, linguæ enim apicem, si aliquid probe gustare volumus, palato apprimimus, quo res sapidæ eò melius in papillulas nerveas imprimantur.

§. 2. Omnem autem saporem res sapidæ quæ Gustus sunt objectum, à salinis obtinentur particulis, (in quibus Physici diversas adhuc considerant figuras) quo major enim cibus inest salis copia, eò magis quoque sapidi sunt: è contra verò si salinæ è cibus extrahuntur particule, sapor perit. Requiritur tamen ut salia hæc ex aliarum particularum compedibus liberentur, si enim nimis arctè ligatæ sunt & altius partibus inhærent, nullus percipitur sapor.

§. 3. Quare medio opus est sive menstruo solvente & extrahente, quo cibi intimius dissolvantur & particule sapidæ extrahantur: præstat hoc saliva, hæc enim salia ciborum probe masticatorum solvit atque imbibit, quæ papillulas afficientia suavem in iis excitant motum, quem Gustum appellamus.

§. 4. Saliva autem neque copia excedere neque deficere debet: priori enim modo salia nimis diluuntur & gustus imminuitur: posteriori autem, quoniam si salia non solvuntur nullus percipitur sapor: nec etiam vitiosis qualitatibus imprægnata sit saliva, quoniam hoc modo gustus depravatur.

## MEMBRUM V.

De

*Olfactu.*

§. I.

**O***lfactus* organum nares esse nemini ignotum est: inprimis autem membrana nares internè succingens & ex fibrillis è processibus mammillaribus prodeuntibus, atque ex quinti nervorum paris ramulis contexta, immediatum olfactus est organum.

§. 2. Ad meliorem autem odorum perceptionem maximè confert narium conformatio, quatenus nares inferius sunt amplæ, sursum verò tendentes angustiores redduntur, undè effluvia odorifera cum aëre, in inspiratione sursum tendentia, eò melius membranam narium internam afficere & motum in nervulis dictæ membranæ excitare possunt.

§. 3. Odores quod concernit, juxta Physicos plerosque sunt subtilissima effluvia sulphurea è corporibus exhalantia: sulphurea esse exindè patet, quod, quò magis rebus inest sulphuris, eò magis olfactum afficiant & contra: inprimis autem odorem gravissime afficiunt, si particula sulphuræ expanduntur, id quod potissimum apparet in salibus volatilibus oleosis.

§. 4. Vehiculum particulis hisce sulphureis sive effluviis præbet aër, qui dum in inspiratione

ratio-



ratione nares ingreditur, ea simul secum rapit, undè dum membranam narium afficiunt, iste oritur sensus, quem Olfactum vocamus, qui uti pro effluviis diversitate diversus est, ita quodque in cerebro diversa oritur perceptio.

## CAPUT VIII.

De

### Sensibus Internis.

§. 1.

**H**Actenus recensiti sensus eum in finem in exteriori corporis superficie collocati sunt, ut ab objectis externis eò melius affici queant: sed cum sensus in homine sola hacce externa organorum affectione non absolvatur, sed insuper quoque requiratur, ut affectio sive motus certus organis sensoriis impressus, ipsi quoque animæ sive sensibus internis communicetur, paucis quoque videbimus quid & quot sint sensus interni, & quomodo impressio objectorum in organa sensoria istis communicetur.

§. 2. Sensus interni communiter dividuntur in *sensum communem*, *Phantasiam* & *Memoriam*. *Sensus communis* est, qui primum objecta externa percipit: *Phantasia* eadem præsentia sistit & examinat: *Memoria* tandem est, quæ ideas objectorum conservat, ac elapso sæpius multo tempore tanquam præsentia sistit. Veteres tribus hisce sensibus internis tres quoque disse-

differentes in capite sedes, *sensui* scil. *communi anteriorem cerebri partem, Phantasia mediam, Memoria* vero *posteriorem* partem tribuerunt. Alii unicum tantum sensum internum, nimirum *Imaginationem* admittunt.

§. 3. Quamvis autem hæc de sensibus internis opiniones & explicationes differre videantur, revera tamen quoad fundamentum conveniunt: qui enim *Imaginationem* tantum admittunt, sub ea quoque *Phantasia* & *Memoriam* complectuntur. Nunquam tamen hi sensus interni ceu diversum & ab anima distinctum quid considerandi, multo minus alii cuidam principio adscribendi sunt: sola enim anima est quæ in homine percipit, quæ videt, quæ audit & quidem ope sensoriorum externorum.

§. 4. Primus scil. gradus est simplex rerum sive objectorum apprehensio & cognitio, quam in anima motus nervis sensoriorum impressus excitat: hanc excipit postmodum *Phantasia* sive objectorum præfiguratio, qua objecta, etsi absentia, tanquam præsentia anima sistit, unde etiam Germanis vocatur *die Einbildung*/ quoniam objectorum imagines anima quasi pingit: & dum anima in pingendis hisce rerum imaginibus, aut ideis occupata est, oritur id, quod vulgo *Cogitationes, die Gedancken*/ vocatur. Tandem *Memoria* sequitur, quando ideæ præterita formatæ denuo sistuntur, aut oblitteratæ denuo formantur.

§. 5. Quo in loco fiat objectorum perceptio nondum constat, Veteres uti dictum, sensui communi, anteriorem capitis partem, Phantasia mediam, Memoriam vero posteriorem tribuebant. *Cartesius* sedem animæ & locum perceptionis in *glandula pineali* quærebat, alii alias cerebri partes perceptioni aptas iudicarunt. Nulla tamen ex omnibus sententiis magis probabilis mihi videtur, quam ea quæ locum perceptionis statuit medullam oblongatam: cum enim ex hac omnes nervi ad sensoria tendentes prodeant, maxime quoque probabile est in eadem fieri perceptionem objectorum sive rerum sensibilium.

§. 6. Sensibus hisce internis merito etiam *Dn. Richter* additur *sensus vitalis*, quo mediante Anima sive Natura apprehendit, an ea quæ in corpore sunt, corpori proficua an vero noxia sint. Manifesto huius sensus existentiam probant aliamenta ingesta, quæ etsi a sensibus jam probata fuerint, nihilominus sæpius tanquam noxia per vomitum rejiciuntur, etiamsi prorsus nihil in iisdem contineatur, quod vomitum excitare queat & homo iisdem antea absque ulla molestia usus fuerit.



## CAPUT IX.

De

## Voluntate &amp; motu Voluntario.

## §. 1.

**D**Um itaque anima ope sensuum externorum objecta percipit, cognoscit, & varium de iis iudicium fert, eaque vel jucunda, utilia & corpori proficua, vel adversa & noxia esse cognoscit, vel appetitus iisdem objectis potendi & fruendi, vel aversatio sequitur: hic autem appetitus potissimum per *Voluntatem*, alteram humanæ mentis facultatem generalem, se exerit, quam fere semper presso pede *motus* corporis *voluntarius* sequitur, cujus ope id, quod corpori proficuum est, corpori admovetur, quod vero noxium deprehenditur à corpore remove-  
tur.

§. 2. *Instrumenta* hujus motus voluntarii sunt *nervi*, *musculi*, *membranæ*, *tunicæ*, *fibræ*, *ossa*, *ligamenta* & *tendines*: inter quæ tamen ea intercedit differentia, quod a *Principio movente* sive *Natura* motus immediate imprimatur *nervis*, qui eum *tunicis*, *membranis*, *fibris* & *musculis* communicant, & hi postmodum sensibilibus reliquis rigidiores partes *ossa*, *cartilagines* & *ligamenta* movent. Hæc ipsa autem instrumenta duo adhuc maxime necessaria præsupponunt requi-  

V 2

lita,

sita, quorum alterum est legitima eorundem conformatio, hæc enim si defuerit, partes ad motum perpetrandum & legitime absolvendum inhabiles sunt: alterum vero est motus eorundem tonicus, qui instrumenta motui inservientia in legitima extensione conservat, ita ut solum hoc ipso vita eorundem incolumis servetur, sed etiam accedente juxta imperium voluntatis majori tensione, rigor ille membrorum, qui ad motum adeo necessarius est, sequatur, & motus voluntarius eo facilius procedat.

§. 3. Præter tamen partes hæc solidas requiritur etiam influxus sanguinis & fluidi nervorum, sine quibus nullus institui potest motus, id quod exinde potissimum apparet, quod ligata arteria vel nervo, & hoc modo sanguinis arteriosi & fluidi nervorum influxu cohibito, motus partium statim cessat, sublata vero ligatura partes ad motum denuo habiles reddantur. Ita teste *Bergero Physiol.* p. 296. ramo aortæ descendente in brutis constricto, partes inferiores redduntur paralyticæ, soluta vero constrictione motum recuperant.

§. 4. Instrumenta motus solida etsi per labores fortiores diu continuatos aliquo modo debilitentur, nihilominus tamen fibræ eorundem tandem ad labores fortiores perferendos maxime habiles redduntur: id quod in rusticis aliisque hominibus, laboribus durioribus victum quærentibus,prehendimus, hi enim labores fortiores longe melius & diutius quo-

que

que perferre queunt, quam illi qui vitæ sedentariæ sunt dediti & corpus neque motu neque laboribus exercent. Cujus quidem rei causa admodum obscura est, posset tamen duplex probabilis ratio allegari, quarum altera ipsum principium movens, altera vero ipsa instrumenta causæ moventi inservientia respicit.

§. 5. Quod Principium movens concernit, notum est ex quotidiana experientia, quod omnes isti labores, qui cum summa vigilantia, alacritate atque continua intentione peraguntur, longe melius succedant, quam ii, ubi talis accurata intentio non est; hinc fere quotidie audimus, was man mit Ernst verricht/ gehet alzeit am besten von statten: quare etiam dantur homines, qui ob assiduam hancce intentionem plus sæpius una hora præstant, quam alii tribus vel quatuor horis efficere possunt. Cum E. Principium movens in hominibus laboribus assuetis, continuo laboribus hisce durioribus perferendis & perficiendis intentum sit, probabile videtur, idem principium motus suos quoque ita dirigere, & tantum etiam robur partis communicare, ut labores duriores perferre queant, & hinc tandem partes per longiorem consuetudinem habitum ac robur majus acquirunt. Dependere autem non solum posse, sed etiam solere, majus robur a Principio movente, manifeste cernere possumus in affectibus animi; quantum enim robur partis accedat in ira, quam semper vindictæ cu-



pido comitatur, omnibus notum est. In statu quoque præternaturali, manifestum roboris insignis habemus exemplum, nimirum in Mania, cum enim in hac continuum & quidem vi aperta nocendi sit desiderium, tanto quoque robore instruuntur membra, ut aliorum hominum vires longe superent.

§. 6. Instrumenta autem motus quod concernit, notum est, quod, quo molliores & flexiliores sint fibræ, eò debiliores quoque sint & ad labores fortiores ineptiores: è contra vero fibræ duriores, flexilitate tamen debita adhuc gaudentes, longe fortiores & ad labores perferendos aptiores sint: id quod manifestè videmus in *Phlegmaticis* & *Sanguineis* quos *Cholerici* & *Melancholici* viribus non parum superant, & hinc ad labores fortiores magis apti sunt: in *Phlegmaticis* enim & *Sanguineis* multum sanguinis in poris partium & interstitiis fibrarum hæret, unde fibræ nimis emolliuntur, & ideo ad labores minus aptæ sunt: in *Cholericis* autem & *Melancholicis*, quoniam parum sanguinis in interstitiis fibrarum continetur, fibræ adeo flexiles & molles reddi nequeunt, unde etiam ob respectivam siccitatem robustiores sunt. Cum itaque in laboribus fortioribus fibræ partium continuo vi tendantur, sanguis in earum interstitiis contentus sensim expellitur, & fibræ arctius coeunt: unde non solum fibræ sicciores redduntur, sed etiam dum arctius coeunt, majus robur ipsis accedit, *vis enim unita*, juxta

com-

commune proverbium, *fortior est*. Ipsa quoque vasa redduntur ampliora, & hoc ipso non parum ad majus robur partium conferunt: quatenus in laboribus fortioribus, ut & oneribus gravioribus ferendis Spiritus cohibetur, & hoc ipso. refluxus sanguinis per venas & sanguinis arteriosi influxus in venas aliquo modo retardatur, unde, cum totum musculi corpus sanguine turgidum reddatur, ac insuper majora vasa ob majorem extensionem fibris musculorum fortius resistere possunt, facile liquet, cur fibræ in hominibus durioribus laboribus assuetis robustiores evadant.

§. 7. Quænam causa motus efficiens sit, adhuc controversitur: qui mechanismum & Spiritus animales defendunt, ajunt perceptionem objectorum sequi spirituum animalium determinationem ad certas quasdam partes, & hoc modo easdem non solum disponi ad motum sed etiam actu ipso moveri: quæsiiti vero de principio spiritus animales movente, ajunt, fieri determinationem hancce spirituum animalium vi legum mechanicarum: cum vero facile perspiciant motore adhuc opus esse alio, qui scilicet machinam corporis humani hydraulico-pneumaticam, die menschliche Wind- und Wasser-Mühl / movere queat, externum principium, scilicet aërem, particulis ramosis & globulis æthereis minutissimis constantem, quærunt, qui omnium admirandorum in corpore humano contingentium effectuum est causa: quamprimum

mum enim pulmones intrat eosque expandit, motus sanguinis progressivus & intestinus statim sequuntur, secretiones instituuntur & excretioness, & quæ sunt alia: omnium vero maximum edunt effectum minutissimi illi globuli, qui cum sanguine ad cerebrum lati ope glandularum fecernuntur & in nervos infunduntur, per quos ad omnes partes feruntur, & quicquid vides in corpore præstant; in cerebro enim ex motu globulorum horum variæ oriuntur idææ, ab harum vero agitatione cogitationes ortum ducunt: im reliquis partibus movent, secernunt & quæ sunt alia.

§. 8. Sed quamvis admodum compta sit hæc Philosophia, statim tamen apparet, quantum ponderis ipsi insit: quæ enim necessitas postulat, principium motus aliunde accersere? cum tamen Spiritus ad movendum aptissimus & corpori arctissime unitus, in homine reperiatur, ejusque essentialem & potiore partem constituat. Cui bono minutissimæ illæ minutæ & harum diminutiva ac hisce adhuc longè minores minutæ, globuli scilicet ætherei, qui non nisi superiori seculo in Physicorum cerebris nati & tornati sunt? eodem modo se res habet, cum particulis aëris ramosis & plumosis: ubi nam priscis temporibus hæc erant commenta? Nihilominus tamen hæc ipsa ad hominis cognitionem, ad sanitatis conservationem, ad morborum curationem &c necessaria judicantur, & tricis hisce Medici libri commaculantur.

Con-



Contrarium veritati magis consonum esse credo, & firmissime persuasus sum, quòd quo magis Medici & Philosophi talibus rebus intenti sint, eo magis ab intimiore hominis cognitione recedant: Hominem enim si considerare volunt, cur eum, ut a Deo conditus est, non considerant? cur ea, quæ Deus conjunxit, animam & corpus, dividunt? Ego sane nullam prægnantem video causam: quare etiam harum minutissimarum minutiarum Patroni mihi vitio haud vertent, si de minutiis hisce magnificum ferre nequeo iudicium: de minutiis enim non nisi minute sentiendum esse existimo.

§. 9. Sola E. anima est quæ corpus movet, & ejus motibus ad finem propositum assequendum utitur: ipsa enim anima conscia est, se movere brachium aut manum, & scit, voluntatem ejus sequi motum manus. Sed regunt, animam nescire modum, quomodo brachium moveat: egregia sane objectio: cogitamus, modum nescimus, Ergo non cogitamus: movemus brachium, modum ignoramus, E. brachium non movemus: quamnam consequentia? nonne absurda? Sufficit in rebus arduis & abstrusis scire factum, etiamsi modum ignoremus.

§. 10. De nervis adhuc notandum, quod nondum adeo liqueat, quomodo ad motum concurrant: possunt tamen forsitan concurrere sequenti modo: Occurrunt scil. in quovis  
V s mu-

musculo duplices fibræ carnez atque nervosæ, quarum hæ illas ambiunt : illæ sanguinis, hæ verò fluidi nervei influxum requirunt : nervosæ semper turgidæ sunt & talis turgiditas quoque in ipsis nervis occurrit, unde etiam aliquo modo tensi sunt, & dissecti in partes retrahuntur : quando E. motus est instituendus, nervi leviter tracti, ope fibrillarum musculos transversim ambientium, fibras carneas constringunt, atque sic efficiunt, ut musculus intra se contractus, breviorque redditus, partem, cui tendendo ejus adhæret, ad se trahat. Si verò cui-dam hæc opinio non arridet, is meliorem tradat, me enim facile consentientem habebit.

§. II. Cum de vigiliis quoque Medicorum & imprimis Physiologorum libri tractent, paucis annotasse sufficiat, vigilias nil nisi alacritatem animi in sentiendo & cogitando esse, quando nimirum sensus & cogitationes, quæ se invicem continuo comitantur & hinc inseparabiles sunt. debito vigore & alacritate peraguntur, & motus etiam, sensus ordinarie sequentes, alacriter fiunt. Plura de *Motus voluntarii usu Medico* & de *Vigiliis* vide *infra de Conservatione Sanitatis*.

## CAPUT X.

De

## Somno &amp; Quietē.

§. I.

Quamvis motus & labores corporis hominī admodum proficui sint, & ad vitæ & Sanitatis conservationem multum conferant : ac præterea ad pericula avertenda sensuum ministerio & cogitationibus fere semper opus sit : nihilominus tamen ob continuum tam sensoriorum organorum, quam reliquarum partium motum & usum, facile organa sensoria labefactari, partes motui inservientes absumi, & reliquarum quoque partium sive viscerum actiones, verbo secretiones & excretiones, turbari possent, nisi altissimus Creator hominibus *Somnum & Quietem* concessisset, ut eorum ope corpus ejusque partes debilitatæ pristinum robur recuperare possent.

§. 2. Quare hoc intuitu *Somnus* non cœu mere passivum quid, sed potius respectu Principii moventis cœu activum quid est considerandus : & uti omnis partium activitas (cœu multis in locis jam probatum fuit) à solo Principio movente dependet ; ita quoque cessatio actionum & remissio eidem Principio adscribenda est.

§. 3.



§. 3. Quod ut eo melius pateat, considerandum est, quod Natura organa sensoria & partes motui inservientes, ut eo facilius scopum ejusdem inservire queant, leniter extensa servet, & hoc ipso efficiat, ut sensoria eo facilius ab objectis externis affici, & judicium ac usus rationis, perceptionem immediate sequens, legitime procedere queant. Ne vero organa nimis debilia reddantur, Natura interdum tensionem illam remittit, unde non solum organa sensoria ad percipiendum minus capacia, sed etiam totum corpus admodum torpidum redditur: & quo magis Natura tensionem illam relaxat, eo minus quoque postmodum objecta sensibilia in organa sensoria agere possunt. Hanc relaxationem pressa pede sequitur etiam cessatio perceptionis in cerebro, phantasiæ atque rationis: cum enim ratio & phantasia actionem objectorum in organa sensoria præsupponant, facile apparet, cessante hac actione phantasiam cessare. Et hæc etiam cessatio summe est necessaria, quoniam continuæ cogitationes & mentis operationes non solum corpus insigniter debilitant, sed sæpius etiam deliria produ-  
cunt.

§. 4. Nunquam tamen plenarie cessant hæc mentis operationes, sed interdum adhuc aliquo modo in somno continuantur: unde quando Phantasia circa ideas, propter objecta interdum ipsi oblata formatas, occupata est, insomnia oriuntur, quæ etsi nil nisi confusa idea-  
rum

um repræsentatio sint, sæpius tamen multum  
 quoque veritatis ipsis inest & res vivide satis  
 sæpius in insomniis quoque proponuntur: ita  
 nota mihi sunt exempla quædam, ubi homi-  
 nes, etsi fundamentum & veritatem rei cujus-  
 am multis meditationibus interdum quæsi-  
 verunt, nihil tamen prorsus efficere potuerunt, qui-  
 bus tamen in insomniis res adeo clare & di-  
 stincte exhibita fuit. ut expergefacti absque ul-  
 la hæsitazione problemata proposita resolvere  
 potuerint. Nil dicam de variis revelationibus  
 quæ sæpius sanctis hominibus, imo ipsis quo-  
 que Ethnicis in insomniis factæ fuerunt, ne So-  
 niatorum numero ab iis adscribar, qui in tali-  
 bus rebus nimis sunt scrupulosi. Nec etiam  
 omnes corporis actiones, sed quædam tantum,  
 mirum animales, cessant: Vitales vero qua-  
 si sunt *Pulsus*, *Respiratio* & *Secretiones* in somno  
 iam continuo procedunt, quoniam ab hisce  
 vita immediate dependet, & hisce cessantibus  
 cessat.

§. 5. Quamvis autem Natura respectu  
 animalium actionum aliquo modo otiosa sit,  
 interdum ita ab iisdem abstrahat, ut etiam ne  
 tantam quidem exerceat, quod in somnio  
 sæpius profundiori contingit: respectu tamen  
 rationalium actionum nunquam otiosa, sed iisdem  
 continuo intenta est & vigilat, ut quæ ad corpo-  
 ris conservationem tendunt actiones, in perpe-  
 tuo vigore conserventur. Ex hætenus E. al-  
 tis satis apparere potest somnum respectu

Prin-

Principii moventis non esse passionem, sed potius actionem.

§. 6. Dictum jam fuit Naturam remittere à tensione partium & motum earundem tonicum relaxare, id quod certissimum est & exinde apparere potest 1. quod ingruente somno palpebræ sensim conniveant & oculos tandem prorsus claudant. 2. quod nutet caput, artus enerventur & pedes vacillent ac tandem corpus proprio pondere concidat & decumbendi necessitas quam maxime urgeat. 3. quod totum corporis habitus notabiliter turgidus reddatur magis floridus sit, & sudor facile sequatur palpebræ inprimis sunt admodum turgidæ, etiam quando jam somnus cessavit; unde *Germani* dicunt, er habe dicke verschlaffene Augen. Quæ omnia motum tonicum in somno remissionem esse & majorem humorum copiam in habitum corporis infundi, satis manifeste probant.

§. 7. Circa somnum adhuc quam maxime notandum est 1. quod respectu temperamentorum magna in eo deprehendatur differentia, *Phlegmatici* enim & *Sanguinei* magis propensum sunt ad somnum quam *Cholerici* & *Melancholici*. 2. quod juniores quoque longe diutius & profundius dormiant, quam adulti & senes. 3. quod, quo magis homines curis & sollicitudinibus, ut & profundioribus meditationibus incumbant, eo facilius expergiscantur. 4. quod multi, qui sibi proponunt certum surgendi tem-



us, circa idem tempus expergiscantur. §. quod dormiendi tempus facile abeat in consuetudinem : ita qui hodie hora prima pomeridiana dormivit, cras facile quoque eadem hora propensionem ad somnum sentiet.

§. 8. Quæ omnia si paulo accuratius perbendimus, facile animæ potentiam & concursum ad somnum ac somni propulsionem deprehendimus: cum enim phlegmatici alias admodum sint torpidi ac incurii, nec etiam sanguinei curis adeo obnoxii sint, securi proinde & ad somnum magis propensi sunt. Cholerici vero & Melancholici, & ii qui frequentioribus curis tentantur, aut profundioribus meditationibus incumbunt, cum semper ingenium exerceant ac propositæ rei semper intenti sint, non facile somnum experiuntur & facile quoque expergiscuntur, quoniam anima iis instrumentis, quibus alias ad somnum capeffendum quietem concedere debet, continuo utitur : & hinc etiam ratio est petenda cur homines ex proposito certis horis evigilent, quoniam enim etiam in somno circa hanc rem occupata est anima, & finem propositum assequi conatur, facile quoque circa definitum tempus in sensoriis pristinam tensionem excitare potest, ita ut hinc apta iterum evadant ad objectorum in perceptionem.

§. 9. Cur vero juniores & infantes diutius & profundius dormiant, ratio hæc esse videtur: quod scil. in infantibus & junioribus, debitam

cor-

corporis proceritatem nondum nactis, Natura potissimum occupata sit in dirigendis & rite instituendis actionibus vitalibus, ut harum ope corpus debito modo nutriatur & augeatur: cum vero operationes hæ omnium optime in somno procedant, Natura studio somnum provocat, ut eo melius actiones vitales instituere queat: unde etiam, quoniam Natura hisce potissimum intenta est, ratio in junioribus adhuc admodum debilis est: si vero in juniore quoque ætate & quidem præmature acrioris jam ingenii sunt, signum est, Naturam non adeo intentam esse actionibus vitalibus; quare etiam vel valetudinarii fiunt, vel mature fatiscunt. In adultis vero, viris & senibus, quoniam Natura magis actibus rationalibus incumbit, ac simul curæ sapius copiosæ accedunt, quid mirandum est, si ad somnum minus propensi sunt. Somnus enim animi tranquillitatem præsupponit, qua si homines privati sunt, vel somnum capere nequeunt, vel ex somno sapissime excitantur, vel insomniis variis & gravioribus ac corpus quoque quam maxime debilitantibus, vexantur.

§. 10. Quamvis autem Natura, uti supra monitum fuit, sit causa somni, & in hac ipsa corporis quiete ejus conservationem querat, dantur tamen adhuc aliæ causæ, quæ sapius Naturam disponunt, ut eo facilius somnus sequatur: quæ tamen dispositio non ita interpretanda est, ac si certi dentur vapores, quæ ani-

mam

mam quasi obnubilent, ac ad agendum ad cer-  
 tum tempus inhabilem reddant : natura enim  
 presentibus hisce causis nihilominus active  
 se habet, uti mox audiemus. Causarum ha-  
 rum frequentissima est 1. *pastus largior* : hu-  
 jus rei rationem vulgo allegant hanc, quod, dum  
 copiosus & crudior adhuc chylus Massæ San-  
 guineæ affundatur, vasa totius corporis turgida  
 reddantur : & cum hoc ipso vasa cerebri ni-  
 mis repleta principium nervorum compri-  
 mant, & uberiores spirituum in organa sen-  
 soria & reliquas partes influxum aliquo modo  
 cohibeant, sequi motus tonici relaxationem &  
 somnum. Sed quamvis hæc ratio sua proba-  
 bilitate non careat, magis tamen probabile mihi  
 videtur, animam consultò post pastum remit-  
 tere sive relaxare motum sensoriorum reli-  
 quarumque partium tonicum, ut eò facilius  
 sibi ingesti digeri & in nutrimentum corporis  
 postmodum converti possint. Idem esto judi-  
 cium 2. de somno profundiori post *potum Vini*  
*fortioris aut liquorum spirituosorum largiorem* : cum  
 nimis hisce multæ partes sulphureæ nimis ca-  
 dæ & corpori minus proficue insint, Natura  
 necessario harum secretioni & remotioni è cor-  
 pore tam per transpirationem, quam per secre-  
 tionem in hepate & renibus incumbere debet :  
 cum verò hæ secretiones in somno longè feli-  
 cus succedant, Natura etiam somnum excitat  
 profundiores, ut ea, quæ corpori noxia sunt,  
 movere queat : quo fine si Natura potitur,



ebrietatem pauca sequuntur incommoda, si vero non contingunt hujusmodi secretiones dolor capitis, appetitus prostratus & lassitudine corporis præstò sunt. Eodem modo se res habet 3. post *assumptum opium*: siue enim hoc particulis viscidis, siue sulphure admodum volatili & in parva quantitate summè activa particulis viscidis immerso, in corpus & humores agat, corpori tamen minus proficuum est: quare Natura, ad removendas hasce partes utique somno profundiori opus habet; quo magis enim viscida sunt partes, eò majori cum molestia & longiori temporis impendio remouentur. Quapropter, quod obiter hoc loco notandum, in morbis, ubi Natura Secretiones & Excretionem humorum inutilium molitur ab usu opii abstinendum est, quatenus hoc cum Natura hujus excretioni simul intenta esse debet, reliquæ Secretiones & Excretiones retardantur, aut summo cum periculo prorsus supprimuntur. 4. Somnum quoque maximè promouet *Sensibilium objectorum defectus*: quare etiam summus rerum Creator noctem hominibus aliisque animalibus concessit, ut per laboris interdiu deperditas vires noctu, ubi omnia tranquilla sunt, in somno recuperare queant. Hic etiam si interdiu dormire cupimus, tranquillitatem quærimus. Cum enim sensoria ab objectis in locis tranquillis non afficiantur, ratio etiam ratio habeat, quod agat, Natura actionibus vitalibus eò magis incumbit. 5. *Consue-*

si enim quis assuetus est somno meridiano, satis horis somno corripitur: quod etiam valet de reliquis consuetis dormiendi horis, quibus appropinquantibus somnus ingruit & sæpius vix non nisi magno labore præcavèri potest.

§. 11. Quamvis autem somnus restaurans corporis viribus maximè inserviat, & homines ad labores animi & corporis feliciter peragenda habiles reddat: nihilominus tamen sæpius homines reperiuntur, qui ex sola desidia somno nimis indulgentes, ad labores subeundos admodum inepti evadunt: imo talis terror, desidia & incuria postmodum quoque in reliquis actionibus moralibus observatur.

§. 12. Ad vires restaurandas maximè quoque concurrit *Quies*, quæ labores tam animi quam corporis excipit. Hæc autem quies non semper in simplici actionum animalium cessione consistit, sed sæpius alius labor alteri substitutus quietis loco esse potest: ita v. g. si quis diutius libris affixus hæsit & Phantasiam nimis exercuit, aliud quid agendo, deambulando, confabulando, musicam exercendo &c. quietem concedit Phantasie, quæ hinc paulo tempore vires faciliè recuperat: Similiter quoque quies oculis conceditur, si musicales delectat: ut alia exempla silentio prætermittam.

## CAPUT XI.

De

## Propagatione Hominis

*sive*

## Generatione.

§. I.

**Q**uoniam corpora humana tam mixtionis quam structuræ respectu destructioni admodum sunt obnoxia, ac eandem quoque post mortem experiuntur, brevi totum interiturum esset Genus Humanum, nisi Altissimus Creator utrumque sexum condidisset, eumque aptis generationi dicatis instruxisset organis, quorum ope Genus Humanum propagaretur.

§. 2. Quò verò propagatio hæce eò facilius contingeret, Deus & maribus & feminis ardentissimum prolem generandi concessit desiderium sive *Appetitum Venereum*. Hic tamen appetitus non omni, sed eo demum tempore se exerit, quando genitalia debitam nacta sunt conformationem & magnitudinem, ac in maribus semen generari incipit, in feminis vero menses fluunt, verbo, quando socius, solitudinis pertæsus sociam, & hæc socium quærit.

§. 3. Circa hocce prolis generandæ desiderium adhuc notandum est, id respicere utrumque sexum: homines scil. matrimonio junctos

non



non masculini tantum, sed & feminini sexus prolem expetere: cujus quidem ratio Physica admodum obscura est, adeò, ut etiam homines quæsit, quare adeò ardentem vel puerum vel puellam desiderant interdum, nullam aliam proferre queant causam, quam pulchrum esse utriusque sexus liberos habere. Quare veritate magis consonum esse credo, desiderium hocce in prima creatione Protoplastis & postmodum omnibus hominibus impressum esse: cum enim, teste Scriptura Sacra, Deus ideò utrumque considerit sexum, ut Genus humanum propagaretur, necessario quoque desiderium prolis, quod in hominibus deprehenditur, utrumque sexum respicere debet. Si verò cuiquam simplex hæc ratio non arridet, is aliam ex Physica quâcunque proferat, sed in ejusmodi rationem quâcunque demum illa sit, Germanorum illud, *das läßt sich wol hören / aber es hält den Stich nicht* / optimè quadrare, facile deprehendet.

§. 4. Quo autem in hac de Generatione difficultatis plena materia eò facilius progrediamur, agemus 1. De Conceptione. 2. De Nutritione Fœtus in Utero & 3. De Partu.

## MEMBRUM I.

De

*Conceptione.*

§. I.

**V**T conceptionis negotium eò facilius procedat, non solum partium genitalium in utroque sexu legitima & conformatio & figura, sed et aliarum rerum ad generationem concurrentium iusta constitutio requiritur, sine quibus vel manca vel nulla sæpius est conceptio. In viro quidem requiritur 1. iusta *membri magnitudo* 2. ejusdem *erectio*. 3. *Seminis boni elaboratio* & *asservatio* ac tandem 4. ejusdem *in arvum Naturæ ejaculatio*.

§. 2. *Magnitudo membri* neque excedat neque deficiat, utroque enim modo conceptio aliquo modo impeditur, dum *parvum* nimis membrum semen non sufficienter in profundum vaginæ ad uteri orificium usque injicere potest: nimis verò magnum vel prorsus non potest, vel tamen non sine insigni dolore in vaginam immitti potest, unde vel seminis immissio ad locum debitum impeditur, vel sensus ille gratiæ titillationis, quam plerique Physicorum ad faciliorem conceptionem requirunt, cessat.

§. 3. *Erectio membri* ad Generationis operum maximè necessaria est, si enim hæc non contingit, etiamsi semen laudabile adsit, hoc ma-  
nimis

nime ad uterum ferri potest : unde etiam, qui *impotentes* sunt, semper *flaccidum* habent *membrum*, id quod etiam in *senibus* & *emeritis* contingit. *Erectionem* autem *anima*, omnium aliarum actionum in corpore causa, producit, quod exinde apparere potest, quod solam interdum *coitationem* aut confusam etiam *phantasiam* in *in-somniis* *erectio* membri & *seminis effusio* sequatur, uti id *pollutiones* sanorum hominum *nocturnæ* testantur. Ad hanc *errectionem* maximè conferunt *cavernosa* penis *substantia* & *musculi* *erectio-nes* dicti; dum enim sanguis per arterias in penis *substantiam* maiori copia infunditur, *musculi* verò posteriorem membri partem contringunt, & sic promptum sanguinis per venas *refluxum* impediunt, necessario membri *intumescentia* & *rigiditas* sequi debet.

S. 4. Quod *seminis elaborationem* in testibus & *asservationem* in vesiculis seminalibus concernit, de ea supra jam dictum fuit, restat itaque de ejus *emissione* pauca dicamus. Hæc sanè *erectio* esse debet, unde etiam vulgo *ejaculationis* nomen usurpant Authores: si enim nimis debilis est, nec debito vigore perficitur, semen in *ar fulguris*, uti Bohnius loquitur, in arum *Natura* minimè penetrare potest: hinc qui ob frequentem coitum, membrique debilitatem semen non nisi guttatim absque impetu emittunt, ad *Generationem* vix habiles sunt. Concurrunt ad hanc fortio-rem *ejectionem* *fibræ vesicularum seminalium* & *urethræ*: semine enim in



coitu sufficienter spumefcente reddito, fibræ vesicularum contrahentur & semen in iisdem contentum per duos *angustos meatus* in urethram exprimitur; quoniam verò hoc ipso momento fibræ partis *urethræ* posterioris valide contrahuntur, semen hinc cum impetu expellitur.

§. 5. In *feminis* verò requiritur præter justam ætatem 1. *Legitima partium genitalium* tam internarum quam externarum constitutio, 2. *Mensuum fluxus*: & 3. *Ovulorum verorum & maturorum præsentia*. Partium Genitalium superius *Cap. II.* jam facta fuit mentio, quare de illis hoc loco prolixum instituere sermonem nolumus: illud tamen adhuc dicendum est, ad conceptionem ante omnia requiri, ut vagina uteri tantam habeat amplitudinem, ut membrum virile admittere queat, quod si non contingit, conceptio quoque erit frustranea. De mensibus pariter superius jam dictum fuit. Quod autem *ovula* concernit, ea vulgò distinguuntur in *vera* & *subventanea*, quæ etiam à quibusdam *hydatides* appellantur. In hisce *prima* fœtus rudimenta latere, *Malpighius* ex frequenti & solerti ovorum gallinaceorum inspectione didicit. An autem omnes partes jam sint formatæ, & postmodum tantum per nutritionem expandantur & augeant, nondum adeò constat: illud nihilominus tamen certum est juxta *Malpighium* aliosque, qui accuratius omnia examinarunt, *cerebrum*, *spinalem medullam* & *nervos*, verbo, partes animalibus actionibus inservientes primò omnium

conspici, quas punctum postmodum saliens sive cor sequitur. Ovula autem quæ ad conceptionem requiruntur, vera debent esse atque *matura*: vera sunt, quæ contradistinguuntur *subventaneis*, quæ scil. prima foetus rudimenta non includunt, sed *lympham* tantum in se continent & hinc ad conceptionem inepta sunt. *Matura* verò sunt, quæ eam acquisiverunt perfectionem, ut à femine virili imprægnari possint: si verò immatura fuerint, ad conceptionem inepta sunt. Hæc autem ovulorum maturitas potissimum dependet à successiva nutritione, quam præstant rami arteriarum spermaticarum, quæ lymphæ gelatinosæ puriore parte testes, eorumque glandulas molles, & vesiculas, quæ racemum quasi constituunt, irrigant, undè primitus glandulæ luteæ & ex his demum vera succrescunt ovula, quorum latentia prima germina sive rudimenta continuo affluxu nutrita & irrigata plenam tandem acquirunt maturitatem.

§. 6. Quo in loco ovula imprægnentur nondum adeò liquet: plerique affirmant conceptionem fieri in ipso ovario, & ovulum fecundatum postmodum descendere per *Tubas Fallopianas* ad uterum. Pro hacce sententia pugnat imprimis avtopsia Anatomica, quâ constat ovula imprægnata in ipsis tubis deprehensa fuisse. Dantur autem nihilominus alii, qui existimant, in coitu fecundo ovulum ferri ad uterum & in ejus cavitate imprægnari: ad probandam suam sententiam dicunt, ova interdum

matura, absque ullo prægresso coitu, in salacibus, ob nefariam genitalium frictionem, ad uterum devolvi: quod, an veritati consonum sit, me nescire lubens fateor.

§. 7. Dum E. in coitu, ob continuam attritionem membri virilis in vagina, semen magno impetu per vaginam in uterum injicitur, subtilior ejus & maximè spirituosæ portio ovulum instar fulguris penetrat, ac primum principium agens ipsi communicat: crassior verò seminis pars, annotante Harveo in brutis, ex utero iterum effluit. Ipsum autem ovuli ex ovariis per tubas in uteri cavitatem descensum promovent ipsarum tubarum extremitates, quæ, etsi cum testibus immediatè non cohæreant, in coitu fœcundo turgidæ redditæ, testes ambiunt & constringunt, ac hoc modo ovulum imprægnatum ex testibus in tubas expriment: undè etiam plerumque in testibus, si post conceptionem inspiciuntur, cicatrices adhuc apparent, & tuba per quam ovulum ad uterum provolutum fuit, turgida admodumprehenditur: uti id ante elapsos aliquot annos in Theatro Anatomico cernere licuit.

§. 8. Qua ratione autem ovulum imprægnetur, quidnam sit, quod motum primis rudimentis imprimit, & à quonam parentum proveniat principium illud movens, admodum obscurum est. Quis enim concipere potest, quomodo liquor sive lymphæ in testibus secreta & aliquali spissitudine gaudens, admirandum conceptionis



ceptionis opus perficere possit? captum sanè hæc superant humanum: quæ enim de motu Recentiores hic proferunt, parum lucis in re tantæ obscuritatis afferunt.

§. 9. Quidnam sit in semine, quod' primum motum rudimentis in ovulo contentis inprimit, & conceptionem inchoat, quàm maximè controvertitur: plerique ad *Spiritus varios insitos, influos, vitales, animales, archeos, vim plasticam* &c. confugiunt; sed si rem accuratius examinamus, facileprehendimus, gravissimis fictitia hæc principia agentia premi difficultatibus: nam, ut nil dicam de nondum probata horum principiorum existentia, ante omnia supponi debet, quod generatio sit res magni momenti, quæ requirit principium intelligens & sufficienti cognitione instructum, quod omnia ita dirigere, succum nutritium partibus formatis & formandis ita apponere & assimilare queat, ut iusta non solum totius corporis, sed & singularum partium, structura & conformatio indè resultet: quis autem omnibus hisce principiis, si sanæ rationis ductum sequi cupit, aliquam cognitionem tribuere potest? materialia sunt omnia hæcce principia, nec major ipsis inest cognitio, quam lapidi aut trunco.

§. 10. Potius E. anima humana, cujus potestas in actiones vitales & animales superius asserta fuit, causa primi motus in ovulo & conceptionis statuitur: nam propter animam in principio rerum corpus creatum est, ut ei præbeat

beat domicilium & instrumenti loco sit, quem ob finem anima etiam corpus suum ex omnibus periculis, quantum quidem possibile est, eripere & in integritatis statu conservare conatur. Quod autem eò magis probat, animam humanam non dirigere tantum, sed & perficere conceptionis opus, est quod anima fœtus instruendo corpore occupata sæpius res, ad structuram corporis non pertinentes, & quidem juxta ideam istam, quam anima matris ipsi communicavit, formet: unde varii postmodum nœvi in corpore observantur *materni*.

§. II. Reliquæ quæ adhuc moventur quæstiones, *quomodo anima cum semine communicetur? à quonam parentum proveniat? an, si ab utroq; parentum dependeat, possit dividi? an creetur immediate à Deo? an si creetur, primò statim conceptionis momento, an verò quarto demum post conceptionem mense vitam fœtui largiatur?* & quæ sunt alia, ad Medicum forum non spectant, & hinc etiam à Medico harum quæstionum solutio expectari minimè debet. Si tamen aliquid dicendum est, responderi potest ad *primam*, modum communicationis esse incomprehensibilem & sufficere quod anima communicetur corpori, atque potentiam habeat non solum in corpus formatum, sed etiam adhuc formandum, quod nœvi materni satis superque comprobant. Ad *secundam*; determinari non facile posse à quonam parentum proveniat anima, probabile tamen videri, eam à solo patre proficisci, matris tamen ani-

animam postmodum magnam in fœtus animam obtinere potentiam eique multas tam perversas quam bonas ideas imprimere, quas postmodum fœtus in lucem editus, sæpius per totam vitam tenaciter servat. *Ad tertiam*: incomprehensibilem, sed sterilem, esse hanc questionem, nec, etiamsi admittatur divisio, animæ nobilitati & essentiæ aliquid detrahi: cum enim animæ essentia potissimum in vi motoria consistat, motus autem in perpetua divisione numerica ita consistat, ut motus hujus momenti, non sit motus vel præteritorum vel futurorum momentorum, quid impedit, si quis argumentaretur, motus est res adeo divisibilis, E. etiam movens dividi potest. vid. *Dn. D. Stahlj Theor. Med. P. I. p. 252.* *Ad quartam*: argumenta quidem non deesse satis probabilia, ex quibus concludi possit, animam immediate à Deo creari & fœtui communicari, probabilius tamen videri animam à parentibus in liberos per traducem, ut vulgò loquuntur, propagari, ideò quod Deus 1. teste scriptura sacra, finita Macrocosmi & omnium tam animatorum quam inanimatorum in eo contentorum creatione quieverit. 2. quod si Deus immediate animam produceret, necessario quoque peccato originali commaculatam & impuram ac impiam creare deberet, quod tamen impium videtur. 3. quod homo, si totum hominem generare nequiret, imperfectior reliquis viventibus, quæ totam speciem per generationem propagant,



pagant, censendus esset. 4. quod benedictio illa divina, *crecite & multiplicamini* non de corpore tantum sed de toto homine necessario intelligi debeat: si enim reliqua viventia, vi ejusdem benedictionis divinæ, totam speciem generant, cur in homine ejusdem benedictionis efficacia cessare debet? Non tamen in quovis coitu aut quavis seminis emissionem animam propagari dicendum est, sed in ea tantum quam Deus fecundam esse vult: adeoque uti *liberi*, teste scriptura, *donum Dei sunt*, ita concursus Dei atque benedictio divina in quovis coitu fecundo necessario supponi debet: quemadmodum enim in conservando corpore anima omnem vim agendi à Deo obtinet, & subtracta hac vi nihil prorsus agere, ac hinc in levioribus etiam morbis causas, corpori interitum inferentes, remove nequit, ita quoque in generationis opere anima, etiamsi quam maxime velit, subtractâ benedictione divina, prorsus nil efficere potest. Ad *ultimam*: probabilius esse *animam statim in primo conceptionis momento ovulo communicari*: cum enim fœtus statim nutriatur & augeat, hæ autem actiones vitam præsupponant, vita verò hominis, uti superius probatum fuit, ab anima principaliter dependeat, necessario quoque anima in primo statim conceptionis momento, si fœtus nutriri & vivere debet, ovulo communicari debet.

§. 12. Hæc E. ovulo infusa anima fœtus format, aut, si juxta plurimorum sententiam  
omnes

omnes partes jam formatæ sunt, easdem nutrit ut augeri & conspici queant. Quod autem anima foetus corpus suum nutriat, apparet potissimum ex ovis à Gallo Gallinaceo imprægnatis, quam primum enim calor externus accedit, sive is à Gallinis tam nostratibus quam Indicis sive à furnis proveniat, principium illud activum statim nutrit & struit corpus suum: cum è contra ovis non imprægnatis, etiamsi quamdiu Gallinis subdantur, aut calori exponantur, loco pulli putridum liquamen prodeat: adeo, ut ex hoc ipso appareat, calorem externum sive incubatum aliquo modo promoveri quidem pulli formationem, principium tamen activum ovo inexisterens veram formationis & nutritionis pulli esse causam. Si E. principium movens sive anima pullorum potentiam struendi & nutriendi corpus suum habet, necessario quoque eadem vis animæ humanæ tanquam excellentiori principio concedi debet.

§. 13. Quo verò eò felicius in struendo corpore progredi queat, instrumenta motus primaria *cerebrum & spinalis medulla* præsto sunt, ut horum ope in nutriendo corpore uti possit: ad nutritionem enim faciliter peragendum opus est dilatatione pororum & extensione partium, ut nutrimentum eò facilius poros ingredi & apponi possit. Præstat autem hanc extensionem partium anima per *motum tonicum*, de quo superius jam dictum fuit: cum verò, dum anima nervos movet, ipsi quoque nervi ad cor

ten-

tendentes moveantur, primis diebus cor leniter & obscure, postmodum verò, ubi beneficio motus cordis primum ovuli liquamen in sanguinem conversum fuit, & *punctum saliens* apparet, fortius pulsatur ac hoc ipso pulsu postea nutrimentum ad partes tenellas, ope motus tonici extensas, propellitur.

## MEMBRUM II.

De

*Nutritio Fœtus in Utero.*

§. I.

**F**œcundatum itaque in ovario ovulum per *tubas Fallopianas* movetur ad uterum, ut ibidem nutriatur, augeatur & ad partus usque tempus asservetur: quem in finem elapsis aliquot diebus (cum nutrimentum in ovulo contentum pro ulteriore fœtus nutritione non sufficiat) mediantibus *parvis fibrillis* utero annectitur, ut ex ejus substantia materiam nutritiam accipit.

§. 2. Ab exteriori scil. fœtus tunica, quam *Chorion* vocant, plures fibrillæ satis conspicuæ, prodeunt, & instar radicum in tubulos uterinos, ex arteriis prodeuntes, implantantur, ac advectum per arterias nutrimentum recipiunt & ad embryonem vehunt. Hæ ipsæ autem fibrillæ cum uteri tubulis conjunctæ, dum indies majores & ampliores redduntur, postmodum



dum constituunt *Placentam uterinam*, quam alii *Hepar* quoque uterinum vocant; quoniam quoad texturam Hepati fere similis est.

§. 3. Fertur autem nutrimentum ex *Placenta uterina* per *Venam umbilicalem* ad fœtum ejusque *Hepar* ac tandem ad *Cor*, ut hujus pulsu ad reliquas corporis nutriendas partes propellatur. An autem hæce sola via ad nutriendum fœtum sufficiat, an verò nutritione per os adhuc opus sit, nondum convenit inter Physiologos. Qui posteriorem sententiam defendunt, dicunt 1. Quod fœtus liquori amnii gelatinoso & maximè nutritio innatet. 2. Quod in intestinis fœtus, excrementa nigricantia (quæ vulgò *Meconium* aut *Papaverculum* vocantur) continerentur, manifesto indicio, fœtum aliquid per os recipere. 3. Quod fœtus plerumque ore aliquo modo aperto in liquore amnii jaceat. 4. Quod *Hippocrates* fœtum in utero sugere affirmet. 5. Quod nutritio per umbilicum minimè sufficiens sit: quare tandem concludunt, per os, obmodò allegatas rationes, nutritionem necessario esse concedendam.

§. 4. Quamvis autem hæce argumenta probabilitate non careant, magis mihi tamen probabile videtur, fœtum tantum per umbilicum nutriri: quoniam 1. nulla sufficiens ratio allegari potest, cur nutritio per umbilicum non sufficiat: si enim in homine adulto, magnitudine fœtum maximè superante, *ductus thoracicus*, quoad multorum sententiam, ad advehendam

V

dam

dam materiam nutritiam sufficit, vena quoque umbilicalis, quoad capacitatem ductum thoracicum superans, in fœtu sufficere poterit. 2. Quia absque respiratione impossibilis est suctio: cum E. certissimum sit fœtum in utero non respirare, quomodo sugere poterit. Quod vero 3. *Meconium* concernit, falso exindè concluditur, quod fœtus quoque per os nutriatur: nam meconium illud nil nisi serum mucosum est, quod per glandulas secernitur, ac in cavitatem intestinorum infunditur: cum verò eidem etiam portio bilis excrementitiæ jungatur, aliquo modo nigricantem postmodum acquirit colorem.

§. 5. Quo verò fœtus nutritio & formatio eò melius procedere queat, fœtus duabus *membranis* cinctus est, quarum exterior & robustior *Chorion*, interior verò & tenerior *Amnion* vocatur: in harum cavitate reperitur liquor, qui vulgò *liquor amnii* audit. Undè autem hic amnii liquor proveniat, admodum inter Physiologos controvertitur, alii enim fœtus sudorem, alii ejus salivam, alii ejusdem urinam eum esse asserunt: alii verò cum *Bohno* ex ejusdem mammillis eum exsudare putant: probabilior mihi præ ceteris videtur sententia *Bergeri* *Physiol.* p. 478. qui existimat, *lympham amnii* esse *succum à sanguine matris*, ex arteriis uteri, per sinus hujus & *vaginulas*, ac *pupillas placentæ porosas*, & *chorij*, *amniq. meatus*, in hujus cavum transmissum.

§. 6. Nutritur itaque fœtus, uti antea jam dictum fuit, per *venam umbilicalem*, & ob affluentem

entem puriorem & copiosiore nutritium succum indies augetur, ita quidem, ut elapsis duobus mensibus formicam maiorem magnitudine vel æquet vel superet, ac *caput, oculi* atque *artus* jam in conspectum veniant: elapso tertio mense *digiti* manuum atque pedum apparent, ac *sexus* quoque ipse cognoscitur. Durat hæc nutritio & auctio usque ad vigesimam septimanam, ubi fœtus, qui hætenus quasi immobilis in integumentis suis jacebat, se *movere* incipit. Reliquo tempore, scil. usque ad finem *septimi mensis* tota corporis atque singularum partium formatio absolvitur: cum verò partes adhuc admodum teneræ sint, & aëris externi injurias nondum ferre possit, permanet in utero usque ad finem noni vel principium decimi mensis, eum quidem in finem, ut partes eò firmiores reddantur. ||

§. 7. Quamvis autem fœtus hoc modo nutriatur & augeatur, non tamen toto hoc tempore respirat, quæ enim de *vagitu uterino* proferunt, vel miraculosa vel falsa sunt: quod autem fœtus in utero non respiret, exindè possimum apparet, 1. quod *pulmones* fœtus admodum sint *compacti*, ita quidem, ut aquæ injecti statim instar lapidis fundum petant, semel-terò inflati, etiamsi aër summo studio exprimatur, nunquam submergantur. 2. quod *pulmones* fœtus *antliæ pneumaticæ* inclusi, aëre exacto prorsus non intumescant, quod tamen necessario contingere deberet, si aërem in se



continèrent. 3. quod uterus arctissimè clausus sit, ac tunicæ satis densæ cum amnii liquore æris accessum prohibeant.

§. 8. Hoc ipso autem gestationis tempore in prægnantibus quoque variæ observantur alterationes : prima omnium est suppressio mensium & orificii uteri arctissima contrictio. dantur tamen interdum, imprimis plethoricæ, quæ mensium fluxum ad medium usque graviditatis tempus absque ullo fœtus detrimento experiuntur. Pleræque etiam à cibis & imprimis à carnibus abhorrent, ac non paucæ quoque vomitu imprimis tempore matutino corripiuntur : vomitus autem hi communiter primis mensibus magis affligunt, adolescente vero fœtu, imprimis circa medium graviditatis tempus, cessant : nonnullæ tamen reliquo graviditatis tempore, quod tamen aliquo modo rarius est, eosdem experiuntur. Tantum vero abest, ut vomitus primis mensibus contingentes aliquod damnum fœtui inferant, ut is potius, nisi forsan admodum enormes fuerint, satis vegetus indè reddatur : quare etiam talis vomitus nullis remediis sunt sistendi. Causa hujus vomitus videtur esse, major sanguinis copia, in ramificationibus venæ portæ ob mensium suppressionem collecta : cum enim fœtus adhuc parvus multum nutrimenti nondum requirat, necessario sanguis in vasis hisce aliquo modo stagnare & non pauca incommoda producere debet : quamprimum vero grandior res

ditus est, plus quoque alimenti requirit, undè sublata illa stagnatione sensim quoque varia illa incommoda cessant. Quod autem incommoda hæcce maximam partem à mensium suppressione dependeant, exindè potissimum apparere potest, quod puellæ suppressione mensium p. n. laborantes ferè eadem patiantur symptomata.

§. 9. Præterea etiam hoc ipso graviditatis tempore feminæ admodum sunt sensibiles & ad iram pronæ & quidem non sine ratione: cum enim anima tum temporis in præparatione & motu convenientis nutrimenti ad uterum occupata sit, facile ad iram commovetur, si alia tum temporis ipsi occurrunt objecta, quæ eam in actione sua, quæ magni est momenti, turbare conantur. vid. *supra* Cap. V. Membr. 2. de Sexu p. 259. Inordinato quoque laborant communiter appetitu, dum res insolitas quoque, carbones, serpentes &c. appetunt. Reliqua accidentia, quoniam magis ad Pathologiam spectant, silentio prætereo.

### MEMBRUM III.

De

*Partu.*

§. I.

Quandò itaque fœtus hæctenus in utero nutritus omnium membrorum debitam perfectionem acquisivit, ita ut aëris externi im-

Y 3

pul-

pulsum ferre queat, in lucem tandem editur. Uti autem ferè ubique in Physiologia, ita & hic disputandi materiam invenerunt Physiologi, quando nimirum quæsitum fuit, *quonam tempore fœtus sit perfectus, & quodnam legitimum sit partus tempus?* Fuere enim, qui *Aristotelem & Plinium* secuti, brutis quidem animantibus omnibus certum pariendi tempus concesserunt, homini verò denegarunt.

§. 2. Sed falsitatis hæc sententia exindè potissimum argui potest 1. quod omnium creaturarum viventium nobilissima & perfectissima sit homo: si E ignobilioribus creaturis certum atque definitum constitutum est tempus, cur homini creaturarum nobilissimæ certum pariendi tempus denegatur? Deinde 2. hanc sententiam quoque convellit, quod plerique hominum elapsis post conceptionem novem mensibus solaribus aut decem lunaribus, sive 280. diebus in utero perfectionem acquirant & in lucem edantur: & si qui sunt, qui ante hocce tempus ordinarium & legitimum nascuntur, plerumque *imperfectiōis signa* sensibus offerunt: ut taceam partum hujusmodi præmaturum non à causis naturalibus, sed plerumque à *præternaturalibus* aut *violentis* ac à *graviori terrore* aliisque *animi gravioribus commotionibus* dependere, ita ut à tali præternaturali partu ad legitimum pariendi tempus nulla valeat consequentia. Quam ob causam etiam à Medicis introducta est distinctio inter *fœtum vitalem* & *perfectum*:



*Etiam*: ille est, qui quidem vivit, nondum tamen ita perfectus est, ut absque insigni molestia aëris externi injurias perferre queat, qualis est foetus *septimestris* & *octimestris* : hic verò, qui & vivit, & omnia membra perfecta habet : quare etiam hujus respectu, *partus legitimus est foetus maturi & perfecti exclusio.*

§. 3. Hoc loco merito etiam explodimus Veterum sententiam, qui praeunte Hippocrate octimestrem foetum minus vitalem credebant : afferebant enim foetum septimo mense exitum moliri, eoque non invento ob magna molimina lassum mense octavo quiescere & dormire, donec nono in lucem edi queat : id quod tamen falsissimum esse, exinde patet 1. quia quo magis perfectus est foetus, eò magis est vitalis : sana autem ratio & experientia dicunt octimestrem perfectiorem esse septimestri, hinc etiam extra omnem positum est controversiam, eum esse magis vitalem. 2. quia praeognantes motum foetus octavo mense fortiolem, quam septimo sentiunt.

§. 4. Certum itaque ratumque esse existimo, partum verum & legitimum semper finito nono mense contingere. Quo verò etiam Medicus cognoscere queat, an partus revera instet, probè attendere debet ad antecedentia, sive *signa partum* instantem verè *indicantia*. Inter signa ista principem sibi vindicant locum *dolores* : quoniam verò hi in *veros* atque *spurios*, *rechte Kinds-Wehen* und *wilde Wehen* /

dividuntur, probè attendendum est ad hujusmodi dolores. Sunt autem *dolores veri* illi qui in regione lumborum incipiunt, & ferè continuè versus pudenda urgent: Spurii verò sunt qui hincindè in abdomine oberrant, *sie treten nicht auff das Kind/* uti obstetrices loquuntur, ac etiam exhibitis carminativis ac clysteribus facilè cessant: cum è contra dolores veri usurpatis talibus remediis magis augeantur & fortius urgeant. Dolores hosce nonnunquam aliud adhuc præcedit signum: nimirum aliquot dies, aut nonnunquam etiam immediatè antè partum, venter satis tumidus & acuminatus planus quasi redditur, detumescit & versus inferiora descendit.

§. 5. Contingit autem id idèò quoniam hoc ipso tempore fœtus invertitur: ante partum enim fœtus incurvatus in utero sedet, cubitos ad inguina applicat, capite sive potius oculis pugnosc genibus impositos tangit, ita quidem, ut nasus medium inter duos pugnosc occupet locum, talos verò natibus applicat: partu autem appropinquante situm huncce mutat, ac caput inferiora petit, orificioque uterini opponitur, ita quidem ut facies versus intestinum rectum vergat.

§. 6. Ad signa partus instantis pertinet etiam continuus *tenesmus* sive egerendi conatus, qui tamen, licet alvum deponant parturientes, non cessat, sed perseverat: jungitur hisce interdum quoque tremor omnium artuum, inprimis

mis femorum & crurum cum calore totius corporis. Tandem orificium uteri aperitur, ac ex utero liquor viscosus & sanguine tinctus prodit, ac tandem disruptis membranis aquæ effluunt.

§. 7. Quod causas partus concernit, dividuntur communiter in *stimulantes*, five eas quæ ad partum stimulant, & *agentes* five *moven-tes*, quæ ad partum promovendum cooperantur: *illas* dicunt esse *perfectionem fœtus, alimentum & respirationis defectum, extensionem uteri &c.* *Has* verò *matrem, fœtum & obstetricem.* Quicquid sit de variis hisce causis, ego nullam aliam ex *stimulantibus* præter *fœtus perfectionem* admitto: cum enim, uti antea probatum fuit, homini certum atque definitum pariendi constitutum sit tempus, quid opus est in alias inquire causas. Quod verò *causas moventes* attinet, nulla alia quam uteri materni contractio locum habet, quæ si deest, omnis *obstetricis* aut *Chirurgi* opera irrita est: violenta enim illa fœtus five vivi five mortui extractio cum naturali partu non est confundenda: præsentem verò *uteri spasmodicam contractionem* *Chirurgus* atque *obstetrix*, ut partus felicius & facilius succedat, auxiliatrices præbere manus & Naturæ suppetias ferre possunt: fœtui autem ad partum (licet sint qui *calcitrationibus* fœtum partum promoveri dicant) prorsus nihil confert: id quod ex sequentibus rationibus apparere potest. Quamvis enim I. matres tempore graviditatis fortes fœ-



tus *calcitrations* sentiant & nonnunquam *acutum* quendam *dolorem* exindè percipiant, nulli tamen dolores veri partum promoventes sequuntur. 2. in ipso partu parturientes nullas *calcitrations* fœtus percipiunt, quod tamen necessarium contingere deberet, si ejusmodi calcitrations ad partum promovendum requirerentur. 3. Etiam si adhuc tales fœtus motus, qui tamen rariiores sunt, percipiant, illos tamen à veris partus doloribus distinctos esse, parturientes facillè comprehendunt. 4. *Fœtus mortuus*, qui tamen calcitrare & sic ad partum promovendum concurrere nequit, per solam spasmodicam uteri contractionem expellitur. 5. Simile quid contingit etiam in expulsiōe *molarum*. 6. *Abortus* quoque prorsus immaturus per hancce constrictionem excluditur, & sæpius etiam *abortus* prorsus non concurrente fœtu, graviora prægnantis *animi pathemata* sequitur. 7. Dolores quoque sive spasmodicæ uteri contractiones, excluso jam fœtu, sæpius adhuc continuantur, imprimis si grumi sanguinis, ex sanguine lochiali uberius affluente & coagualato orti, in cavitate uteri hærent, quos nostrates feminæ *cicnen Brand* vocant: quare etiam hujusmodi dolores, *Nachwehen*/quoniam ad expulsiōem grumorum tendunt, temere non sunt sistendi.

§. 7. Dictum fuit antea disruptis membranis *Aquam* sive *Liquorem amnii* effluere & partus instantis esse signum: hinc autem aquarum effluxui non semper fidendum est, quoniam

iam inter *Amnion* & *Chorion* interdum insignis quoque humoris copia colligitur, quæ nil nisi serosa humoris in amnio contenti portio, permixti poros transudans est, & diu inter utramque membranam hærens, tandem rupto Chorion absque ulla foetus noxa excernitur. Mulieres vocant *Bildwasser*. vid. *Ortlob Physiol.* p. 286.

§. 9. Verus autem amnii liquor, dum ita paulò ante partum effluit, insignem & maximum præstat usum, partes enim genitales, inprimis vaginam lubricam reddit & emollit, ita ut foetus eò facilius & felicius egredi queat: unde etiam si aliquot dies ante partum aquæ hæfluunt, foetus tamen non sequitur, partus utiturum, quoniam vagina iterum exsiccat, & debita ejusdem lubricitas perit, redditur difficilis.

§. 10. *Effluxum* huncce *aquarum* in partu naturali immediatè sequitur foetus caput, quod tum immediatè orificio uteri applicatur, mulieres dicunt, *Das Kind stehe in der Geburt* / ut uti in aliis locis id exprimunt, *Das Kind stehe in den Schlossen*. Cum verò sub hac ipsa foetus positura spasmodicæ uteri constrictiones vel interruptis vicibus vel continuo urgent, ac mater spiritum cohibendo & fortius pretenendo, ac si magno conatu alvum egerere vellet, actionem uteri adjuvet, obstetrix vero vaginam & uteri orificium emolliendo & dilatando cæti exitum promoveat, hic tandem capite pri-  
mum, facie intestinum rectum respiciens, bra-  
chii-

*chūsq;* secundum corpusculi longitudinem ex-  
porrectis prodit.

§. 11. Cum verò, *ossa pubis*, *os sacrum*,  
*coccygis* exitum foetus admodum reddant angus-  
tum, quæritur à Physiologis, an in partu ossa  
pubis divellantur? Fuere qui id affirmarunt  
& forsan adhuc reperiuntur, qui in ea sunt opi-  
nione. Sed falluntur, qui hocce credunt: hoc  
enim si esset, feminæ post partum pedibus in-  
sistere atque procedere nequirent. Cedit potius  
*os coccygis* versus posteriora & sic foetui egre-  
dienti majus concedit spatium; quare etiam  
*Recentiores*, qui de *Arte obstetricandi* scripserunt  
jubent, ut *obstetrix* vel *Chirurgus* parturienti as-  
sistens in partu *os coccygis* versus posteriora  
protrudant, quo majori hoc modo spatio com-  
cesso foetus eò facilius egredi queat, Si vero  
talis ossium pubis divulsio observata fuit, ea  
causis violentis adscribenda, atque sic pro re-  
merè præternaturali habenda est.

§. 12. Nato itaque infante eò allaboran-  
dum est, ut is à secundinis quibus adhæret, li-  
beretur: quare *funiculus umbilicalis* ad trium, vel  
quatuor digitorum mensuram à corpore in-  
fantis firmiter & quidem bis *ligandus*, ac inter  
duas *ligaturas* *resecandus* est. Postea verò excre-  
tio *Secundinarum*, *der Nachgeburth*/promoven-  
da est: hæ expelluntur interdum sponte à solo  
utero se constringente, plerumque tamen leni  
tractione opus est, ut eò facilius prodeant. Si  
vero, quod aliquando contingit, utero fortius ad-  
hærente



hærent secundinæ, manu sinistra funiculum ob-  
 etrix trahat, digitis verò manus dextræ eas cau-  
 è ab utero separet. Sunt autem *Secundinæ* mem-  
 branæ foetum involventes cum placenta uterina,  
 & quoniam post natum infantem prodeunt, &  
 secundus quasi partus sunt, *Secundinæ* vocantur.  
 Circa Secundinas adhuc notandum est, foetum  
 interdum tunicis adhuc inclusum nasci, nonnun-  
 quam verò cum portione caput tantum cin-  
 gente prodire: vulgus huic tunicæ nescio quas  
 virtutes adscribit, & infantes felices futuros exi-  
 timat, quare etiam communiter *das Glücks-  
 Häublein* vocatur: sed nugæ sunt: noti  
 enim mihi sunt homines, qui, licet cum tali  
 vitta fortunæ nati fuerint, nihilominus tamen  
 maximè infelices sunt.

§. 13. Quoniam porrò totus habitus cor-  
 poris infantis pluribus sordibus mucosis quasi  
 cinctus est, sordes istæ vel aqua calida, vel aqua  
 atque vino abstergendæ sunt. Postea verò fu-  
 niculi umbilicalis restitans portio linteis mol-  
 lioribus deliganda, infans verò fasciis invol-  
 vendus est.

§. 14. Tandem etiam *Meconium* sive sor-  
 des istæ nigricantes *mucoso biliosæ* in intestinis in-  
 fantis hærentes evacuandæ sunt: fit autem hæc  
 evacuatio duplici modo vel per *Colostrum*  
 sive primum serosum lac, vel per *remedia blan-  
 dè laxantia*: qualia sunt *Sirup. rosarum, de cichor.  
 cum rhabarb. &c.* quibus nostrates mulierculæ  
*Saccharum cum butyro recenti mixtum* substituunt:  
 alia

aliæ etiam recens natis *Pulv. epilept. Marchion* exhibent, cujus usum aliquot sedes secutas esse sæpius observavi. De usu *Colostri* superius de *Secretione Lactis* jam dictum fuit.

§. 15. Edito in lucem infante ex utero fluunt *Lochia*, nostratibus *die Reinigung* vocata: & primis quidem diebus sanguis admodum sincerus, postmodum verò magis serosius prodit; donec tandem fluxus ejus prorsus cesset. *Duratio* fluxus lochiorum admodum variat pro certo respectu temperamentorum: in *Sanguineo-Cholericis* & *Plethoricis* non solum longior est, sed etiam sæpius ad diem octavum, decimum aut decimum quartum extenditur: imo in hisce etiam si per aliquot tempus substiterit, interdum redit. In *Phlegmaticis* autem ac non *Plethoricis* interdum paucorum dierum spatio fluxus lochiorum absolvitur. Circa *Plethoricas* adhuc notandum, quod hæ sæpius *doloribus partum* corripiantur, qui etsi satis sint molesti, nunquam tamen sistendi sunt: cum enim nisi motus sint uteri, quorum beneficio *Natura* sanguinem lochiale superfluum & in uteri cavitatem in grumos abeuntem expellere conatur, conservandi potius sunt, & *Naturæ* debitissimis remediis succurrendum est, quò fine, quem sibi proposuit, potiri queat. Præ omnibus aliis remediis *Pilule veræ Stahlianæ* ac *Essentia dulcis Halensium* conveniunt, quicquid etiam alii, quibus talia remedia exosa sunt, contradicant: maxime enim falluntur, dum putant, es sene eim char.

arlatanerie, daß man remedia brauche des  
n composition man nicht wisse/ man müsse  
priori wissen wie ein remedium gemacht  
erde / und auß was vor particulis es be-  
stehe / sonst könnte man es mit gutem Ges-  
chmack nicht brauchen. Sed risu aut potius  
commiseratione digna sunt talia verba: quis  
scilicet quæso à priori scit, quænam particulæ in-  
sint remediis & quænam vires possideant?  
Nonne semper experientia opus est ad compro-  
bandas remediorum vires? exempli loco sit ra-  
tio *Ipecacuanhæ*, hæc si cuidam offerretur & ex eo  
quæreretur, quænam virtutes possideret, neces-  
sario se vires ejusdem nescire, respondere co-  
geretur, experientiam consulendam, & analysi  
chymica opus esse. Quando itaque infundi-  
tur spiritui vini aut aquæ simplici, prodit ex-  
tractum vel extractum resinofum vel gummosum.  
Nunc quæreretur ex Medico, quænam horum  
tractorum sint vires, necessario ignorantiam  
suam fateri & experientiam denuo consulen-  
dam esse respondere cogeretur. Quamvis  
tamen Praxis doceat, quasdam resinas incidere,  
quasdam verò purgare, dubium tamen semper  
est, an simplici incidendi, an verò purgandi  
gauderet hujusmodi extractum resinofum.  
Undem experientia consulta omne dubium  
eliminet, & *ipecacuanhæ* extractum resinofum vo-  
luntatem excitare, gummosum verò vi antidy-  
stercaria gaudere probat. Ex quibus satis su-  
perius patere existimo, Medicum Practicum in  
indica-



indagandis remediorum viribus ad solam experientiam confugere debere, & si hæc remedia fida & polychresta esse probat, eum contentum esse posse, etiamsi à priori compositionem ignoret: sufficit enim, si scopo Naturæ & Medici intentioni satisfaciunt.

§. 16. Quod autem ultimo loco infan-  
tem recens natum concernit, evacuato meconio, plus dormit quam vigilat: id quod tamen non sine summa ratione contingit. Cum enim organa sensoria in recens nato infante admodum tenera & summe sensibilia sint, ac ideò objectorum externorum actionem adhuc perferre nequeant, necessario tantisper, dum organa modo dicta maiorem perfectionem aut potius firmitatem acquisiverint, quiescere debent. Hisce accedit, quod infans hoc modo commo-  
dius nutriatur & sensibilibus crescat: uti enim adulti somno nimis dediti plerumque obest, sunt, ii verò qui sæpius & diu vigilant macilentum redduntur: ita quoque infantes quo plus dormiunt eò magis nutriuntur, quo plus verò vigilant, eò magis macilentum redduntur.



# INDEX

## Rerum & Verborum.

*Not. Lit. I. denotat Introductionem.*

### A.

<b>A</b> Bdominis descriptio	8
Absurda quamplurima continentur in Medicina corpusculari	I. 20
acidularum usus	206
acidum aut specialia fermenta in quovis morbo accusare absurdum	I, 27
Actiones vitales quomodo ab actionibus & ope- rationibus animæ differant	281
Actionum Vitalium potentia in Operationes animæ	286
adolescentiæ status	249
adulti cur ad somnum non adeo propensi sint ac juniores	320
Aërem ingredi in M. S. probatur probabilius negatur	112 113
Aër propria gravitate irruit in pulmones	111
Etas ejusq; divisio sive gradus	247
Etatis virilis & juvenilis status consistentis incommoda	249 ibid.
Alæ vespertilionum sive vasa deferentia mulierum	44
<b>Z</b>	Aliena

# I N D E X.

<i>Aliena multa Medicina moderna continet</i>	I. 34.
<i>Alimenta sive Materia Nutritionis</i>	192.
<i>Alimentorum præparatio in Ore, Ventriculo,</i> <i>Intestinis &amp; vasis lacteis</i>	212.
<i>digestorum exitum è Ventriculo</i> <i>promovet tunica fibrosa</i>	224.
<i>massam in intestinis promovet</i> <i>motus peristalticus</i>	321.
<b>Amor</b>	284.
<i>Amoris immoderati noxæ</i>	ibid..
<i>Amygdalæ dulces tabidis prosunt</i>	196.
<i>Amnion interior fœtum cingens membrana</i>	338.
<i>Anatomia circa minutias occupata rejicitur</i>	I. 200.
<i>quomodo tractanda</i>	I. 233.
<b>Anima hominis omnis motus &amp; sensus causa efficiens est</b>	1411.
<i>est principium motus in corpore</i>	70. 75. 313.
<i>fœtum in ovulo format</i>	335.
<i>in primo conceptionis momento ovulo</i> <i>communicatur</i>	334.
<i>respectu actionum animalium aliquo</i> <i>modo est otiosa, respectu vitalium</i> <i>nunquam</i>	317.
<i>fœtus ab anima patris provenit</i>	332.
<i>matris fœtus animæ multas tam bonas</i> <i>quam malas ideas inprimit</i>	333.
<b>Animæ humanæ cessatio &amp; remissio actionum in</b> <i>somno adscribenda</i>	315.
<i>pathematum in actiones vitales potentia</i>	283.
<b>Animales actiones in somno cessant, vitales verò</b> <i>in illo perennant</i>	317.
	Ann.



# I N D E X.

Anni Climacterici	253
Annus Climactericus magnus sive Heroicus	ib.
Antipraxia viscerum juxta Veteres	261
Anus cerebri	14
Appetitus	188
<i>causa non est lympa digestrix sed</i>	
<i>anima</i>	190
<i>Venerens, utriq; sexui familiaris</i>	324
Aqua potus communissimus	205
Aquæ ductus Fallopii	23
Aqua Pericardii	159
Aquarum differentia & quæ propotui optima	206
<i>effluxio in partu</i>	345
Archei Helmontiani descriptio	64. 65
Archeorum singulorum officium	65
Areola mammarum	26
Aridura partium quomodo contingat	235
Arrephis undecima thoracis vertebra	55
Arteria	46
<i>aorta sive magna</i>	
<i>Aspera sive trachea</i>	29
<i>Axillaris</i>	46
<i>Bronchialis</i>	ibid.
<i>Carotis externa &amp; interna</i>	47
<i>Cervicalis</i>	46
<i>Cœliaca dextra &amp; sinistra</i>	47
<i>Coronaria cordis</i>	46
<i>stomachica</i>	47
<i>Cruralis</i>	48
<i>Cystica</i>	ibid.
<i>Diaphragmatica</i>	47
<i>Duodena</i>	48

# I N D E X.

<b>Arteria</b>	<i>Emulgens</i>	48
	<i>Epiploica dextra, postica &amp; sinistra</i>	47
	<i>Gastrica major</i>	ibid.
	<i>dextra sive pylorica</i>	ibid.
	<i>sinistra</i>	ibid.
	<i>Gastro epiploica dextra &amp; sinistra</i>	ibid.
	<i>Hepatica</i>	48
	<i>Hæmorrhoidalis externa &amp; interna</i>	ibid.
	<i>Humeraria</i>	46
	<i>Hypogastrica</i>	48
	<i>Iliaca externa &amp; interna</i>	ibid.
	<i>major &amp; minor</i>	ibid.
	<i>Intercostales inferiores &amp; superiores</i>	46
	<i>Jugularis</i>	ibid.
	<i>Lumbaris</i>	48
	<i>Mammaria</i>	46
	<i>ejus Origo</i>	143
	<i>Mesaraica inferior</i>	48
	<i>superior</i>	47
	<i>Muscula Cervicis</i>	47
	<i>inferior, superior</i>	48
	<i>Cruralis externa &amp; interna</i>	ibid.
	<i>Phrenica</i>	47
	<i>Poplitea</i>	48
	<i>Pudenda</i>	ibid.
	<i>Pulmonalis</i>	46
	<i>Pylorica</i>	48
	<i>Sacra</i>	ibid.
	<i>Scapularis</i>	47
	<i>Spermatica</i>	48
	<i>Splenica</i>	47

**Arteria**

# I N D E X.

<b>Arteria</b>		
<i>Subclavia</i>		46
<i>Suralis</i>		48
<i>Temporalis</i>		47
<i>Thoracica inferior, superior</i>		ibid.
<i>Tibiae</i>		48
<i>Umbilicalis</i>		ibid.
<b>Arteriae ad pulsum conferunt</b>		99
<b>Arteriarum anatomica descriptio</b>		45
<i>numerus, ad duas tantum refertur</i>	ibid.	
<i>Tunicæ</i>	ibid.	
<i>harum usus</i>		46
<b>Arthrodia sive articulatio superficialia</b>		58
<b>Arthrosis sive articulatio</b>	ibid.	
<b>Articulationis descriptio</b>	ibid.	
<b>Articulatio quotuplex?</b>	ibid.	
<b>Artuum descriptio</b>		8
<b>Aschalites quinta lumborum vertebra</b>		55
<b>Atlas prima lumborum vertebra</b>	ibid.	
<b>Atrophia infantum unde oriatur</b>		233
<b>Auditus, ejusq. utilitas</b>		298
<i>Objectum est sonus, qui in primum &amp;</i>		
<i>secundum dividitur</i>		299
<i>Organum est Auris externa &amp; interna</i>	ibid.	
<b>Auctionis differentia secundum longitudinem</b>		
<i>&amp; crassitiem</i>		235
<i>causa secundum crassitiem est pinguedo</i>	237	
<i>longitudinem est mera</i>		
<i>voluntas divina</i>	236	
<b>Auctio cur non semper continuet, nulla ratio</b>		
<i>physica demonstrativa reddi potest</i>	ibid.	
<i>dependet potissimum ab ossibus</i>	ibid.	
<b>Z 3</b>	<b>Auctio</b>	



# I N D E X.

<b>Audtio partium quomodo ?</b>	235
<i>secundum longitudinem quamdiu dures</i>	236
<b>Aves ad assandum optimæ</b>	201
<b>Aures, earumq; descriptio</b>	22. 229
<i>Cerumen, vid. Cerumen Aurium.</i>	
<b>Auricularum cordis systole &amp; diastole</b>	98
<b>Aurium mechanica delineatio</b>	23
<b>Axis tertia colli vertebra</b>	55

## B.

<b>B</b> Aglivi opera laudantur	I. 388
<i>Basis colli est septima colli vertebra</i>	55
<b>Bilis animalium usus</b>	172
<i>differentia inter cysticam &amp; hepaticam</i>	174
<i>ratione temperamentorum</i>	172
<i>est portio sanguinis sulphurea crassa &amp; sa-</i>	
<i>lina</i>	242
<i>non est humor adeo laudabilis</i>	170
<i>omnis est censenda excrementitia</i>	171
<i>organum est hepar</i>	172
<i>principia sunt aqua, oleum &amp; sal</i>	ibid.
<i>secretio</i>	170
<i>Usus in intestinis, qua propter audit clyster</i>	
<i>naturalis</i>	172
<b>Blas Helmontianum</b>	65
<b>Botanica ars Recentiorum rejicitur</b>	I. 188
<b>Brachium</b>	88
<b>Brassica muriatica, Saurkraut</b>	196
<b>Bronchia pulmonum</b>	300
<b>Buccæ</b>	77
<b>Bulbus oculi</b>	188

Calca--

# I N D E X.

<b>C</b> Alcaneum <i>sive calx vel pterna</i>	9
<b>C</b> alor <i>quid conferat ad fermentationem ciborum</i>	222
<b>C</b> anthus <i>sive angulus oculi major &amp; minor</i>	10
<b>C</b> apitis <i>descriptio</i>	9
<b>C</b> ardimelech <i>Rex in corde residens Dolæi</i>	68
<b>C</b> aput <i>Galli gallinacei</i>	43
<b>C</b> arnes <i>bonum corpori alimentum præbentes describuntur</i>	197
<b>C</b> arnosus <i>panniculus</i>	9
<b>C</b> aro <i>aromatibus condita laudabilem generat sanguinem</i>	201
<i>ad assandum quæ apta ?</i>	ib.
<i>à putredine quomodo conservetur ?</i>	202
<b>C</b> arpus	8.58
<b>C</b> artilago <i>Xyphoidis sive ensiformis</i>	25
<b>C</b> artesius <i>locum Animæ &amp; Perceptionis posuit in glandula pineali</i>	306
<b>C</b> aruncula <i>sive glandula Innominata</i>	18
<i>Lachrymalis ejusq; usus</i>	ib. 158
<b>C</b> arunculæ <i>papillares renum</i>	40
<i>vesicularum seminalium</i>	43
<b>C</b> atalogus <i>Dissertationum D. D. Stahlii</i>	I. 78. seq.
<b>C</b> ellulæ <i>intestini coli, eorumq; origo</i>	37
<b>C</b> erebellum	14
<b>C</b> erebelli <i>processus Vermiformis</i>	ibid.
<b>C</b> erebri <i>substantia, alia corticalis sive cineritia, alia medullaris sive albicans</i>	12
<i>corticalis describitur</i>	128
<i>medullaris explicatur</i>	129
<b>C</b> erebrum <i>ejusq; descriptio</i>	10
<b>Z</b> 4	<b>Cere-</b>

# INDEX.

<b>Cerevisia Naumburgensis vires</b>	208
<i>ratione coloris differentia</i>	ibid.
<b>Cerevisia, variaq; ejus species</b>	p. 208 277
<b>Cervix</b>	77
<b>Cerumen aurium quid? &amp; ejus usus</b>	186
<i>secernitur per glandulas meatus auditorii ovales &amp; subluteas</i>	ibid.
<i>spissius impedit auditum</i>	ibid.
<b>Chirurgia hodiernus status</b>	I. 711
<b>Chirurgia Medico necessaria qualis intelligatur?</b>	I. 700
<i>Medicina pars antiquissima &amp; nobilissima</i>	I. ib.
<b>Cholerici temperamenti descriptio</b>	267
<i>phenomenorum ratio</i>	268
<b>Chorion exterior fœtum ambiens tunica</b>	336
<b>Chylificatio &amp; digestio est intima ciborum resolutio</b>	216
<i>in Ventriculo tota non perficitur</i>	219
<b>Chyli promotio ex Cisterna quomodo contingat?</b>	233
<i>Stillicidii per vulnus thoracis exempla</i>	227
<b>Chylum omnem ingredi vasa lactea à Bartholino statuitur</b>	226
<i>à vasis mesaraicis absorberi Veteres credebant</i>	ibid.
<b>Chylus ex Vegetabilibus qualis?</b>	204
<i>differt ratione Temperamentorum</i>	94
<i>in hepate non in sanguinem mutatur neque in corde</i>	95
<i>sed in omnibus visceribus sanguinis depurationi inservientibus fit sanguificatio</i>	ib.
<b>Chylus</b>	



# I N D E X.

Chylus partim per vasa lactea, partim vero per vasa mesaraica fertur	228
per peculiaria vasa ad mammas non du- citur	143
Chymicorum principia activa & passiva	I. 24
Cibi ex regno animali & vegetabili	190
grati facile, ingrati difficulter deglutiuntur	217
qui optimi ad corpus nutriendum?	193
Cibis assumtis cur subito refocilemur?	229
Ciborum resolutio fit per modum fermentationis	222
in Ventriculo fit successive, & cur?	224
intima summe necessaria	226
sufficiens dilutio & motus corporis mo- deratus promovent excrementorum excretiones	176
Cibos propria gravitate descendere ad Venti- culum falsum	217
Circulationis sanguinis detector Harveus	89
Circulatio sanguinis in adultis	115
foetu describitur	117
Cisterna sive receptaculum chyli	38
Clavicularum descriptio	56
Coitus intermissi Gonorrhœam producentis exem- pla	152
Colostrum infantibus recens natis non denegan- dum	148
Coctio ciborum in ventriculo rejicitur	222
Collum	7

# INDEX.

Condyloides <i>maxillæ inferioris processus poste-</i> <i>rior</i>	11
Conceptio, <i>eiusq; requisita in viro &amp;</i> <i>femina</i>	322 323
Consuetudo <i>ad mutationem &amp; mixtionem</i> <i>temperamentorum multum</i> <i>confert</i>	277
<i>alvum deponendi multum valet</i> <i>ad excrementorum citiorem vel</i> <i>tardiorum excretionem</i>	176
<i>in appetendis cibis &amp; potu multum</i> <i>valet</i>	199
Cor	110
<i>maxime confert ad sanguificationem</i>	99
Cordis <i>auriculæ</i>	22
<i>Mechanismus describitur</i>	ibide
<i>situs</i>	277
<i>substantia est musculosa</i>	ibide
<i>Systole &amp; Diastole quid?</i>	28
<i>Vasa</i>	ibide
<i>Vasorum Valvulæ</i>	ibide
<i>Ventriculi, eorumq; descriptio</i>	277
Corona <i>anterior processus maxillæ inferioris</i>	19
Cornua <i>maxillæ inferioris</i>	ibide
Corporis <i>comparatio cum machina hydraulico-</i> <i>pneumatica</i>	8
<i>humani anatomica descriptio</i>	7. seq
<i>principia</i>	51
Corpus <i>callosum</i>	12
<i>est instrumentum animæ, per quod actio-</i> <i>nes suas peragit</i>	253
Corpus	

# INDEX.

<i>corpus humanum meram esse machinam negatur</i>	83
<i>Pampiniforme &amp; pyramidale</i>	22
<i>ratione principiorum ad dissolutionem putredinosam maxime pronum est</i>	4
<i>striatum</i>	13
<i>Cosmetorges Rex Iræ Dolæi</i>	68
<i>Costarum descriptio</i>	56
<i>numerus</i>	25
<i>Crista galli</i>	15
<i>Cranium</i>	10
<i>Crura medullæ oblongatæ</i>	13
<i>Cubitus</i>	8
<i>Cutis &amp; cuticula</i>	2

## D.

<i>Deglutitio quomodo contingat</i>	216
<i>Dentes maxillarum alveolis infixi sunt per Gomphosin</i>	15
<i>dividuntur in Primores seu incisores, Caninos &amp; Molares</i>	ibid.
<i>exteriori parte periosteo carent</i>	213
<i>Sapientiæ</i>	16
<i>sensim sensimq; atteruntur</i>	213
<i>Dentium numerus &amp; substantia</i>	15. 213
<i>ratione radicum differentia</i>	ibid.
<i>Usus</i>	212
<i>Diaphragma ejus situs &amp; usus</i>	26
<i>Dyaſtole &amp; Systole Cordis</i>	28. 97
<i>Diazoſter duodecima Thoracis Vertebra</i>	55
	Dis-



# I N D E X.

**Differentia corporis & actionum secundum Æta-  
tes, Sexum & temperamenta** 241

**Digitus manus**

*pedis*

**Dolæi Spiritus sive Reges corporis recensentur** 65

**Dolores parturientium Veri & Spurii** 344

*post partum non temere sunt sistendi* 344

**Dorsum**

**Ductus aquosus Nuckii, ejusq; usus** 11

*Biliarii* 33

*Cholidochus sive Biliaris* 13

*Cyst hepatici* 33

*eorumq; usus* 177

*Hepaticus* 33

*Pancreaticus sive Wirsungianus* 33

*Stenonianus* 22

*Thoracicus* 33

*Warthonianus* 66

**Drastica medicamenta** I. 66

## E.

**E**lementa corporis humani

*Epigastrium*

**Empiricorum curationes** I. 66

**Enarthrosis sive Inarticulatio** 58

**Epididymides sive Parastatæ** 42

*Officina seminis* 15

**Errores in Medicina quomodo cognoscendi & vi-  
tandi** I. 400

**Essentia dulcis & Pil. Stahlianæ in suppressione**

*Lochiorum optima remedia* 35

**Excre-**

# INDEX.

crementorum alvinorum consistencia & fætor	177
color	ibid.
excretio quomodo	
fiat	178
fætor differt ratio-	
ne assumtorum	ibid.
diversus in di-	
versis animalibus	177
non provenit	
à fermento stercorifico	178
unquam ab-	
solute est putredinosus	ibid.
putredinosus	
in morbis acutis cum diarrhæa con-	
junctis, dysenteris & diarrhæa	
Phthisicorum colliquativa funestum	
signum	ibid.

## F.

Acultas Attractrix & Retentrix Veterum	
rejecitur	253
lxcerebri	II
rciminum varia confectio	202
bris descriptio	113
minæ ad plethoram præ viris sunt pronæ, & cur?	260
animi affectibus magis sunt obnoxia ac	
viri	257
cur ad amorem adeo sint pronæ?	ibid.
magis obruuntur melancholicis deliriis	
quam viri	ibid.
Feminæ	

# INDEX.

**Feminae plethoricae** saepius doloribus post partum corripuntur 33

& Sanguineo-Cholerica largiorem lochiorum fluxum experiuntur ac Phlegmaticae ibi

ratione sensibilitatis Viros superant, & hinc ad fortiores commotiones & graviores morbos proniores 22

**Feminarum arrogantia** & superbia ab imbecillitate animi dependet 22

**Furor Uterinus** unde? ibi

**Ira** & **Otium** & **Sensibilitas** tempore graviditatis unde? 259. 33

**pulsus** & **motus tonicus** non ita vegetus ac virorum 22

**Feminis certum parturiendi tempus** destinatum esse probatur argumentis 34

**Femur** 8.

**Fermenta quaedam Veterum** nominantur

**Viscerum** mera sunt figmenta 12

**Fermentatio** quid? I. 4.

ciborum promovetur à bile, succo pancreatico & liquore glandularum intestinalium 22

resolutoria ciborum in intestinis ibi

**Fermentorum doctrina** rejicitur I. 27. sec

**Fermentum Ventriculi** 22

**Fibra enascitur ex mucilagine**

præbet fundamentum omnibus fere partibus corporis ib.

Fibra



# INDEX.

<i>libræ duriores , flexilitate tamen gaudentes , longe fortiores &amp; ad labores perferen- dos aptiores sunt , quam molliores &amp; flexiliores</i>	312
<i>nerveæ, quo magis sunt tensæ, eo sensibi- liores</i>	291
<i>per labores duriores quoq; fortiores fiunt &amp; cur?</i>	311
<i>sanguinis rejiciuntur</i>	91
<i>urethræ &amp; vesicularum seminalium mul- tum conferunt ad emissionem seminis</i>	327
<i>librarum diversa nomina</i>	6
<i>librillarum nervearum tensio præcipua motus tonici est causa</i>	140
<i>flexilitatis utilitas</i>	ibid.
<i>libula</i>	57
<i>istulæ membranaceæ renum</i>	40
<i>aducia patientis in Medicum multum efficit in Praxi</i>	248
<i>fluidi nervorum elaborationis locus</i>	132
<i>materia</i>	141
<i>est lymphæ laudabilis nutritia</i>	132
<i>motus causa sunt meninges ce- rebræ</i>	133
<i>non est continuus sed interruptus</i>	138
<i>Usus</i>	242
<i>fluidum nervorum exhalat per minutissimos cutis poros</i>	139

Flui-

# INDEX.

<b>Fluidum nervorum</b>	in sensatione & metu passi-	
	ve tantum se habet	1400
	per nervos distribuitur	2422
	qua ratione effectus suos præ-	
	stet in corpore	1399
<b>Fœtum anima</b>	format & singulas ejus partes	
	nutrit	3355
<b>Fœtus</b>	ad partum nihil conferre probatur	3455
	anima proficiscitur à solo Parte	3322
	ante nonum mensem in lucem editi imper-	
	fectionis signa offerunt	3422
	distinctio in Vitalem & Perfectum	ibid.
	duabus membranis cinctus est in utero,	
	Amnio & Chorion	3388
	elapsis duobus mensibus formicam magni-	
	tudine æquat vel paululum superat, ac	
	caput, oculi & artus conspiciuntur	3399
	elapso tertio mense digiti manuum & pe-	
	dum apparent, ac sexus cognoscitur	ibid.
	circa vigesimam septimanam se movere	
	incipit	ibid.
	in utero permanet usq; ad finem noni vel	
	principium 10. à conceptione mensis	ibid.
	non respirat, quod probatur	ibid.
	nutrimentum per venam umbilicalem ex	
	placenta uterina ad ejus hepar, & de-	
	niq; ad cor fertur	3377
	nutritio in utero	3399
	partes, quomodo una post alteram generetur	3399
	pulmones in utero mortui, in aquam immissi,	
	instar lapidis fundum petunt	3399
		Fœtus

# I N D E X.

Fœtus <i>situs in utero materno</i>	344
<i>solum per os nutritur</i>	337
<i>Vitalis &amp; Perfecti enucleatio</i>	343
Fontanella	11
Forelli <i>observationes laudantur</i>	I. 64
Fornix	12
Fortuna <i>Medicis non opus est, &amp; cur?</i>	I. 76. seq.
Fracturæ <i>ossium &amp; vulnera partium mollium cur</i> <i>in senibus tardius curentur, ac in ju-</i> <i>nioribus?</i>	250
Frons	7
Fuligines <i>exeunt e pulmonibus in expiratione</i> <i>quid?</i>	114 115

## G.

Gasteranax <i>sive Bithnimalca abdominis Rex</i> <i>sive Præses Dolæi</i>	68
Gaudium <i>variorum notabilium effectum causa</i>	248
Gelatinæ <i>medicamentosæ quomodo parandæ</i> <i>admodum laudantur</i>	200 201
Generatio <i>sive propagatio hominum, cur à DEO</i> <i>instituta?</i>	324
Genu	9
Ginglymus <i>sive mutua articulatio</i>	58
Glandula pinealis	14
<i>est sedes animæ &amp; perceptionis</i> <i>juxta Cartesium</i>	366
Pituitaria	13
<i>sive Caruncula Lachrymalis</i>	18
Innominata	ibid.
A a	Glan-



# I N D E X.

Imaginatio	305
Imperitia in re Medica quid?	I. 33
Infans recens natus quomodo tractandus?	348
Infantia, & quid in illa observandum?	248
Infantum Atrophia unde oriatur?	235
& juniorum somni profundioris ratio	319. 352
Inflammationis causa	I. 50. seqq.
Influxus fluidi nervorum & sanguinis in partes requiritur ad motum voluntarium	310
Infundibulum Cerebri	113
Ingenium optimum requiritur & iudicium promptum & acre in illis, qui Medicinam tractare cupiunt, & cur?	I. 78
Inguina	18
Injectionum variorum liquorum in meninges effectus	133
Inscriptiones muscutorum rectorum abdominis	35
Insomnia unde & quid?	310
Institutio in Medicina à puero	I. 1
Instrumentorum motus voluntarii duo necessaria requisita	310
Intestina absolvunt fermentationem resolutoriam	22
dividuntur in crassa & tenuia	2
Crassa sunt, Cecum, Colon & Rectum	ibid.
Tenuia, Duodenum, Jejunum & Ileum	ibid.
infimi ventris sive Abdominis viscera sunt	1
Intestini colicellule, earumq; origo	3
Rectifinis dicitur anus	ibid.
Intestinorum rugae, & earum usus	ibid.
Glandula	ibid.
Intes	Intes

# INDEX.

Intestinorum <i>Valvulae conniventes</i>	73
<i>Vasa</i>	ibid.
Intestinum <i>Jejunum, cur ita appelletur?</i>	232
<i>Æra descriptio</i>	283
<i>Iris</i>	19
<i>Irradiatio, Lumen &amp; scintillæ fluidi nervorum</i> <i>rejiçiantur</i>	141
<i>Judicium præmaturum, in junioribus observa-</i> <i>tum, indicium brevioris eorum vitæ</i> <i>est</i>	215. 320
<i>Lugulum</i>	7
<i>Uscula carniùm diutius cocta sunt Gelatinæ</i> <i>quomodo paranda?</i>	200 199
<i>uventutis &amp; Virilis ætatis status</i>	249

## K.

<i>Erkringii valvulae conniventes intestinorum</i>	37
--	----

## L.

<i>Abiorum oris usus in masticatione</i>	216
<i>Labor nimis multas inducit noxas</i> <i>alteri labori substitutus, quomodo quie-</i> <i>tis loco esse possit?</i>	315 323
<i>lac animalium solum ad nutritionem non sufficit</i> <i>est chylus, laxius cum humoribus coherens</i> <i>in quo sexu, &amp; quo tempore ordinariè inve-</i> <i>niatur?</i>	203 243 145
<i>ratione animi pathematum varias qualita-</i> <i>tes recipit</i>	149
<i>Lachrymarum origo</i>	158
<i>Lactis</i>	

# I N D E X.

<b>Lactis Analysis</b>	144
evanescentia subitanea an potendat infan-	
tis mortem ?	146
Generatio cur post partum tantum contin-	
gat ?	147
Materia, ejusdemq <sub>3</sub> probatio	148
secretio	148
quamdiu duret ?	146
secretionis Organum sunt glandulæ conglo-	
meratæ mammarum	144
Usus	141
<b>Lamellæ incurvæ cuticulæ poros tegentes, ipsis in-</b>	
star valvularum sunt	168
impediunt nimium sudoris effluxum	ibid
<b>Latera</b>	
<b>Laryngis cartilagines</b>	21
musculi	ibid
<b>Lienis capsulæ vasa ambientis usus</b>	177
substantia cellulosa	40
Vasa	ibid
Usus	177
<b>Ligamentum suspensorium hepatis</b>	33
<b>Linea alba abdominis</b>	33
<b>Linguae descriptio</b>	32
musculi motui inservientes	22
Usus in deglutione & masticatione	215. sec
<b>Liquor Amnii ejusq<sub>3</sub> usus</b>	338. 341
inter Amnion & Chorion	22
glandularum intestinalium ejusdem	
cum saliva naturæ	
	ibid
<b>Liquor</b>	



# I N D E X.

<i>Liquoris feminarum in coitu ex vagina effluen-</i>	
<i>tis usus</i>	154
<i>Prostatarum usus</i>	ibid.
<i>Literatorum morbi varii, à vita sedentaria &amp;</i>	
<i>meditationibus continuis dependent</i>	285
<i>Lochia quid?</i>	148. 350
<i>eorum fluxus duratio variat pro certo</i>	
<i>respectu temperamentorum</i>	350
<i>Locus studii aptus ad Medicinam discendam</i>	
<i>requiritur</i>	1. 8
<i>Lophia brima Thoracis Vertebra</i>	55
<i>Ludovicus inter Pharmaceuticos Authores pri-</i>	
<i>mas tenet</i>	33
<i>Lympha est sanguinis portio laudabilis nutritia</i>	2. 43
<i>quomodo secernatur?</i>	ib.
<i>Lymphæ corporis nutritiæ partes</i>	92. 123
<i>gastricæ sive Fermenti Ventriculi aci-</i>	
<i>ditas rejicitur</i>	219
<i>Natura &amp; Origo</i>	218
<i>Usus</i>	ibid.
<i>motum quæ promoveant?</i>	126
<i>origo non est succus nervorum in substan-</i>	
<i>tia partium liquefactus</i>	127
<i>secretio</i>	123
<i>secretionis organum</i>	125
<i>Termini</i>	127

## M.

<b>M</b> <i>Agnitudo iusta membri virilis, quid ad</i>	
<i>conceptionem conferat?</i>	326

<b>M</b> <i>alleolus externus &amp; internus</i>	2. 58
--	-------

# I N D E X.

Mammarum <i>mechanica comparatio</i>	266
<i>Regio</i>	8. 266
<i>Substantia</i>	266
<i>Vasa</i>	ibid.
Maschalister <i>secunda vertebra Thoracis</i>	55
Masticatio <i>quid?</i>	112
<i>ejus usus</i>	116
Materia <i>humorum</i>	91
<i>nutritionis pulsu ad omnes corporis partes propellitur</i>	235
Materiæ <i>nutritionis appositio sive modus nutritionis</i>	234
Maxilla <i>inferior, superior</i>	15
Mechanica <i>delineatio Aurium</i>	23
Mechanismus & <i>structura corporis</i>	5
Meconium <i>sive Papaverculum sunt excrementa nigricantia infantis recens nati</i>	148. 237
Media <i>ad scientiam veram Medicam ostenduntur</i>	1. 5
Mediaſtinum <i>ejusq; ortus</i>	27
Medici <i>finis est Sanitas &amp; Vita</i>	1. 54
<i>nomine multi, re autem ipsa inveniuntur pauci</i>	1. 22
<i>rationales quovis tempore vixerunt</i>	1. 49
Medicina <i>cur adeo contempta</i>	I. 1. seq.
<i>est Ars nobilissima</i>	I. 11
<i>rationalis &amp; certa</i>	I. 50
<i>quomodo rationalis esse debeat?</i>	I. 49
Medicinæ <i>fundamenta Stabliana à quibusdam culpantur</i>	I. 48. seq.
<i>Origo</i>	I. 11
Medi-	

# I N D E X.

Medicina	Subjectum est corpus humanum quatenus sanitatis & morborum capax	I. 54
Medico	in indagandis remediorum viribus ad solam experientiam confugiendum	352
	Practico sufficit cognitio Plantarum officinalium, earumq; virtutum	I. 20
Medicus	aliquando Spectator Naturæ tantum esse debet	I. 65
	etiam Chirurgus sit, necesse est	I. 70
	Microcosmi Minister	I. 15. 65
	Physicus esse debet, & qualis ?	I. 12
Medulla	Oblongata ejusdemq; crura	13
	Spinalis	14
	ossium tenerior est pinguedine	239
Melancholici temperamenti descriptio		271
	phænomena explicantur	272
Membrana musculosa sive Panniculus carnosus		9
	nares interius cingens est Olfactus organum	20
Meninges	motu Systaltico & Diastaltico gaudent	134
Meningum	metus unde proveniat ?	137
	puncturæ quid efficiant ?	134
	Utilitas	137
Meninx dura & pia		II
Menses	supprimuntur post conceptionem, quædam vero eos adhuc per aliquot gestationis tempus experiuntur	340
Mentis operationes	corpus insigniter debilitant, & sæpius deliria produciunt	316



# I N D E X.

<i>Mentis operationes adhuc aliquo modo in somno continuantur</i>	ibid
<i>Mentum</i>	77
<i>Mercurius verus ex sanguine humano productus nunquam</i>	I. 244
<i>Mesenterium</i>	10. 37
<i>ejus Glandulæ</i>	ib. 38
<i>Plexus nervei</i>	233
<i>Vasa lactea</i>	100
<i>Meseræum</i>	33
<i>Mesocolon</i>	ibid
<i>Metacarpus</i>	8. 20
<i>Metatarsus sive Metapedium</i>	9. 56
<i>Metus describitur</i>	280
<i>Microcosmetor Rex capitis Dolæi</i>	65
<i>Modus nutritionis secundum Veteres</i>	233
<i>Monitum quoddam circa structuram corporis humani</i>	66
<i>Monorchides, unum tantum testiculum possident</i>	159
<i>Morbi in Libros Pathologicos quomodo inseren- di? hujusq; insertionis utilitas</i>	I. 6
<i>Morbus sive hominis status p. n.</i>	244
<i>Morisonii Botanica</i>	I. 1
<i>Mortis causa Physica nulla allegari potest sola voluntas divina</i>	254
<i>definitio</i>	244
<i>Motibus Naturæ quomodo succurrendum</i>	I. 6
<i>Motus animales in somno cessant, vitales vero continuantur</i>	31
<i>cordis præcipua causa motus sanguinis progressivi</i>	99

Motu

# INDEX.

<b>Motus corporis moderatus &amp; ciborum sufficiens</b>	
dilutio promovent excrementorum excretionem	176
est vel Secretorius vel Excretorius, & horum usus	l. 57
& secretio nervorum liquoræ	128
etiam extraordinarii pro salutaribus habendi	l. 57
extraordinarii causa sæpius est Plethora	l. 58
cur instituantur à Natura	59
Naturæ non sint incogniti	l. 60
varii ratione ætatum	l. 39
& sensationis actus à fluido nervorum	
passive solummodo perficitur	138
Febriles non supprimendi	l. 60
in febribus necessarii	l. ibid.
fluidi nervorum non est continuus, sed interruptus	138
humorum	87
causæ instrumentales, motus cordis, motus tonicus & respiratio	96
circularis non mathematice sed physice intuendas	88
circulatorius qualem usum cor poris præstet?	l. 56
effectus	118
Veteribus incognitus fuit	88
multi cur in febribus instituantur?	l. 60
nervorum sine illorum fluido nullus	130
non est ipsa Vita	l. 56
<b>Motus</b>	

# INDEX.

<b>Motus peristalticus quid?</b>	176
<i>quamdiu duret?</i>	ibid.
<i>ejusq; Usus</i>	231
<i>in Status. n placide procedunt, ac hete- rogea satis tranquille è corpore excer- nantur</i>	I. 57
<i>sanguinis causæ variæ</i>	100
<i>Intestinalis</i>	87
<i>Progressiva</i>	ib.
<i>tonici Explicator optimus D. D. Stahlus</i>	101
<i>Usus</i>	104
<i>in nutritione</i>	235
<i>transpiratione</i>	162
<i>tonicus partium</i>	101
<i>cum stricto &amp; laxo Vete- rum comparatur</i>	ib.
<i>relaxatur in somno</i>	318
<i>probat</i>	102
<i>quomodo se habeat ratione tempe- ramentorum</i>	105
<i>Voluntarii causa efficiens est sola anima humana</i>	313
<i>duo maxime necessaria requisita</i>	310
<i>Instrumenta sunt partes solidæ</i>	309
<i>Usus</i>	ibid.
<i>Voluntarius sequitur voluntatem</i>	309
<i>imprimatur immediate ner- vis à Principio movente, qui postea ceteris parti- bus solidis ipsum commu- nicant</i>	ib.
	Muci



# INDEX.

<i>Muci copia differt ratione Temperamentorum &amp;</i>	
<i>Ætatum</i>	180
<i>Intestinorum &amp; Vesicæ usus</i>	179
<i>Narium usus</i>	181
<i>secretio in naribus fit in ipsius membrana</i>	
<i>glandulosa</i>	180
<i>Mucum narium in cerebro secerni Veteres cre-</i>	
<i>diderunt</i>	181
<i>Mucus variarum partium est pure excrementitius</i>	179
<i>Mulieres quamdiu ad concipiendum aptæ?</i>	250
<i>Musculi circulares sive sphincteres</i>	84
<i>Imperfecti</i>	ibid.
<i>partes sunt Caput sive Principium,</i>	
<i>Venter &amp; Cauda, sive Finis</i>	9. 54
<i>Abdominis</i>	33
<i>Ani</i>	37
<i>Auris</i>	22
<i>Buccarum</i>	17
<i>Capitis</i>	ibid.
<i>Frontis</i>	ibid.
<i>Labiorum</i>	ibid.
<i>Laryngis</i>	29
<i>Linguae</i>	24
<i>Maxillæ</i>	16
<i>Narium</i>	21
<i>Oculi</i>	18
<i>Offis hyoidis</i>	24
<i>Palpebrarum</i>	18
<i>Penis</i>	43
<i>Pharyngis</i>	32
<i>Thoracis</i>	ibid.
<b>Musculi</b>	

# I N D E X.

Musculi Uvulae	27
Mutatio & Mixtio Temperamentorum	274.
N.	
Nævi materni unde oriantur?	79. 332.
Nachwehen sive dolores post partum	
quid?	246.
eorumq; usus	ibid.
non temere sistendi	ib.
Nares ad bonum olfactum quomodo comparati esse debeant?	303.
Narium membranae ortus	ibid.
Nasus	7.
ejus partes	211.
Nate cerebri	14.
Naturam Medicus semper sequi debet	I. 61. 65.
Natura in Tyrone requiritur ad medicinam ad- discendam	I. 4. 7.
respectu animalium actionum in somno aliquo modo est otiosa, vitalium nun- quam, sed iisdem semper est intenta	317.
ubi in morbis secretionem & excretio- nem molitur, Opium minime exhi- bendum, & cur?	322.
Necessitas principiorum corporis	4.
Nephritis prima lumborum vertebra	55.
Nervæ fibræ, quo magis tensæ, eo magis sensi- biles & ad sensus accommodatæ	291.
Nervearum fibrillarum tensio & turgescencia, unica & præcipua motus tonici partium mollium est causa	140.
flexilitatis utilitas	ibid.
Nervei	

# INDEX.

Nervei plexus in mesenterio sunt septem	235
duo minores inferiores	ibid.
quinque magni superiores	ibid.
Nervi ad motum quomodo concurrant ratio probabilis	314
cervicis septem	14
Dorsi duodecim	ibid.
Lumborum quinque	ibid.
Ossis sacri sex	ibid.
Nervi Capitis	32
quorum sunt decem paria	13
1. Olfactorium	ibid.
2. Opticum	ibid.
3. Oculorum motorium	ibid.
4. Patheticum	ibid.
5. & 6. Gustatorium	ibid.
7. Auditorium	ibid.
8. Vagum	ibid.
9. Linguae motorium	ibid.
Par decimum	ibid.
sine ipsorum fluido moveri nequeunt	130
Nervorum fluidum, vid. fluidum nervorum	
per minutissimos cutis poros exhalat	139
porositas à quibusdam negatur, eorumque circa hanc rem experimenta facta	130
creditur	129
tensio quomodo probanda	140
Nocturnæ	



# I N D E X.

Nocturnæ pollutiones unde ?	327
Nuclei pini bonum corpori præbent nutrimentum	196
Nutrimentum fœtus per venam umbilicalem ex placenta uterina ad ejus hepar, & postea ad cor fertur	337
Nutritio fœtus in utero	336
quomodo fiat ?	ib.
partium singularum corporis quomodo contingat ?	235
Nutritionem spectantia enarrantur	187

## O.

O Blongata medulla	13
ejusdemq; crura	ib.
Observationum Authorum utilitas	I. 64
Occiput	77
Oculi	ibid. 177
moventur sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum & obliq; deorsum	296
robur conservant palpebræ	297
hujusq; ratio	ib.
Oculorum in orbita situs	17
Bulbus	18
Humores tres	19
Mechanismus insignis	ib.
Pupilla	ib.
Tunica	188
Odontalgia & Otalgia sanguinea historia	I. 26
Oesophagi partium variæ denominationes	31
Oeso	Oeso

# I N D E X.

Oesophagus, ejus substantia est membranacea	32
Olfactus	303
ejus Organum sunt Nares, inprimis	
membrana interna nares succingens	ibid.
Obiectum sunt effluvia sulphurea subtilissima è corporibus exhalantia	ib.
Omentum, & ejus variae denominationes	34
Vasa	ibid.
substantia membranacea	ibid.
Operationes mentis corpus insigniter debilitant,	
& sæpius ipsa deliria producunt	316
adhuc aliquo modo in somno continuantur	ibid.
Opium assumptum cur somnum excitet?	322
ejus usus in morbis, ubi Natura secretionem & excretionem molitur, non proficius	ibid.
Origo Medicinæ	I. 1.
Oris ejusq; partium descriptio	21
situs	7
Ortus membranæ narium	303
Os Basilare, Sphænoides vel Cuneiforme	10
cur ita appelletur?	14
Ooccygis	8. 55
in partu versus posteriora cedit, ut fœtui egredienti majus concedatur spatium	347
Cribrosum, Spongiosum vel Ethmoides	10. 14.
Cubiti	57
Femoris	ibid.
Hyoides, Tpsiloides, Gutturis vel Linguae	24. 57
B b	O s

# I N D E X.

<b>Os</b>	<i>Humeri</i>	566
	<i>Ilium</i>	566
	<i>Innominatum</i> sive <i>os Coxæ</i>	ibid.
	<i>Ischium</i>	ibid.
	<i>quæ in hoc esse observanda</i>	ibid.
	<i>Palati</i>	144
	<i>Pubis</i>	566
	<i>in partu non divellitur, uti quidam opinantur</i>	3488
	<i>Sacrum</i>	8. 555
	<i>ejus regio</i>	88
<b>Ossa</b>	<i>artuum</i>	577
	<i>Auris</i>	222
	<i>Cranii</i>	111
	<i>ex duabus constant laminis interiori &amp; exteriori</i>	ibid.
	<i>Frontis</i>	100
	<i>Metatarsi</i>	588
	<i>eorum connexio</i>	ibid.
	<i>numerus</i>	ibid.
	<i>Nasi</i>	222
	<i>eorum origo</i>	ibid.
	<i>Occipitis</i>	100
	<i>Sesamoidea</i>	588
	<i>Syncipitis</i> sive <i>Bregmatis</i>	100
	<i>Tarsi</i>	588
	<i>Temporum</i>	100
	<i>Turbinata</i>	222
	<i>tria parva in homine, plura in animalibus</i>	ibid.
<b>Ossium</b>	<i>historia</i>	588
		Ov



# I N D E X.

Ova continent vera rudimenta Fœtus, juxta ob-	
servationes solertissimi Malpighii	328
Ovula mulierum quid?	45
sunt vel vera vel subventanea	
sive hydatides	45. 328
quo in loco imprægnenter variæ sententiæ	329
subventanea lympham tantum in se conti-	
nent, prima vero rudimenta fœtus ipsis	
inclusa non sunt	ib.
Ovuli ex ovario descensum promovent tubarum	
Fallopîi extremitates. & quomodo	330
Ovulo statim in primo conceptionis momento	
Anima communicatur, & cur?	334
Ovulorum maturitas unde?	329
maturorum & verorum descriptio	ib.
Ovulum imprægnatum mediantibus parvis fi-	
brillis annectitur Utero	336

## P.

Palatum	25
ejus usus in gustu	301
Voce	32
Palpebræ	17
Pancreas	36
Panis fermentatus sit necesse est	194
quis optimus?	ibid.
Ventriculo est gratissimus, nec facile ab eo	
abhorremus	195
Panniculus carnosus, sive membrana musculo-	9
paverculam sive Meconium dicuntur excre-	
menta nigricantia fœtus	337

Bb 2

Papil-

# I N D E X.

Papilla <i>mammæ</i>	210
Papillulæ <i>Linguae</i>	244
<i>nervæ lingue sunt vel pyramidales,</i>	
<i>vel capitatæ, vel in tenues discissæ</i>	
<i>fibrillas</i>	24. 303
<i>cur ita fabrefactæ?</i>	303
<i>nervæ sunt immediatum tactus Orga-</i>	
<i>num</i>	ibid
<i>earum descriptio</i>	ibid
Parastatæ sive Epididymides	41
<i>earum descriptio</i>	ibid
Paristhmia <i>Antiades</i> sive Tonsillæ, à figura <i>Amyg-</i>	
<i>dalæ dictæ</i>	22
Partes <i>genitales</i>	11
<i>Mulierum</i>	41
<i>Virorum</i>	41
Partium <i>corporis divisio</i>	
<i>Fœtus successiva generatio</i>	323
Parturientium <i>dolores sunt vel veri vel spurii</i>	34
Partu <i>peracto quid faciendum?</i>	34
Partus	34
<i>causæ dividuntur in stimulantés &amp; agen-</i>	
<i>tes sive moventes</i>	34
<i>causa movens est sola uteri contractio</i>	ibid
<i>stimulans est tantum fœtus perfectio</i>	ibid
<i>enarratur</i>	343. 34
<i>instantis signa antecedentia signa</i>	34
<i>naturalis definitio</i>	ibid
<i>verus &amp; legitimus finito nono mense contin-</i>	
<i>gere debet</i>	ibid
Patella <i>quid?</i>	50
	Patho

# I N D E X.

Pathologia Clinica	I. 62
Cruda quid?	I. 64
Praxeos fundamentum	I. 30. seq.
Vulgaris multa à scopo Medico aliena continet	ibid.
Pectus quid?	7
Pedum sive Tarsus	9
Pedunculi Willisii quid?	14
Pelvis Renum	167
ejusdem capacitas	168
Penis ejusq; partes	43
variae denominationes	ib.
Perceptionem qui statuunt in medulla oblongata fieri, probabilem forent sententiam, & cur?	308
Pericardium quid?	27
ejus aqua, hujusq; usus	ib.
Pericranium quid?	10
Peritonæum quid?	33
ejus duo processus	ib.
Pes extremus	57
Phalanges digitorum	ib.
Phantasiæ effectus in actiones vitales	285
Pharmacia moderna cur reprehendi debeat	I. 32. seq.
Phlegmatici & Sanguinei magis sunt propensi ad somnum, quam Cholericæ & Melancholici	318
Temperamenti enarratio	269
phænomena explicantur	270



# INDEX.

<b>Physica</b> , quæ hodierno die tractatur, non est fundamentum Medicinæ	I. 17
<b>Physiologiæ</b> status hodiernus miser & cur? I. 28. seqq.	
<b>Pili narium</b> vocantur <i>Vibrissæ</i> vel <i>Vibrisci</i>	200
<b>Pilulæ Stahlianæ</b> & Ess. Dulcis Hallensium in Lo- chiorum suppressione optima remedia	351
<b>Pinguedo</b> est maxime oleosa cum salibus per- mixta sanguinis portio	237
quomodo à sanguine secernatur	160
ejus usus	238
<b>Pisces</b> quinam, optimi	199
<b>Placentæ uterinæ</b> sive hepatis uterini origo	137
<b>Plethora</b> qualia incommoda inducat corpori	288
<b>Plethoram</b> sequentia mala	I. 58
<b>Plethorica</b> femina sæpius doloribus post partum corripiuntur, qui non sistendi, sed con- servandi & cur?	350
<b>Pleura</b> , constat duplici membrana	27
<b>Pleuritæ</b> sunt octo thoracis vertebrae	57
<b>Plexus nervei</b> in mesenterio sunt septem choroidalis quid?	231
<b>Pollutiones nocturnæ</b> unde?	318
<b>Pomum Adami</b> quid?	299
<b>Pons Varolii</b>	14
<b>Poti arteriarum</b> & glandulæ conglomeratæ sunt Organum secretionis	119
<b>Cutis</b>	11
<b>Porofitas nervorum</b> à quibusdam negatur	129
<b>Potus</b>	20
ejus necessitas	ibid.
quatuorplex	ibid.
<b>Potus</b>	Potus

# I N D E X.

Potus calidi origo	209
Chocoladæ	211
confectio	ibid.
Usus	ibid.
Coffèe noxa & usus	209
Thée	210
Principia mechanica Cartesii ad corpus huma- num à modernis applicantur	69
Principium motus in corpore humano est anima	70
Processuum Peritonæi usus in Feminis	34
Viris	ib.
Processus Ciliares	19
Papillares quid?	13
Vermiformis cerebelli	14
Prostatæ quid?	43
Prudentia vera medica quid?	I. 5.
Pterna, Calx vel Calcaneum	9
Pubis regio	8
Puellarum suppressione mensium laborantium vomitus unde?	341
Pueritia	248
quid in hac aetate observandum?	ibid.
Pulmones	10, 29
eorum lobus dexter & sinister	30
Mechanica comparatio	ibid.
Substantia	ibid.
Vasa	ibid.
Fœtus in utero materno mortui in aquam immissi, instar lapidis fun- dum petunt.	339
Antliæ pneumaticæ inclusi non intumescunt ib.	Pul-

# I N D E X.

<b>Pulsus sive motus cordis</b>	977
Cordis est causa motus humorum instru-	
mentalis, huiusq; usus	240
Vis ingens	983
<b>Puncta lachrymalia</b>	183
eorum usus	ibid.
<b>Puncturæ Meningum effectus</b>	134
<b>Pupilla oculi</b>	190
ad meliorem visionem notabiliter	
concurrit	2977
ciliarium processum ope constrin-	
gi & dilataripotest	ibid.

## Q.

<b>Q</b> uies & Somnus	315
cur instituaturn à Natura?	323

## R.

<b>R</b> acham Melcha Regina uteri Dolei	683
Receptaculum chyli sive receptaculum lum-	
bare	38. 233
<b>Regio mammarum</b>	7
Ossis coccygis	83
Sacri	ibid.
Pubis	ibid.
Umbilicalis	ibid.
<b>Remedia ob noxas subsequentes suspecta</b>	
non usurpanda	I. 68
quænam illa sint?	Ibid.
	Reme-



# I N D E X.

Remedia optima in suppressione lochiorum sunt	
<i>Pil. Stablianæ &amp; Ess. dulcis</i>	351
Remediorum virtutes à priori ignoramus	ibid.
Renes	40. 167
eorum carunculæ papillares	40
ductus urinarii	ibid.
substantia	ibid.
succenturiati	41
eorum figura	42
varia nomina	41
Rheumatismus quodmodo curandus	I. 27
Requisita Hippocratis ad Medicinam recte comparandam	I. 5. 74
Resolutio ciborum fit per modum fermentationis	222
ultima summe necessaria	226
in Ventriculo fit successive	
& cur?	224
Res præternaturales & violentæ, partum immaturum provocantes	342
Rima alias Vulva cerebri	13

## S.

Sal Sulphur & Mercurius Chymicorum	I. 24
Salia in quibusvis morbis accusare absurdum	I. 25
Saliva non est liquor excrementitius in totum	154
ejus & sputi differentia	155
effusio similis est pharmaceuticæ præparationi Oc. cancer.	213
fluxus in os est perpetuus	156
B b 5	Sal-

# INDEX.

San-

# I N D E X.

<i>Sanguinis menstrui vasa sunt venæ cervicis ab hæmorrhoidalibus orta</i>	154
<i>quod probatur</i>	ibid.
<i>fluxus usus in feminis</i>	186
<i>Sanguis ex quibus partibus constat</i>	91
<i>effunditur in ipsam partium substantiam</i>	100
<i>menstruus cur singulis mensibus effluat ?</i>	182
<i>non est venenatæ qualitatis</i>	186
<i>non constat fibræ</i>	91
<i>quomodo se habeat ratione coloris in arteriis &amp; venis ?</i>	24
<i>Sanitas</i>	244
<i>quando perfecta ?</i>	ibid.
<i>Sanitatis definitio vera</i>	245
<i>Veterum rejicitur</i>	244
<i>Sapor dependet à particulis salinis</i>	302
<i>Scapulæ</i>	7
<i>Scientia vera medica quid ?</i>	I. 5
<i>Scintillæ, Lumen &amp; Irradiatio fluidi nervorum</i>	
<i>rejicitur</i>	141
<i>Scopus Medici qualis esse debeat ;</i>	I. 10
<i>Scriptorum Stahlianorum usus probatur aliquot observationibus</i>	41
<i>Scrobiculus cordis</i>	7
<i>Scrotum, ejus sutura &amp; septum</i>	42
<i>contractionis usus in opere generationis</i>	150
<i>ex duabus constat tunicis communibus &amp; tribus propriis</i>	ibid. 42

Scro-



# INDEX.

<b>Scrotum</b> , in pueris admodum est contractum, & testes vix apparent in illis	150
<b>Secretio</b> Aquæ Pericardii	159
Bilis, vid. Bilis	
& Excretio fecum alvinarum,	175
Sanguinis menstrui, vid.	
sang. menstr.	
quid Medicis significet ?	182
Urinæ	165
Lactis, vid. Lactis secretio.	
Lymphæ	123
cūr fieri debeat ?	125
Muci & aliarum sordium	179
in naribus fit in membrana glandulosa	180
Salivæ, vid. Saliva.	
Seminis, vid. Semen.	
quo tempore contingat	ibid. 248
usus	149
<b>Secretio sudoris</b> & transpiratio insensilis	161
est aniversalis & publicum usum	
habet	179
partium terreosalinarum cum paucis	
pinguibus & plus vel minus aquosis	
fit potissimum in Naribus, Ventriculo, intestinis & Vesica	242
<b>Secretiones</b> & Excretiones non sunt ipsa Vita	I. 56
quid præstent ?	Ib.
succedunt optime in	
Cholericis	267

Secretio--

Secretiones & Exceetiones in Cholericis & Sanguineis promptissimæ	264
tardæ in	
Melancholicis	272
Phlegmaticis	269
Secretionis organum sunt glandulæ conglomeratæ & pori arteriarum	119
Secundinæ post partum sunt promovendæ	348
quid? & cur ita appellantur?	349
Sella turcica sive equina	14
Semen est lymphæ portio laudabilis	243
non ab omnibus corporis partibus ad testes abit	152
continet vermiculos	153
Semen robur corpori conciliat, & ipsum notabiliter alterat	ibid. 149
Seminis materia	152
Organum secretionis sunt testes	150
retentio quæ mala inducat?	152
Senectutis incommoda	251
Sensui communi Veteres anteriorem, Phantasiam mediam, Memoriam posteriorem cerebri partem tribuebant	305
Sensus externi describuntur, eorumq; usus	290
sunt quinque	295
eorum requisita sunt 1. Anima humana. 2. Organa sensoria	
3. Objecta sensibilia	ibid.
Sensus Interni communiter dividuntur in Sensum communem Phantasiam & Memoriam	304
Sensus	

# I N D E X.

<b>Sensus Internus unicus tantum à quibusdam statuitur nempe Imaginatio</b>	305
<b>Vitalis qualis ? &amp; adhuc sensibus internis apponendus</b>	308
<b>Sententia Hippocratis de fœtus octimesiris &amp; septimesiris majori &amp; minori vitalitate rejicitur</b>	343
<b>Septum nares dividens</b>	20
<b>Pellucidum</b>	12
<b>Seri partes constituentes</b>	93
<b>Serum halituosum per poros cutis excernitur minus subtile in renibus secernitur, &amp; per urethram ejicitur</b>	241
<b>Sexus</b>	ibid.
<b>Sinus duodecim in naribus, eorumq; nomina plures alii ex Sagittali &amp; Lateralibus sinibus in substantiam cerebri distribuantur</b>	256
<b>venosi cerebri quatuor</b>	20
<b>Somnus &amp; quies cur à Natura instituantur ? circa illum annotationes quædam ejus noxæ si nimius post pastum &amp; potum spirituosorum liquorum profundior assumptum Opium</b>	11
<b>Sonus dividitur in primum &amp; secundum : ille est motus tremulus in corpore sonoro excitatus, hic vero motus istius tremuli perceptio</b>	ib.
<b>quomodo contingat :</b>	315
<b>Spina dorsi sive Rachis</b>	318
	323
	321
	322
	269
	ibid.
	55
	Spina



Spina ossis tibiæ	57
Spinalis medulla	10. 14
Spirituosi liquores quomodo fiant ?	208
quibus temperamentis con- ducant ?	209
Spirituum Elogia juxta Wirdigium	63
variæ denominationes	61
Spiritus animalis effectus & ortus	80
est fluidum nervorum	81
vitalis quomodo elaboretur ?	67
ut tertia pars essentialis hominis reji- citur	I
Stahlianæ scripta laudantur	I. 39
& Practicis & Tyronibus ma- xime necessaria	I. 40
Stahlianarum Dissertationum Catalogus	I. 78, seq.
Stahlius optime de erroribus in Medicina cogno- scendis & vitandis scripsit	I. 40
Sternum ex quibus ossibus constet ?	26
Stranguria unde ?	180
Structura & mechanismus corporis	5
Subiectum Medicinæ est corpus vivum & sa- nabile, hujusq; cognitionis utilitas in Praxi	245. I. 54
Succus Pancreaticus	35
ejusdem est naturæ cum sa- liva	225, 243
non est acidus	225
Sudor, vid. Secretio sudoris.	
ejus efficiens causa est Natura humana	163
impeditus motus quid noceat ?	164
	Sudor

# I N D E X.

Sudor, <i>eius materia est serum sanguinis halituo-</i> <i>sum</i>	162.
Supercilia	17.
Sura	9.
Sutura <i>descriptio</i>	59.
<i>sunt vel verae vel spuriae</i>	10.
Sydenhamius <i>laudatur</i>	1. 38.
Symphysis <i>sive coactus</i>	58.
Synchondrosis	59.
Synciput	77.
Synevrosis	59.
Syssarcosis	ibid.

## T.

Tactus <i>sensus dignitas</i>	300.
<i>Objecta varia</i>	301.
Tactus <i>Organum sunt nervi, &amp; horum papillulae</i> <i>nerveae</i>	300.
Tarsus, <i>Latinis Cilium</i> <i>sive Pedium</i>	17. 9. 58.
Temperamenta <i>Astrologorum</i>	262.
<i>humida in sicca mutantur, &amp;</i> <i>non vice versa</i>	274.
<i>simplicia quomodo in mixta</i> <i>transcant</i>	261.
Temperamenti <i>definitio</i>	262.
Temperamentorum <i>appellationes</i> <i>divisio</i>	263. 261.
<i>doctrina, in Medicina in-</i> <i>signem habet usum</i>	260.

Tempe-

# I N D E X.

Temperamentorum <i>mixtorum</i> sive <i>compositorum</i> species	277
<i>mutationis causa sollemnissima est diversitas ætatum</i>	275
Temperamentum describitur <i>Cholericum</i>	267
<i>Melancholicum</i>	281
<i>Phlegmaticum</i>	267
<i>Sanguineum</i>	263
<i>optimum,</i> <i>quia magis temperatum</i> <i>&amp; homini magis natura-</i> <i>le est</i>	ib.
Tempora	7
Tempus <i>ad meditationes optimum quale?</i>	286
Tendines	9
Theoria, <i>quæ in illa observanda?</i>	I. 12
<i>solida inservit unice scopo medico</i>	I. 11
<i>quænam sit?</i>	I. 54. seq.
<i>moderna parum utilitatis in Praxi</i> <i>habet</i>	I. 34. 39
Theoriæ <i>diversorum Authorum enumerantur</i>	I. 11
Therapia, & <i>quid Medico in illa observandum</i>	I. 65
Terra <i>principium corporis humani</i>	2
Terror, <i>ejus phænomena, &amp; quales noxas indu-</i> <i>cat?</i>	283
<i>quid noceat feminis infantes lactantibus</i>	146
Testem <i>unum tantum possidentes dicuntur Mo-</i> <i>norchides</i>	150
Testes <i>Cerebri</i>	14



# I N D E X.

<b>Testes</b> in quibusdam pueris ad pubertatis usque tempus in abdomine delitescunt, ali- quando per totum vitæ cursum abscon- diti latent	150
<i>sive Ovaria mulierum</i>	44
<i>Virorum</i>	42
<b>Testium ductuum</b> longitudo & usus	151
<i>substantia est glanduloso-vasculosa</i>	42. 150
<i>Vasa</i>	42
<b>Thée foliorum</b> differentia ratione magnitudinis, coloris & efficaciae	210
<i>ejus vis adstrictoria probatur</i>	ibid.
<b>Thoracis, ejusq; partium</b> descriptio	25
<i>secunda vertebra Maschalister dicitur</i>	55
<b>Thymus</b>	32
<i>ejus usus</i>	33
<b>Tibia</b>	5. 7. 9
<b>Tonfillæ</b> à figura amygdalæ dictæ, item <i>Antiades</i> & <i>Paristhmia</i>	25
<b>Torcular Herophili</b>	9
<b>Torpor &amp; proclivitas ad somnum post pastum</b> unde?	287
<b>Transpiratio</b> dividitur in sensibilem & insensi- bilem	161
<i>ejus organum sunt glandulæ</i>	
<i>Stenonianæ</i>	ibid.
<i>Usus</i>	164
<b>Transpiratione</b> plus una die quam quindecim diebus per urinam & alvum evacuatur	161
<b>Triorchides tres testes possident</b>	150
	Tristi.

# I N D E X.

Tristitia & circa hanc observanda	283
Trochanteres duo processus ossis tibiæ	51
Tubæ Fallopianæ mulierum	45
Tunicæ corneæ pelluciditatem conservat motus palpebrarum	297
oculorum	18
Tunica fibrosa sive musculosa Ventriculi maxi- mè extendi potest	224
vacuo Ventriculo admodum rugosa est, & cur?	225
Tympani membrana	22
V.	
V Alvula intestini coli ejusq; usus	36
Valvularum intestinalium conniventium Kerkringii usus	231
Vasa deferentia sive ejaculantia	43
Lactea, & eorum definitio	38
quid? eorum situs & divisio	332
tribus tenuioribus intestinis sunt concessa	231
Lactifera mammarum majora & minora in fine coarctata ipsam consti- tuunt papillam	ibid.
Lymphatica Veteribus fuerunt incognita	133
eorum Inventores & descriptio	ib. 53
liquorem vehunt utilissimum	124
Mucifera Vieussenii	180
umbilicalia	34
Vas breve Lienis	47
collare majus Ortlobii	54. 127
deferens mulierum sive Alæ vespertilionum	44

# I N D E X.

<b>Vasorum lacteorum divisio</b>	38
<i>Inventor</i>	ibid.
<i>numerus minor in Duodeno</i>	
& <i>Ileo quam Jejuno</i>	223
<i>Valvula</i>	38
<i>Mesaraicorum abundantia, eorumq; usus</i>	228
<b>Venarum descriptio</b>	48
<i>principalium tres sunt</i>	49
<i>Tunicæ</i>	48
<i>Valvulæ</i>	49
<b>Vena &amp; Venæ</b>	
<i>Adiposa</i>	50
<i>Atrabilaria</i>	ibid.
<i>Axillaris</i>	49
<i>Azygos</i>	ibid.
<i>Basilica</i>	ibid.
<i>Bronchialis</i>	ibid.
<i>Cava</i>	ibid.
<i>Cephalica brachii</i>	ibid.
<i>pedis</i>	51
<i>Cerebri sunt jugulares</i>	14
<i>Cervicalis</i>	49
<i>Coronaria cordis</i>	ibid.
<i>Ventriculi</i>	52
<i>Cruralis</i>	51
<i>Cysticæ gemellæ</i>	ibid.
<i>Diaphragmatica sive Phrenica</i>	50
<i>Duodena sive intestinalis</i>	51. 52
<i>Emulgens</i>	50
<i>Epigastrica</i>	51
<i>Epiplonica</i>	52
<b>Venæ</b>	



# INDEX.

Vena Gastrica dextra	51
<i>major &amp; minor</i>	52
Hæmorrhoidalis externa, interna	50, 52
Hepatica	50
Hypogastrica	ibid.
Intercostales	49
Iliacæ	50
Ischias	51
Jugulares	49
Lumbares	50
Mammaria	49
Mediana	ibid.
Mediastina	ib.
Mesenterica sive mesaraica	51
<i>dextra &amp; sinistra</i>	53
Muscula cervicis	49
<i>Inferior</i>	51
<i>Interna</i>	ibid.
Pancreatica	52
Phrenica	50
Poplitæa	51
Portæ	ibid. 49
<i>adducit sanguinem bilis secretioni in-</i>	
<i>servientem</i>	173
<i>destituitur valvulis</i>	174
Pudenda	51
Pulmonaria	49
Puppis	ibid.
Raninæ	42, 49
Sacra	56
Salvatella	49

# INDEX.

<b>Vena Saphæna</b>	31
Scapulares	49
Spermatica	50
Splenica	57
Subclavia	46
Suralis	51
Thoracica	49
<b>Venter</b>	9
<i>acuminatus &amp; tumidus gravidarum aliquot     dies ante partum planus redditur, detume-     scit &amp; versus inferiora descendit</i>	344
<b>Ventriculi cerebri sunt quatuor</b>	12
<b>Ventriculus</b>	10
<i>humanus cum ventriculis anima-     lium carnivororum fere exacte     convenit</i>	197
<i>ejus fundus &amp; orificia duo</i>	35
Substantia	34
Valvula	35
Vasa	ibid.
<b>Vermiculi in semine non continentur</b>	153
<b>Vermiformis processus cerebelli</b>	14
<b>Veronicæ infuso majores vires ac Thèe adscri-     buntur</b>	21
<b>Vertebræ colli</b>	55
Lumborum	ib.
Pleuritæ	ib.
Thoracis	ibid.
<b>Veteres ob descriptionem accuratam morborum     laudantur</b>	I. 38
<i>qualitates suas quatuor ceu fundamen-     tum temperamentorum supponebant</i>	261
	Veterum

# I N D E X.

<b>Veterum sententia de Principio moriente</b>	62
<i>Sanguine</i>	38
<b>Vertex</b>	7
<b>Vesica urinaria ejus Sphincter &amp; vasa</b>	41
<i>ejus &amp; urethra mechanica consideratio</i>	ibid.
<b>Vesicula fellis ejus crusta mucosa, hujusq; usus</b>	39
<b>Vesiculæ seminales, earumq; descriptio</b>	43
<b>Vibrissæ, Vibrisci sunt pili narium</b>	20
<b>Vigiliæ quid :</b>	314
<b>Vini potus ad sanitatem laudatur, ejusq; requisita</b>	206
<b>Vinum Rhenanum &amp; Mosellæ pro potu sanitatis</b>	
<i>ergo optimum</i>	207
<b>Virorum fibra firmiores ac robustiores quam feminarum</b>	256
<b>Viscera vitalia læsa homines reddunt pertasos &amp; ad iram pronos</b>	288
<b>Viscerum colatoriorum porositates figurata rejiciuntur</b>	121
<i>poriratione magnitudinis respondent liquorum secernendorum particulis</i>	123
<b>Visus Organum sunt Oculi, ejusque utilitas</b>	296
<b>Vitæ definitio</b>	I. 56.
<i>descriptio</i>	240
<b>Vita &amp; sanitas dependent a prompta secretionē &amp; excretionē partium heterogenearum</b>	240
<i>naturalis hujusq; causa</i>	279
<i>oritur ex anima immaterialis cum corpore materiali intima mixtione</i>	ibid.
<b>Vitta fortuna, vulgo das Glück-Häublein der Kinder / quid :</b>	349
<b>Umbilicalis regio</b>	8
<b>Umbilicus</b>	ibid.
<b>Unio anima cum corpore comparatur cum cinnabaris præparatione</b>	380
<b>Unionis anima cum corpore cognitionis necessitas in Medicina</b>	ibid.
<b>Voluntas &amp; motus voluntarius</b>	309
<i>est altera mentis humana facultas generalis, quam sequitur motus corporis voluntarius</i>	ibid.
	Vomer



# I N D E X.

Vomer ultimum os maxilla superioris	15
Vomitus cruenti historia	1, 41
gravidarum non sistendi nisi enormes	340
Voraces semper macilenti sunt. & cur :	238, 216
Uratislaviensium Medicorum scriptorum utilitas	1, 63
Ureteres eorumq; descriptio	41
Urethra ejusq; vasa	ibid.
Urethræ & vesicularum seminalium fibra multum conferunt ad emissionem seminis, qua sortis esse debet	327
Urina non inepte sudor renum appellatur	165
tenuis & aquosa nephriticorum est indicium paroxysmi instantis	168
in febribus acutis quid indicet	ibid.
Urinæ color hominis sani est citrinus	166
limpidus post potum unde	167
distinctio inter urinam potus & sanguinis	166
elementa	155
excretio quomodo contingat	169
hujusq; usus	ibid.
vi opus habet	ibid.
regurgitationem ad renes impediunt valvula ureterum & duplicatura membranarum	168
vesica	168
Secretio & Excretio coincidit cum sudoris se- cretionem & excretionem	165
non fit per modum fermentationis sive à fermento renibus inharente non de- pendet	168
Uteri materni orificium post conceptionem arctissime clauditur	340
Uterus ejusq; duplex ligamentum	44
Vulnera ossium & partium mollium cur in senibus tar- dius ac in junioribus curentur	250
Uvula duo habet ligamenta	240

# F I N I S.

Londonfuey nu kan ingafte gøfand  
fint det loub, so vafte alle me,  
die ifuey uift i bue 7 bue fünde  
ffloft nu folle. Hubner. Tom. Hardy Oral.









